




វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលាឃ្លានជំនាន់ថ្មី

ជីវវិទ្យា

ថ្នាក់ទី ១២

កម្រងសំណួរចម្លើយ និង បណ្តុំ សំណួរប្រៀបធៀប



ជា ល្អិត



អារម្ភកថា

**សៀវភៅសំណួរចម្លើយនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់
សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ក្នុងការសិក្សា ក៏ដូចជាការត្រៀមប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ។
សង្ឃឹមថា សៀវភៅនេះនឹងអាចក្លាយជាឯកសារជំនួយស្មារតី និងសម្រាប់បន្ថែមនូវចំណេះ
ដឹង និងជម្រុញការសិក្សាមុខវិជ្ជាជីវិតឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព។
ទោះបីជាយ៉ាងណា ឯកសារនេះក៏អាចនៅមានការខ្វះខាត និងកំហុសឆ្គងខ្លះៗជៀសមិន
ផុត។ ដូចនេះ នាងខ្ញុំរង់ចាំទទួលការកែលម្អ និងមតិស្តាប់នាពីសំណាក់មិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នា។**

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២

ជា សុភា

(គ្រូបង្រៀនជីវិត នៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី)

មាតិកា

ជំពូក១ ៖ ស៊ីមេនត៍ស្ពៃ និងអង់ស្យូស្ពៃ	ទំព័រ
➢ មេរៀនទី១ ស៊ីមេនត៍ស្ពៃ.....	1
➢ មេរៀនទី២ អង់ស្យូស្ពៃ.....	4
ជំពូក៣ ៖ តម្រូវផ្សេងៗរបស់សារពាង្គកាយ	
➢ មេរៀនទី១ តម្រូវប្រសាទ.....	15
➢ មេរៀនទី២ សរីរាង្គវិញ្ញាណ.....	38
➢ មេរៀនទី៣ ប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន.....	65
ជំពូក៤ ៖ នាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីនក្នុងសារពាង្គកាយ	
➢ មេរៀនទី១ អាស៊ីតអាមីនេ.....	90
➢ មេរៀនទី២ ប្រូតេអ៊ីន.....	94
➢ មេរៀនទី៣ អង់ស៊ីម.....	101
ជំពូក៥ ៖ ព័ត៌មានសេនេទិច និងការសម្តែងចេញនៃសែន	
➢ មេរៀនទី១ ADNជាទម្រង់ព័ត៌មានសេនេទិច.....	108
➢ មេរៀនទី២ ការសម្តែងចេញនៃសែន.....	117
➢ មេរៀនទី៣ បច្ចេកវិទ្យាជីវៈ.....	128
ជំពូក៦ ៖ ការវិវត្តនៃការរស់	
➢ មេរៀនទី១ ទ្រឹស្តីរបស់លោកដាវីន.....	139
➢ មេរៀនទី២ ភស្តុតាងនៃការវិវត្ត.....	147
➢ មេរៀនទី៣ កំណត់ត្រាផ្លូវស៊ីល.....	151
ជំពូក៧ ៖ ពពួក និងសហគមន៍	
➢ មេរៀនទី១ ពពួក.....	156
➢ មេរៀនទី២ អន្តរអំពើក្នុងស្ថានប្រព័ន្ធ.....	161
❖ កម្រងសំណួរប្រៀបធៀប.....	167



ជំពូក១ ស៊ីមណូស្តែម និងអង់ស្យូស្តែម

មេរៀនទី១ ស៊ីមណូស្តែម

1. តើរុក្ខជាតិមានគ្រាប់ (Seed plants) មានប៉ុន្មានក្រុម? អ្វីខ្លះ?

➢ រុក្ខជាតិមានគ្រាប់មានពីរក្រុមគឺ៖

- ស៊ីមណូស្តែម (Gymnosperm) និងអង់ស្យូស្តែម (Angiosperm)។

2. តើស៊ីមណូស្តែមជាអ្វី?

➢ ស៊ីមណូស្តែម ជារុក្ខជាតិមានគ្រាប់ តែគ្មានសំបកការពារពីខាងក្រៅទេ។ វាមានគ្រាប់ននល។

3. តើស៊ីមណូស្តែមមានប៉ុន្មានក្រុម? អ្វីខ្លះ?

➢ ស៊ីមណូស្តែមមាន៤ក្រុម ដូចជា៖ ប្រង់ (Cycads) កូនីផែរ (Conifers) គីងកូ (Ginkgoes) និង ស៊ីណេតូផ៊ីត (Cynetophytes)។

4. ចូរពណ៌នាពីស៊ីមណូស្តែមទាំង៤ក្រុម។

➢ ស៊ីមណូស្តែមទាំង៤ក្រុមគឺ ប្រង់ កូនីផែរ គីងកូ និងស៊ីណេតូផ៊ីត។

➢ ប្រង់ច្រើនដុះនៅតំបន់ត្រូពិច និងតំបន់ក្បែរត្រូពិច។ វាមានស្លឹកដែលប្រមូលផ្តុំនៅខាងចុងដូចស្លឹកឆ្នោត។ កូនីផែរមានស្លឹករាងដូចម្តូល និងមានច្រើនក្រុមជាងគេ។ គ្រាប់ជាអាហាររបស់បក្សីមួយចំនួន និងសត្វកកេរ។ គីងកូមាននៅប្រទេសជប៉ុន ចិន និងកូរ៉េ។ គេចូលចិត្តដាំវានៅតាមដងផ្លូវ ឬក្នុងសួនច្បារ ឬក្នុងទីក្រុង ព្រោះវាធន់នឹងបរិយាកាសកខ្វក់ដោយសារ វាជួយសម្អាតខ្យល់ឱ្យបរិសុទ្ធ។ ចំណែក ស៊ីណេតូផ៊ីត ជារុក្ខជាតិដែលដុះនៅតំបន់វាលខ្សាច់មានអាកាសធាតុក្តៅ និងនៅតំបន់ត្រូពិចមានភ្លៀង។ ស៊ីណេតូផ៊ីតមួយចំនួនជាដើមឈើ ខ្លះជាវល្លិ៍ ខ្លះជាចុល្លព្រឹក្សសម្រាប់ដាំលំអ។ ស៊ីណេតូផ៊ីតអាចរស់បានយូររហូតដល់ពាន់ឆ្នាំ។

5. តើដើមរបស់ស៊ីមណូស្តែមមានលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះ?

➢ ដើមរបស់ស៊ីមណូស្តែមជាដើមឈើធំៗឬតូចៗមិនមានលក្ខណៈជារុក្ខជាតិស្មៅទេ។

➢ ដើមទោល ត្រង់ និងបញ្ចប់ដោយកូនស្លឹកឬកន្សោមមែកនៅកំពូលដើម។

➢ មានទិដ្ឋភាពដូចដើមដូង(ប្រង់) ឬបែកមែកច្រើន(ស្រល់)។



6. តើរុក្ខជាតិស៊ីមណូស្ត្រូមច្រើនដុះនៅកន្លែងណាខ្លះ?

- រុក្ខជាតិស៊ីមណូស្ត្រូមច្រើនដុះនៅតំបន់ត្រូពិច តំបន់ក្បែរត្រូពិច តំបន់ត្រជាក់លើភ្នំ ។
- តំបន់វាលខ្សាច់ មានអាកាសធាតុក្តៅ និងតំបន់ព្រៃត្រូពិចមានឆ្លៀង។

7. តើស្លឹកស៊ីមណូស្ត្រូមមានរាងដូចម្តេចខ្លះ?

- ស្លឹករបស់ស៊ីមណូស្ត្រូមមានរាង ដូចម្ជុល ជាស្រកា ឬរាងជាផ្ចិត។
- ស្លឹកខ្លះមានទ្រនុងស្លឹក និងសភាពដូចស្លឹកដូង(ប្រដំ) ខ្លះមានរាងផ្ចិត ដែលមានទ្រនុងស្លឹក រាងកង្ការ(គីងកូ) ខ្លះមានរាងម្ជុល ដែលមានទ្រនុងស្លឹកតែមួយដោយស្លឹកផ្គុំនៅលើចុងមែកខ្ចី (ស្រល់) ។ ស្លឹកខ្លះរាងស្រកា តម្រៀបគ្របជណ្តប់ផ្ទៃមែកទាំងអស់។

8. តើសរីរាង្គបន្តពូជរបស់ស៊ីមណូស្ត្រូមមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

- សរីរាង្គបន្តពូជរបស់ស៊ីមណូស្ត្រូមភាគច្រើនជាកោន ដែលគ្របជណ្តប់ដោយស្រកា តែខ្លះក៏គ្មានកោនដែរ។
- កោនញី និងកោនឈ្មោល ត្រូវបានផលិតដោយរុក្ខជាតិមួយដើម ឬដោយរុក្ខជាតិពីរដើមផ្សេងគ្នា។

9. តើគ្រាប់លំអងរបស់ស៊ីមណូស្ត្រូមផ្ទុកអ្វី? តើវាត្រូវបានផលិតឡើងនៅឯណា?

- គ្រាប់លំអងរបស់ស៊ីមណូស្ត្រូមផ្ទុកកោសិកាបន្តពូជ និងកោសិកាលូតលាស់។
- គ្រាប់លំអងត្រូវបានផលិតឡើងនៅក្នុងមីក្រូស្ប៉ង់។

10. តើកោនជាអ្វី? ក្នុងការបន្តពូជរបស់ស៊ីមណូស្ត្រូម តើកោនមាននាទីអ្វី?

- កោនជាសរីរាង្គបន្តពូជរបស់ស៊ីមណូស្ត្រូម។
- នៅក្នុងការបន្តពូជរបស់ស៊ីមណូស្ត្រូម កោនមាននាទីផលិតកាម៉ែតញី និងកាម៉ែតឈ្មោល។ ឯកោនញី ជាកន្លែងបង្កកំណើតរាងកាម៉ែតញី និងកាម៉ែតឈ្មោលហើយលូតលាស់ទៅជាអំប្រីយ៉ុងដែលជាផ្នែកមួយនៃគ្រាប់។

11. តើលក្ខណៈស្លឹករាងដូចម្ជុលរបស់កូនីស៊ែ(ស្រល់)មានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចចំពោះរុក្ខជាតិប្រភេទនេះ?

- លក្ខណៈរាងម្ជុលរបស់ស្លឹកកូនីស៊ែ អាចបង្ការការបាត់បង់ទឹក និងជួយឱ្យរុក្ខជាតិនេះបន្ស៊ាំជីវិតទៅនឹងអាកាសធាតុស្ងួត។

12. ហេតុអ្វីបានជាស្លឹករបស់កូនីងមានពណ៌បៃតងពេញៗឆ្នាំ?


- បានជាស្លឹករបស់កូនីងមានពណ៌បៃតងពេញៗឆ្នាំ ព្រោះនៅពេលស្លឹកជ្រុះ វាត្រូវបានជំនួសដោយស្លឹកថ្មីផ្សេងទៀតភ្លាមៗ។

13. ចូរពណ៌នាអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់ស្រល់។

- សារៈប្រយោជន៍របស់ស្រល់មានដូចជា៖ ធ្វើជាសំណង់ គ្រឿងសង្ហារឹម ចម្រាញ់ធ្វើប្រេងសម្រាប់លាបផ្ទះ គ្រាប់ជាអាហាររបស់សត្វកកែវ និងបក្សីមួយចំនួន។

14. តាមរយៈខ្លាតបណ្តោយរបស់កោន តើកោននីមួយៗរបស់ស្រល់មានទម្រង់ដូចម្តេច?

- កោនស្រល់បង្កឡើងដោយអ័ក្សមួយដែលភ្ជាប់ដោយស្រកាតូចៗជាច្រើន។ ចំពោះកោនញី នៅលើផ្លែស្រកានីមួយៗមានផ្ទុកអ័ក្សរូបយ៉ាងតិចមួយហៅថាមេហ្គាស្ប៉័រីង។ រីឯកោនឈ្មោលវិញនៅក្រោមស្រកានីមួយៗមានចងពីរគឺ មីក្រូស្ប៉័រីងដែលមាននាទី ផលិតគ្រាប់លំអង។

**15. ចូរប្រៀបធៀបកោនញី និងកោនឈ្មោលរបស់ស្រល់។**

- ❖ លក្ខណៈដូចគ្នា៖ កោនគ្របដណ្តប់ដោយស្រកា និងមានជាតិស្ព័រតរបស់អ័ក្សដែលការពារកុំឱ្យគ្រាប់លំអងជ្រុះ។

លក្ខណៈខុសគ្នា

កោនញី	កោនឈ្មោល
• មានទំហំធំ • ផលិតបានអ័ក្សរូបពីរ ឬយ៉ាងតិច១ • នៅលើដើមរហូតគ្រាប់ជ្រុះ	• មានទំហំតូច • ផលិតបានគ្រាប់លំអងបានច្រើន • ជ្រុះក្រោយពេលជ្រុះគ្រាប់លំអង



ជំពូក១ ស៊ីមណូស្តែម និងអង់ស្យូស្តែម

មេរៀនទី២ អង់ស្យូស្តែម

1. តើអង់ស្យូស្តែមជាអ្វី?

- អង់ស្យូស្តែម (Angiosperm) ជារុក្ខជាតិមានគ្រាប់ដែលការពារដោយសំបក។

2. តើលក្ខណៈពិសេសរបស់រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្តែមមានអ្វីខ្លះ?


- លក្ខណៈពិសេសរបស់រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្តែមមានដូចជា ផ្កាជាសរីរាង្គភេទ និងមានគ្រាប់ការពារដោយសំបក។

3. តើគ្រាប់ជាអ្វី?

- គ្រាប់ ជាសរីរាង្គពហុកោសិកាដែលមានអំប្រឹប្បីយ៉ុង និងអាហារបម្រុង និងការពារដោយសំបកគ្រាប់រឹង។

4. តើរុក្ខជាតិអង់ស្យូស្តែមចែកចេញជាប៉ុន្មានថ្នាក់? អ្វីខ្លះ?

- រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្តែមចែកចេញជាពីរថ្នាក់សំខាន់ៗគឺ៖
 - រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋន (Monocot plants)
 - រុក្ខជាតិឌីកូទីលេដ្ឋន (Dicot plants) ។



5. តើកូទីលេដ្ឋនជាអ្វី?

- កូទីលេដ្ឋន ជាភ្លែតគ្រាប់ដែលមានអំប្រឹប្បីយ៉ុង(ពន្លកស្លឹក)នៅខាងក្នុងគ្រាប់។

6. តើរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋនជាអ្វី? ចូររាប់ឈ្មោះរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋនឱ្យបាន១០។

- រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋនជារុក្ខជាតិដែលគ្រាប់មានកូទីលេដ្ឋន១។
- ឈ្មោះរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋន៖ ស្រូវ អំពៅ ពោត ដូង ឆ្នោត ស្លឹកត្រៃ ស្លា ស្លឹកតយ ឬស្សី ផ្កាថីថី ម្នាស់ ។ល។



7. តើរុក្ខជាតិឱក្ខទីលេដ្ឋានជាអ្វី? ចូររាប់ឈ្មោះរុក្ខជាតិឱក្ខទីលេដ្ឋានឱ្យបាន១០។

- រុក្ខជាតិឱក្ខទីលេដ្ឋានជារុក្ខជាតិដែលគ្រាប់មានក្បូងលេដ្ឋាន២។
- ឈ្មោះរុក្ខជាតិឱក្ខទីលេដ្ឋានមានដូចជា ស្វាយ ម្កាក់ ខ័រ្សិក ឈ្មៅ ត្រសក់ ក្រូច ជំឡូង ប៉េងប៉ោះ ល្មុត ប៉ោម ផ្លែ ស្លឹកបាស ននោង ។ល។

8. តើបុសររបស់រុក្ខជាតិមាននាទីអ្វី?

- បុសមាននាទីចងក្រងរុក្ខជាតិទៅនឹងដី ។
- ស្រូបទឹក និងអំបិលខនិងពីដីទៅកាន់ដើមនិងស្លឹក។

9. តើដើមរុក្ខជាតិមាននាទីអ្វី?

- ដើមមាននាទីទ្រទ្រង់ផ្នែកដែលនៅលើដីរបស់រុក្ខជាតិ និងដឹកនាំសារធាតុរាវរាងបុស និងស្លឹក។
- ដើមខ្លះអាចស្តុកអាហារផ្សេងៗដូចជា ដើមអំពៅ មើមខ្លឹមបារាំង មើមជំឡូងបារាំង។ល។
- ដើមខ្លះក៏អាចធ្វើស្នូសំយោគសម្រាប់ផលិតអាហារផងដែរ។

10. តើជាលិកាសំខាន់នៅក្នុងដើមជាអ្វី?

- ជាលិកាសំខាន់នៅក្នុងដើមគឺ ជាលិកាសំ ឬបាច់សរសៃសំ (ស៊ីឡេម និងផ្លូអែម)។

11. តើស៊ីឡេម និងផ្លូអែមមាននាទីដូចម្តេច?

- ស៊ីឡេមមាននាទីដឹកនាំទឹក និងអំបិលខនិងពីបុសទៅកាន់ដើម និងស្លឹក។
- ផ្លូអែមមាននាទីដឹកនាំអាហារដែលផលិតបានពីស្លឹក ឬកោសិកាដែលធ្វើស្នូសំយោគទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់រុក្ខជាតិ។

12. តើស្រទាប់មេជាអ្វី? ស្ថិតនៅឯណា? មាននាទីអ្វី?

- ស្រទាប់មេ ជាជាលិកាដែលស្ថិតចន្លោះស៊ីឡេម និងផ្លូអែម។
- វាមាននាទីផលិតស៊ីឡេម និងផ្លូអែមថ្មីៗ។

13. តើស៊ីឡេម និងផ្លូអែមកើតឡើងពីស្រទាប់កោសិកាអ្វី?

- ស៊ីឡេម និងផ្លូអែមកើតឡើងពីស្រទាប់កោសិកាមេដែលស្ថិតនៅចន្លោះបាច់សរសៃសំទាំងពីរ។

14. តើស្លឹកមាននាទីអ្វី?


- ស្លឹកមាននាទីធ្វើស្នូសំយោគដើម្បីផលិតអាហារឱ្យរុក្ខជាតិ។

15. ហេតុអ្វីបានជាស្លឹកមានពណ៌បៃតង?

- ស្លឹកមានពណ៌បៃតងដោយសារមានផ្ទុកជាតិពណ៌បៃតងគឺ ក្លរ៉ូផ្កីល។

16. ចូរពណ៌នាពីទម្រង់ក្នុងនៃស្លឹកឌីកូទីលេដូន។

- នៅក្នុងស្លឹកមានស្រទាប់អេពីឌែមលើ និងអេពីឌែមក្រោម ស្រទាប់ប៉ាលីសាត និងស្រទាប់ស្ពោត។
- ស្រទាប់អេពីឌែមមាននាទីការពារផ្ទៃស្លឹករុក្ខជាតិ និងមានរន្ធតូចៗសម្រាប់បណ្តុះខ្លួន។
- ស្រទាប់ប៉ាលីសាតមានកោសិកាដែលមានក្លរ៉ូប្លាស្ទផ្ទុកក្លរ៉ូផ្កីល សម្រាប់ធ្វើស្វ័យសំយោគ។
- ស្រទាប់ស្ពោតមានរន្ធខ្វល់(លំហខ្វល់)ជាច្រើន និង មានផ្ទុកសរសៃនាំផងដែរ។



17. តើផ្កាជាអ្វី?

- ផ្កា ជាសរីរាង្គបន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្តែម។

18. តើផ្កាអាចទាក់ទាញសត្វល្អិត និងសត្វផ្សេងៗបានដោយសារអ្វី?

- ផ្កាអាចទាក់ទាញសត្វល្អិត និងសត្វផ្សេងៗបានដោយសារពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយ និងក្លិនក្រអូបដែលចេញពីស្រទាប់របស់វា។

19. តើផ្នែកផ្សេងៗរបស់ផ្កាមានអ្វីខ្លះ?

- ផ្នែកផ្សេងៗរបស់ផ្កាមាន៖ ត្របកផ្កា ស្រទាប់ផ្កា កញ្ចក់កេសរញី (អង្ករ កេសរញី និងស្និមមាត) និង កញ្ចក់កេសរល្អោល (ទងកេសរល្អោល និងប្លោកលំអង)។



20. តើផ្នែកនីមួយៗរបស់ផ្កាមាននាទីដូចម្តេច? ចូរប្រាប់។

- ត្របកផ្កា ភាគច្រើនមានពណ៌ដូចស្លឹកសម្រាប់ការពារផ្កាពេលក្រពុំ ខ្លះក៏មានពណ៌ផង។
- ស្រទាប់ផ្កា មានពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយ ឬក្លិនក្រអូបសម្រាប់ទាក់ទាញសត្វល្អិត។
- ស្លឹកម៉ាត មានភាពស្អិត សម្រាប់ទទួលគ្រាប់លំអង។
- កកសេរញី បំពង់បន្តពីអូរទៅស្លឹកម៉ាត។
- អូរ ផ្ទុកអូរល្អិត។
- ទងកេសរឈ្មោល សម្រាប់ទ្រទ្រង់ប្លោកលំអង។
- ប្លោកលំអងសម្រាប់ផ្ទុកគ្រាប់លំអង។

21. តើកញ្ចក់កេសរញីមានប៉ុន្មានផ្នែក? អ្វីខ្លះ?

- កញ្ចក់កេសរញីមានបីផ្នែក គឺ៖
 - ស្លឹកម៉ាត (មានទំហំធំ និងមានសភាពស្អិតសម្រាប់ទទួលគ្រាប់លំអង)។
 - កកសេរញី ជាជើងទម្រង់របស់ស្លឹកម៉ាត។
 - អូរ ជាផ្នែកបាតនៃកញ្ចក់កេសរញីដែលមានអូរល្អិតឬច្រើន។ ផ្កាមួយអាចមាន កញ្ចក់កេសរញីមួយ ឬច្រើន។

22. តើស្លឹកម៉ាតជាអ្វី?

- ស្លឹកម៉ាត ជាផ្នែកកំពូលនៃកញ្ចក់កេសរញីដែលមានទំហំធំ និងសភាពស្អិតសម្រាប់ទទួលគ្រាប់លំអង។

23. តើកញ្ចក់កេសរឈ្មោលមានប៉ុន្មានផ្នែក? អ្វីខ្លះ?


- កញ្ចក់កេសរឈ្មោលមានពីរផ្នែក គឺ៖
 - ផ្នែកទី១ មានរាងជាសរសៃឆ្មារៗ ហៅថាទងកេសរឈ្មោល។
 - ផ្នែកទី២ មានរាងជាថង់ ស្ថិតនៅចុងទងកេសរឈ្មោល ហៅថាប្លោកលំអង។ គ្រាប់លំអងត្រូវបានផលិតនៅក្នុងប្លោកលំអង។ ផ្កាមួយមានកេសរឈ្មោលមួយ ឬច្រើន។

24. តើភាពស្អិតរបស់ស្លឹកម៉ាតមានប្រយោជន៍អ្វី?

- ភាពស្អិតរបស់ស្លឹកម៉ាត គឺសម្រាប់ទទួលគ្រាប់លំអងកុំឱ្យជ្រុះ។



គ្រាប់លំអងដែលជាប់នឹងសត្វល្អិតក៏ធ្លាក់លើស្ទឹងម៉ាតរបស់ផ្កានោះ។




31. តើគ្រាប់លំអងជាអ្វី?

- គ្រាប់លំអង ជាមីក្រូស្ប័រអាប្លូអ៊ីត(n)ដែលលូតលាស់ចែកខ្លួនតាមមីតូស១ដងក្នុងប្លែកលំអង។ វាមានណ្វៃយ៉ូពីរគឺ ណ្វៃយ៉ូលូតលាស់ និងណ្វៃយ៉ូបន្តពូជ។

32. ចូរពណ៌នាអំពីកំណាគ្រាប់លំអង។

- ប្លែកលំអងផ្ទុកកោសិកាមេ(មីក្រូស្ប័រនីត)ដែលមាន $2n$ ក្រូម៉ូសូម។ កោសិកាមេនីមួយៗរងចំណែកមេយ៉ូសបានជាស្ប័រអាប្លូអ៊ីត(n)ចំនួន4។ បន្ទាប់មក ស្ប័រនីមួយៗចែកខ្លួនតាមមីតូស ហើយលូតលាស់ ទៅជាគ្រាប់លំអង។ គ្រាប់លំអងនីមួយៗមានណ្វៃយ៉ូអាប្លូអ៊ីតពីរ គឺណ្វៃយ៉ូលូតលាស់មួយ និងណ្វៃយ៉ូបន្តពូជមួយ។ ពេលគ្រាប់លំអងទុំ ប្លែកលំអងផ្ទុះបែក ហើយបញ្ចេញគ្រាប់លំអងទៅក្នុងខ្យល់។



33. ហេតុអ្វីបានជាគេថាគ្រាប់លំអងមិនមែនជាកាម៉ែតឈ្មោល?


- គ្រាប់លំអងមិនមែនជាកាម៉ែតឈ្មោលទេ ព្រោះគ្រាប់លំអងជាកោសិកាដែលមានណ្វៃយ៉ូពីរគឺ

វិទ្យាស្ថានសត្វលោក និងវិទ្យាស្ថានបុគ្គលិក។

- ឆ្នោយ្យទី១ (ឆ្នោយ្យលូតលាស់)៖ ស្ថិតនៅខាងចុងបំពង់លំអងហាក់បីដូចជាអ្នកនាំដំណើរការលូតលាស់បំពង់លំអងហើយរលាយបាត់។
- ឆ្នោយ្យទី២ (ឆ្នោយ្យបន្តពូជ)៖ ចែកខ្លួនតាមមីតូសមួយដង បង្កើតបានជាកាម៉ែតឈ្មោលពីរ (ស្ត្រីម៉ាតូសូអ៊ីត) ដែលគ្មានផ្លាសែល ហើយកាម៉ែតឈ្មោលទាំងពីរក៏ចូលទៅក្នុងថង់កំណររុំល។ ដូចនេះគ្រាប់លំអងមិនមែនជាកាម៉ែតឈ្មោលទេ គឺជាអ្នកបង្កើតកាម៉ែតឈ្មោល។

34. ចូរពណ៌នាអំពីកំណែចង់អ្វីប្រៀបប្រដាន។

- ដំណើរកំណត់ថង់អំប៊ូប៊ីយ៉ុង៖ អូស៊ុលនៅក្នុងអូស៊ុលដោយការភ្ជាប់នឹងភ្នាសរបស់អូស៊ុល។ ផ្នែកខាងលើនៃអូស៊ុល នីមួយៗមានមីក្រូពីលមួយ។ នៅក្នុងអូស៊ុល កោសិកាមេ1រងចំណែកមេយ៉ូសបង្កើតបានមេហ្គាស្ប៍ ដែលមានស្ប៍អាប្លូអ៊ីត4 ដែលក្នុងនោះងាប់3និងរស់1។ ស្ប៍រស់1នេះធ្វើចំណែកមីតូស3ដងបន្តបន្ទាប់បង្កើតបានជាឡែយ៉ូអាប្លូអ៊ីត 8គឺជាថង់កំណា។ ថង់កំណាមានកោសិកាចំនួន7តែមានឡែយ៉ូអាប្លូអ៊ីតដល់ទៅ8។ កោសិកាទាំងនេះនៅកណ្តាលមានឡែយ៉ូ2 ហៅថាឡែយ៉ូប៉ូលែ។ កោសិកាទាំងនេះហៅថាអូស៊ុលី ដែលនៅចន្លោះកោសិកាស៊ីណេប៊ីត2 ជាប់នឹងមីក្រូពីល និងកោសិកាអង់ទីប៉ូត3ទៀតដែលនៅប៉ូលម្ខាងទៀតនៃថង់កំណា។



35. ចំពោះរុក្ខជាតិអង្គស្បូវស្តុម គេថាអ្នករុករានមិនមែនជាការមើតឈ្មោះទេ។ ចូរបញ្ជាក់។

- អ្នករូបមិនមែនជាកាមីតឈ្មោះទេ ព្រោះនៅក្នុងដំណើរកំណត់អំប្រើប្រាស់ កោសិកាមេ1ក្នុងអ្នករូបលូតលាស់ទៅជាថង់កំណែដែលមានកោសិកាចំនួន7 ប៉ុន្តែមានឈ្មោះដល់ទៅ8។ ក្នុងនោះ៖



ការម៉ែតញ្ជីមួយបានកើតចេញពីដំណើរនេះហៅថាអូសូស្ត្រី ដែលនឹងបង្កកំណើតជាមួយស្ត្រីម៉ាតូសូ អ៊ីតមួយក្លាយជាស៊ីកូត។

36. តើដំណុះគ្រាប់លំអងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេច ក្រោយពេលធ្លាក់លើស្ទឹងម៉ាត?

➢ ដំណុះគ្រាប់លំអងប្រព្រឹត្តទៅដូចតទៅ៖ នៅពេលដែលគ្រាប់លំអងធ្លាក់លើស្ទឹងម៉ាត វាក៏ដុះ ពន្លកឡើង ហើយពន្លតខ្លួនចាក់ចូលទៅក្នុងជាលិកានៃកោសិកាញើរហូតដល់អូសូស្ត្រី។ ណ្ឌូយ៉ូទាំងពីរធ្វើ ដំណើរក្នុងបំពង់លំអង។ ណ្ឌូយ៉ូទី១រលាយបាត់ទៅវិញ ឯណ្ឌូយ៉ូទី២ចែកខ្លួនតាមមីតូសបង្កើតបានជា ស្ត្រីម៉ាតូសូអ៊ីតពីរ។

37. តើការបង្កកំណើតរបស់រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្ត្រីមប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលណា?

➢ ការបង្កកំណើតប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលគ្រាប់លំអងធ្លាក់លើស្ទឹងម៉ាតរបស់ផ្កានោះ។

38. តើការបង្កកំណើតរបស់រុក្ខជាតិមានផ្កា (ឬរុក្ខជាតិអង់ស្យូស្ត្រីម) ប្រព្រឹត្តទៅដូចម្តេច?


➢ ការបង្កកំណើតរបស់រុក្ខជាតិមានផ្កា៖ នៅពេលគ្រាប់លំអងទុំ ប្លោកលំអងផ្ទះបែកបញ្ចេញ គ្រាប់លំអងទៅកាន់ស្ទឹងម៉ាត។ នៅលើស្ទឹងម៉ាតគ្រាប់លំអងដុះពន្លករួចពន្លតខ្លួនចាក់ចូលទៅក្នុងជាលិកា នៃ កោសិកាញើរហូតដល់អូសូស្ត្រី។ ណ្ឌូយ៉ូទី១ (ណ្ឌូយ៉ូលូតលាស់)រលាយបាត់ទៅវិញ ឯណ្ឌូយ៉ូទី២ (ណ្ឌូយ៉ូបន្ត ពូជ) ធ្វើដំណើរក្នុងបំពង់លំអងរហូតដល់គោលដៅ រួចធ្វើចំណែកតាមមីតូសបានស្ត្រីម៉ាតូសូអ៊ីត (អង់តេរ្យ សូអ៊ីត) ២ដែលគ្មានផ្លាសែល ។

39. ដូចម្តេចដែលហៅថាការបង្កកំណើតទ្វេ? ចូររៀបរាប់។

- ការបង្កកំណើតទ្វេ ជាការបង្កកំណើតពីរដងក្នុងពេលតែមួយ។
- នៅក្នុងការបង្កកំណើតទ្វេ ស្ត្រីម៉ាតូសូអ៊ីតមួយក្នុងចំណោមស្ត្រីម៉ាតូសូអ៊ីតទាំងពីរបង្កកំណើត ជាមួយការម៉ែតញ្ជី ហើយបង្កើតបានជាស៊ីកូតឌីប្លូអ៊ីតមួយដែលនឹងលូតលាស់ទៅជាអំប្រីយ៉ុង។ ស្ត្រីម៉ាតូ សូអ៊ីតមួយទៀត រលាយជាមួយណ្ឌូយ៉ូប៉ូលែបង្កើតបានជាអាល់ប៊ុយមែន។

40. តើអ្វីជាលទ្ធផលដែលបានពីការបង្កកំណើតរបស់រុក្ខជាតិមានផ្កា (ឬ អង់ស្យូស្ត្រីម)?

➢ លទ្ធផលនៃរុក្ខជាតិមានផ្កាគឺ ស៊ីកូត (2n) ដែលលូតលាស់ទៅជាអំប្រីយ៉ុង។ វិវឌ្ឍន៍អាល់ប៊ុយមែន ទ្រីប្លូអ៊ីត (3n) ដែលជាម៉ាសកោសិកាមួយផ្ទុកអាហារបម្រុង។



41. តើវដ្តជីវិតរបស់រុក្ខជាតិមានផ្លាមានប៉ុន្មានដំណាក់? អ្វីខ្លះ?

- វដ្តជីវិតរបស់រុក្ខជាតិមានផ្លាមានពីរដំណាក់កាលគឺ៖ ដំណាក់ផ្កា និងដំណាក់គ្រាប់។
- ក្នុងផ្ការុក្ខជាតិមានប្លាស្ទូមដែលផលិតគ្រាប់លំអង។ ក្រោយចែកខ្លួនតាមមីតូស ណ្វៃយ៉ូទី២ របស់គ្រាប់លំអងបង្កើតបានជាផ្លែម៉ាតូសូអ៊ីត²។ អូវុលផ្ទុកអូវុល។ ក្រោយមេយ៉ូស កោសិកាមេក្នុងអូវុល បង្កើតបានស្ប៍ អាបូអ៊ីត⁴។ ក្រោយពីស្ប៍ទាំង៣ដាច់មានស្ប៍តែមួយគត់ដែលចែកខ្លួន៣ដង តាមមីតូស ហើយបង្កើតបានជាថង់កំណ ដោយមានកោសិកា៧តែមានណ្វៃយ៉ូ⁸។ ក្នុងថង់កំណនេះមាន អូវុល១ ដែលបង្កកំណើតជាមួយផ្លែម៉ាតូសូអ៊ីត ហើយផ្តល់ជាស៊ីកូត រួចលូតលាស់ជាអំប្រើយ៉ុង។
- អំប្រើយ៉ុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រាប់ដែលមានសំបកការពារ។ គ្រាប់ជុះបង្កើតបានជារុក្ខជាតិថ្មី។

42. តើអង្គដូស្តែមជាអ្វី?

- ជាជាលិកាទ្រីបូអ៊ីតដែលមានផ្ទុកអាហារបម្រុង សម្រាប់អំប្រើយ៉ុងរុក្ខជាតិនៅក្នុងគ្រាប់។

43. តើរុក្ខជាតិអង្គដូស្តែមមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះ?

- ជាប្រភពអាហារ ជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ ជាគ្រឿងសំណង់ និងគ្រឿងសង្ហារឹម ជាប្រភពសម្រាប់ផលិតក្រដាស ជាប្រភពប្រេងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ជាប្រភពសម្រាប់ផលិត កំណាត់ឬ សរសៃអំបោះ រីឯជីវកោសិកាអាចយកទៅធ្វើជាកង់ថយគ្រឿង និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតដែល បម្រើឱ្យសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្ស។



44. តើគេសម្គាល់គ្រាប់រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋនបានដោយសារអ្វី?

- គេសម្គាល់គ្រាប់រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋន បានដោយសារគ្រាប់មានកូទីលេដ្ឋឯមួយ។

45. តើគេសម្គាល់ផ្ការុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋនបានដោយសារអ្វី?

- គេសម្គាល់ផ្ការុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋន បានដោយសារផ្កាមានបីស្រទាប់ ឬពហុគុណនៃបី។

46. តើគេសម្គាល់ស្លឹករុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋនបានដោយសារអ្វី?

- គេសម្គាល់ស្លឹករុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋនបានដោយសារស្លឹកមានទ្រនុងស្លឹកស្រប។

47. តើគេសម្គាល់បួសរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋនបានដោយសារអ្វី?

- គេសម្គាល់បួសរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋនបានដោយសារបួសជាបួសស្មើ។

48. តើគេសម្គាល់បាច់សរសៃនាំរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋនបានដោយសារអ្វី?

- គេសម្គាល់បាច់សរសៃនាំរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋនបានដោយសារបាច់សរសៃនាំរាយប៉ាយ។

49. តើគេសម្គាល់គ្រាប់រុក្ខជាតិឌីកូទីលេដ្ឋនបានដោយសារអ្វី?

- គេសម្គាល់គ្រាប់រុក្ខជាតិឌីកូទីលេដ្ឋនបានដោយសារគ្រាប់មានកូទីលេដ្ឋពីរ។

50. តើគេសម្គាល់ផ្ការុក្ខជាតិឌីកូទីលេដ្ឋនបានដោយសារអ្វី?

- គេសម្គាល់ផ្ការុក្ខជាតិឌីកូទីលេដ្ឋនបានដោយសារផ្កាមាន4ទៅ5ស្រទាប់ ឬពហុគុណនៃ4 ឬ 5។

51. តើគេសម្គាល់ស្លឹករុក្ខជាតិឌីកូទីលេដ្ឋនបានដោយសារអ្វី?

- គេសម្គាល់ស្លឹករុក្ខជាតិឌីកូទីលេដ្ឋនបានដោយសារស្លឹកមានទ្រនុងបែកខ្លែង។

52. តើគេសម្គាល់បួសរុក្ខជាតិឌីកូទីលេដ្ឋនបានដោយសារអ្វី?

- គេសម្គាល់បួសរុក្ខជាតិឌីកូទីលេដ្ឋនបានដោយសារ បួសជាបួសកែវ។

53. តើគេសម្គាល់បាច់សរសៃនាំរុក្ខជាតិឌីកូទីលេដ្ឋនបានដោយសារអ្វី?

- គេសម្គាល់បាច់សរសៃនាំរុក្ខជាតិឌីកូទីលេដ្ឋនបានដោយសារបាច់សរសៃនាំស្ថិតនៅជាន់រួង។

54. ហេតុអ្វីបានជាគេថាស្រូវ និងពោត ជារុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋន?

- ស្រូវ និងពោតជារុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋន ព្រោះគ្រាប់របស់វាមានកូទីលេដ្ឋឯមួយ ស្លឹករបស់វាមានទ្រនុងស្រប ផ្កាមានបីស្រទាប់ បួសជាបួសស្មើ និងមានបាច់សរសៃនាំរាយប៉ាយ។

55. ហេតុអ្វីបានជាគេថាស្វាយជារុក្ខជាតិឌីកូទីលេដ្ឋន?



- ស្វាយ ជារុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន ព្រោះគ្រាប់របស់វាមានកូទីលេដូនពីរ ស្លឹករបស់វាមានទ្រនុងបែកខ្លែង ផ្កាមានប្រាំស្រទាប់ ឬសជាឫសកែវ និងមានបាច់សរសៃនាំស្ថិតនៅជាន់រង្វង់។

56. តើគេសម្គាល់រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនដោយសារអ្វី?

- គេសម្គាល់រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនដោយសារគ្រាប់មានកូទីលេដូន១ ស្លឹកវែងមានទ្រនុងស្រប ផ្កាមានបីស្រទាប់ ឬសជាឫសស្មើ និង មានបាច់សរសៃនាំស្ថិតនៅរាយប៉ាយ។

57. តើគេសម្គាល់រុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនដោយសារអ្វី?

- គេសម្គាល់រុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនដោយសារគ្រាប់មានកូទីលេដូន២ ស្លឹកមានទ្រនុងបែកខ្លែង ច្រើន ផ្កាមានបួន ឬប្រាំស្រទាប់ ឬសជាឫសកែវ និងមានបាច់សរសៃនាំស្ថិតនៅជាន់រង្វង់។

58. ចូរប្រៀបធៀបរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងរុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន។

- ចំណុចដូចគ្នា៖ ជារុក្ខជាតិអង្ករស្បែក ជារុក្ខជាតិមានគ្រាប់ដែលការពារដោយសំបកគ្រាប់ មានកូទីលេដូន និងជារុក្ខជាតិមានសរសៃនាំ។

ចំណុចខុសគ្នា៖

រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន	រុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន
• គ្រាប់មានកូទីលេដូន១ • ស្លឹកវែងមានទ្រនុងស្រប • ផ្កាមានបីស្រទាប់ • ឫសជាឫសស្មើ • បាច់សរសៃនាំស្ថិតនៅរាយប៉ាយ	• គ្រាប់មានកូទីលេដូន២ • ស្លឹកមានទ្រនុងបែកខ្លែង • ផ្កាមានបួន ឬ ប្រាំស្រទាប់ • ឫសជាឫសកែវ • បាច់សរសៃនាំស្ថិតនៅជាន់រង្វង់

	គ្រាប់	ឫស	បាច់សរសៃនាំ	ស្លឹក	ផ្កា
ម៉ូណូកូទីលេដូន	 កូទីលេដូន ១	 ឫសស្មើ	 ស្ថិតនៅរាយប៉ាយ	 ទ្រនុងស្រប	 ៣ស្រទាប់
ឌីកូទីលេដូន	 កូទីលេដូន២	 ឫសកែវ	 ស្ថិតនៅជារង្វង់	 ទ្រនុងបែកខ្លែង	 ៤ ឬ ៥ស្រទាប់

ជំពូក៣ តម្រូវផ្សេងៗរបស់សារពាង្គកាយ


មេរៀនទី១ តម្រូវប្រសាទ

1. ចូរពណ៌នាអំពីប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់អាមីប។

- អាមីបគ្មានសរីរាង្គពិសេស ប៉ុន្តែវាអាចដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងអាហារ និងវត្ថុផ្សេងៗ។
- វាទទួលរំញោចបានដោយវិធីសម្របសម្រួល ពិសេសរបស់វា។
- អាចផ្លាស់ទីឆ្ងាយពីវត្ថុនោះ ឬក៏ សារធាតុគីមី និងពន្លឺខ្លាំងជាដើម....។

2. ចូរពណ៌នាអំពីប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់ប៉ារ៉ាមេស៊ី។

- ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់ប៉ារ៉ាមេស៊ីមានប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងស្ថិតនៅគល់រោមញ័រ (ត្រួតពិនិត្យចលនារោមញ័រនាំឱ្យវាអាចឆ្លើយតបនឹងរំញោចផ្សេងៗ)។ រោមញ័រពិសេសទាំងនោះមាននាទីដូច ណឺរ៉ូនរបស់សត្វថ្នាក់ខ្ពស់ដែរ។ វាអាចផ្លាស់ទីទៅរកអាហារ ឬគេចចេញពីសារធាតុពុល ឬឧបសគ្គ។




3. ចូរពណ៌នាអំពីប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់អ៊ីត។

- ប្រព័ន្ធប្រសាទអ៊ីតមានលក្ខណៈជាបណ្តាញសរសៃប្រសាទគ្របពាសពេញសារពាង្គកាយ ដោយសារការតភ្ជាប់គ្នាពីណឺរ៉ូនមួយទៅណឺរ៉ូនមួយទៀត។ វាគ្មានមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ (គ្មានខួរក្បាល)ទេ។
- កោសិកាវិញ្ញាណផ្គុំគ្នាច្រើននៅក្បែរមាត់។ វាជាកោសិកាប្រសាទដែលមានសមត្ថភាពទទួលយកព័ត៌មាន ឬរំញោចពីបរិស្ថាន។
- កោសិកាវិញ្ញាណផ្គុំគ្នាក្លាយជាភិបប្រសាទ និងបង្កើតបានជាបណ្តាញសរសៃប្រសាទ។ កាលណា

ប្រមោល ឬផ្នែកណាមួយប៉ះជាមួយនឹងអាហារ អាំងត្យូប្រសាទធ្វើដំណើរយឺតៗទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗនៃសារពាង្គកាយ។ វាឆ្លើយតបដោយបង្វិលខ្លួនយឺតៗ ហើយប្រមោល ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីចាប់អាហារចូលក្នុងមាត់។

4. ចូរពណ៌នាអំពីប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់ជន្លេន។

- ប្រព័ន្ធប្រសាទជន្លេនមានលក្ខណៈស្មុគ្រស្មាញជាងប៉ារ៉ាមេស៊ី និងអ៊ីត។
- វាមានមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ និងបរិមណ្ឌលប្រសាទ ដែលកើតឡើងពីខួរក្បាល កង់គ្លីយ៉ុង និងសរសៃប្រសាទ ចំហៀង។ ផ្ទុលវិញ្ញាណនៅក្នុងស្បែករបស់ជន្លេនមានភាពរួសនឹងពន្លឺ កម្ដៅ សារធាតុគីមី រំញ័រ....។
- ខួរក្បាលជន្លេនកើតពីកង់គ្លីយ៉ុង១គូ។
- ប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វថ្នាក់ខ្ពស់ក៏មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងជន្លេនដែរ។



ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់ជន្លេន



5. ចូរពណ៌នាអំពីប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់កណ្តុប។

- ប្រព័ន្ធប្រសាទកណ្តុបមានមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ និងបរិមណ្ឌលប្រសាទដែលរួមមានខួរក្បាល សរសៃប្រសាទពោះវីងមួយគូ និងកង់គ្លីយ៉ុងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដងខ្លួន។
- សរីរាង្គវិញ្ញាណកណ្តុប (វិវត្តខ្ពស់ជាងជន្លេន)ដែលមានដូចជា ពុក ផ្អែក និងជីវ្ហាវិញ្ញាណ។
- វាជាសត្វរួសទៅនឹងសម្លេង។

6. តើប្រព័ន្ធប្រសាទប្រូទីស អ៊ីត ជន្លេន មានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ?


- ប្រូទីសគ្មានប្រព័ន្ធប្រសាទពិតប្រាកដទេ ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅនឹងរំញ័រចតាមរបៀបសម្របសម្រួល។



- អ៊ីតមានប្រព័ន្ធប្រសាទដែលមានលក្ខណៈជាបណ្តាញសរសៃប្រសាទ។ វាគ្មានមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទទេ។ ប៉ុន្តែវាអាច ឆ្លើយតបទៅនឹងរំញោចតាមរបៀបសម្របសម្រួល។
- ប្រព័ន្ធប្រសាទជន្លេន និងកណ្តុបមានមជ្ឈមណ្ឌល និងបរិមណ្ឌលប្រសាទ។ ជន្លេនមានតែស្បែកជាសរីរាង្គវិញ្ញាណ។ ប៉ុន្តែកណ្តុបមានសរីរាង្គវិញ្ញាណច្រើន ដូចជាភ្នែក ពុក និងដំប្លាវិញ្ញាណ។

7. តើរូបផ្ទុំប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?

- រូបផ្ទុំប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះបីគឺ៖
 - ✓ មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ
 - ✓ សរសៃប្រសាទនាំព័ត៌មានទៅខួរក្បាល
 - ✓ សរសៃប្រសាទទទួលបញ្ជាពីខួរក្បាល



8. ចូរបកស្រាយអំពីគំនូសបំព្រួញប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកង។

- ❖ ប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកងមានពីរផ្នែកដែលមាននាទីផ្ទុយគ្នាគឺ៖
 - មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ(ខួរក្បាលនិងខួរឆ្អឹងខ្នង)ដែលជាកន្លែងទទួលព័ត៌មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទ។
 - បរិមណ្ឌលប្រសាទ មានផ្លូវប្រសាទ (សរសៃប្រសាទ) ទាំងអស់នៃសារពាង្គកាយ ក្រៅពីខួរក្បាល និងខួរឆ្អឹងខ្នង។
 - សរសៃប្រសាទវិញ្ញាណនាំ (នាំព័ត៌មានទៅខួរក្បាល)៖ សរសៃប្រសាទវិញ្ញាណនាំមានសរីរាង្គ




វិញ្ញាណទាំង៥ ដែលទទួលរំញោចហើយ បញ្ជូនព័ត៌មានទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ។

- សរសៃប្រសាទចលករ (ម៉ូទ័រ) ទទួលបញ្ជាពីខួរក្បាលមកវិញ៖ ចែកជាបីប្រព័ន្ធគឺ ប្រព័ន្ធប្រសាទឆន្ទៈដែលបញ្ជាពីសាច់ដុំជាប់ឆ្អឹង។ ប្រព័ន្ធប្រសាទអឆន្ទៈឆ្លាចក្រពេញ និងបញ្ជាសាច់ដុំនៃសរីរាង្គ។ ប្រព័ន្ធទី៣ជាប្រព័ន្ធណឺរ៉ូន-អង់ដូគ្រីនដែលឆ្លាចក្រពេញឱ្យផលិតអរម៉ូន។

9. តើខួរក្បាលសត្វឆ្អឹងកងទាំងប្រាំថ្នាក់មានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ?

- ចំពោះសត្វឆ្អឹងកង ខួរក្បាល (អឌ្ឍគោលខួរ និងខួរតូច) មានការលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំង និងមានសរីរាង្គវិញ្ញាណយ៉ាងច្រើន។ ទំហំ និងលក្ខណៈស្មុគស្មាញរបស់អឌ្ឍគោលខួរ និងខួរតូចរីកចម្រើនពីថ្នាក់ត្រីដល់ថនិកសត្វ។ ចំពោះសត្វថ្នាក់ខ្ពស់ អឌ្ឍគោលខួរជាកន្លែង ទទួល បកស្រាយ និងកំណត់នូវការឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានរបស់សរីរាង្គវិញ្ញាណ។
- ចំពោះត្រី កង្កែប និងល្អិត អឌ្ឍគោលខួរ និងខួរតូចមានទំហំតូច។ ចំណែកបក្សី និងថនិកសត្វ វាមានទំហំធំ ព្រមទាំងមានផ្ទុកច្រើនដែលបង្កើនទំហំផ្ទៃខួរក្បាល។



10. តើខួរក្បាលរបស់មនុស្សមានលក្ខណៈដូចម្តេច បើធៀបជាមួយសត្វឆ្អឹងកងផ្សេងទៀត?

- ចំពោះមនុស្ស ខួរក្បាលអភិវឌ្ឍប្រសើរឡើង បើប្រៀបធៀបនៅក្នុងចំណោមសត្វទាំងអស់។ គេតែងគិតថា មានតែមនុស្សទេ ទើបអាចមើលឃើញ ស្តាប់លឺ ឬដឹងពីអ្វីដែលកើតមានក្នុង ពិភពលោកជាងសត្វដទៃទៀត។ ប៉ុន្តែនេះផ្ទុយពីការពិតទាំងស្រុង ព្រោះត្រី អណ្តើក មួយចំនួន និងបក្សីភាគច្រើនអាចមើលឃើញពណ៌ច្បាស់ជាងមនុស្ស។ សត្វឆ្អែក ប្រចៀវ និងផ្សោត មាន ភាពរួសនឹង



សម្លេងខ្ពស់ជាងមនុស្សទៅទៀត ទោះបីជាសម្លេងស្រាលក៏ដោយ។ សរីរាង្គយានវិញ្ញាណរបស់
មនុស្សមានអានុភាពទាបជាងគេ បើប្រៀបធៀបជាមួយផ្កែ ឆ្មា...។

11. តើប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឥតឆ្អឹងកង និងប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកងខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ?

ភាពខុសគ្នានៃប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឥតឆ្អឹងកង និងប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកង	
ប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឥតឆ្អឹងកង	ប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកង
-មានសរីរាង្គវិញ្ញាណតិច (កណ្តាប់) -ខួរក្បាលមានទំហំតូច និងមានលក្ខណៈសាមញ្ញ (មិនស្មុគស្មាញ) -គ្មានអង្គគោលខួរ និងខួរតូចទេ	-មានសរីរាង្គវិញ្ញាណច្រើន -ខួរក្បាលមានទំហំធំ និងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ -មានអង្គគោលខួរ ខ្លះតូច និងខ្លះធំ

12. តើប្រព័ន្ធប្រសាទមនុស្សមាននាទីប៉ុន្មានយ៉ាង? អ្វីខ្លះ? ចូរប្រាប់។

- ប្រព័ន្ធប្រសាទមាននាទី៣យ៉ាងគឺ៖
- **ការទទួលព័ត៌មាន៖** យើងអាចដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួន។ ឧទាហរណ៍៖ យើងដឹងថាមានមូសហើរក្បែរត្រចៀក។ យើងដឹងថាមានរូបភាពរបស់វត្ថុជុំវិញ។ ឯនៅក្នុងខ្លួនវិញ សារពាង្គកាយដឹងពីកម្រិតគ្រុយកូសក្នុងឈាម កង្វះជាតិទឹកក្នុងឈាមជាដើម។
 - **ការឆ្លើយតបនឹងព័ត៌មាន៖** នៅពេលយើងទទួលបានសញ្ញា ឬការប្រែប្រួលណាមួយ ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ ដែលធ្វើឱ្យសារពាង្គកាយរបស់យើងមានប្រតិកម្មតបនឹងសញ្ញា ឬការប្រែប្រួលនោះ។ ឧទាហរណ៍៖ ការទះមូស ការព្រិចភ្នែក អ្នកចាំទីលោតទៅចាប់បាល់...។
 - **តំហែរក្សាថេរលំនឹង៖** ជួយថែរក្សាលំនឹងដោយបញ្ជាឱ្យសារពាង្គកាយធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនសមស្របទៅនឹងព័ត៌មានដែលទទួលបាន។ ឧទាហរណ៍៖ ការតម្រូវអត្រាចង្វាក់ដង្ហើម និងចង្វាក់បេះដូងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថាមពល នៅពេលអ្នកធ្វើការហត់ (លោតចាប់បាល់) ឬសម្របសម្រួលសកម្មភាពមួយចំនួនដែលប្រុងប្រៀបខ្លួនក្នុងការទះមូល។ ឬពេលអ្នកឃ្លាន អ្នកត្រូវរកអ្វីមកបរិភោគជាដើម។

13. តើរំញោចជាអ្វី? ចូរលើកឧទាហរណ៍។

- រំញោច (Stimulus) ជាបម្រែបម្រួល ឬសញ្ញាណាមួយនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ ឬខាងក្នុង



សារពាង្គកាយដែលធ្វើឱ្យសារពាង្គកាយមានប្រតិកម្មតប។

- ឧទាហរណ៍៖ សម្លេងកណ្តឹងចូលរៀន ពន្លឺ សីតុណ្ហភាព ក្លិន ការបាត់បង់បរិមាណទឹកក្នុងឈាម។

14. តើតំណបរំព្រោះជាអ្វី? ចូរលើកឧទាហរណ៍។

- តំណបរំព្រោះ(Respond) ជាសកម្មភាពរបស់សារពាង្គកាយមានប្រតិកម្មទៅនឹងរំព្រោះណាមួយ។
ឧទាហរណ៍៖ ការទះមូស ការលោតចាប់បាល់ ការផឹកទឹកនៅពេលស្រេកទឹក។

15. តើតំណបមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?

- តំណបមានពីរប្រភេទ គឺ៖
 - តំណបឆន្ទៈ(voluntary respond)៖ ការទះមូស ក៏ឡាករចាប់បាល់...។
 - តំណបអឆន្ទៈ (involuntary respond)៖ ការកន្ត្រាក់របស់បេះដូង ការកិនរំលាយអាហារ ការដកដង្ហើមជាដើម។

16. តើធូលីវិញ្ញាណជាអ្វី?

- ធូលីវិញ្ញាណ(Receptors) ជាគោសិកា ឬជាលិកាដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងរំព្រោះ។

17. តើកង់គ្លីយ៉ុងជាអ្វី?

- កង់គ្លីយ៉ុង(Ganglion) គឺជាក្រុមគោសិកាប្រសាទ (ក្រៅពីខួរក្បាល ឬខួរឆ្អឹងខ្នង)។

18. តើអាំងស្ទុចប្រសាទ?

- អាំងស្ទុចប្រសាទ(Nerves Impulse) ជាសញ្ញាអគ្គីសនីដែលដឹកនាំដោយណឺរ៉ូន ឬជាព័ត៌មានប្រសាទ ដែលដឹកនាំដោយណឺរ៉ូន។

19. តើណឺរ៉ូនជាអ្វី?

- ណឺរ៉ូន ឬ គោសិកាប្រសាទ (Neuron=Nerve cell) ជាគោសិកាឯកទេសនៃប្រព័ន្ធប្រសាទ ដែលមាននាទីបញ្ជូនព័ត៌មានទៅពាសពេញសារពាង្គកាយ។

20. តើណឺរ៉ូនមានប៉ុន្មានផ្នែក? អ្វីខ្លះ?

- ណឺរ៉ូនមានបីផ្នែកសំខាន់ៗគឺ ដង់ឌ្រីត តួគោសិកា និងអាក់ស្វន។

21. តើដង់ឌ្រីតជាអ្វី? ចូរប្រាប់។

- ដង់ឌ្រីត ជាសរសៃឆ្លាញ់ច្រើន ហើយខ្លីដែលបែកចេញពីតួគោសិកា។ វាមាននាទីដឹកនាំអាំងស្ទុច


ប្រសាទ ហើយបញ្ជូនទៅកាន់តួកោសិកា។ វាទទួលព័ត៌មានពីណឺរ៉ូនផ្សេងៗទៀត។

22. តើតួកោសិកាជាអ្វី? ចូររៀបរាប់។

- តួកោសិកា ជាផ្នែកធំមួយនៃណឺរ៉ូនដែលមានផ្ទុកណ្ឌូយ៉ូ និងធាតុកោសិកាផ្សេងៗដូចជា មីតូកុងដ្រី(ច្រើន) បណ្តាញទើតុយឡូមអង់ដូប្លាស ប្រដាប់កុលស៊ី សារធាតុនីស និងណឺរ៉ូត្រីប៊ី...។

23. តើអាក់ស្មូនជាអ្វី? ចូររៀបរាប់។

- អាក់ស្មូន ជាពន្លឺមួយ រាងវែង ហើយធំ ដែលបែកចេញពីតួកោសិកា។
- វាមានប្រវែងប្រែប្រួលទៅតាមទីតាំងរបស់ណឺរ៉ូនហើយអាចលើសពី១ម៉ែត្រ។



24. ចូរពណ៌នាពីផ្នែកផ្សេងៗនៃណឺរ៉ូន។

- ដង់ដ្រីត ជាសរសៃឆ្មារៗ ហើយខ្លីដែលបែកចេញពីតួកោសិកា។ វាមានចំនួនច្រើន។
- តួកោសិកា ណឺរ៉ូនមានតួកោសិកាធំរាងទ្រវែង ហើយបែកចេញពីតួកោសិកាមានសរសៃឆ្មារៗ ជាច្រើន ហើយខ្លីដែលជាដង់ដ្រីត និងមានសរសៃវែងមួយជាអាក់ស្មូន។ តួកោសិកាមានផ្ទុក ណ្ឌូយ៉ូ និងធាតុកោសិកាដូចជាមីតូកុងដ្រី បណ្តាញទើតុយឡូមអង់ដូប្លាស...។
- អាក់ស្មូន ជាពន្លឺមួយដែលបែកចេញពីតួកោសិកា។ វាមានទម្រង់ស្រដៀងនឹងដង់ដ្រីត។ អាក់ស្មូនមានតែមួយ វែងហើយធំ។

25. តើណឺរ៉ូត្រីប៊ីជាអ្វី? មាននៅឯណា? មាននាទីដូចម្តេច?

- ណឺរ៉ូត្រីប៊ី ជាសរសៃតូចល្អិតៗបំផុតដែលមាននៅក្នុងដង់ដ្រីត តួកោសិកា និងអាក់ស្មូន។



- ពួកវាមាននាទីបញ្ជូនអាំងតង់ស៊ីតេប្រសាទទៅក្នុងកោសិកាប្រសាទ។

26. ហេតុអ្វីបានជាណឺរ៉ូន (កោសិកាប្រសាទ) មានមីតូកុងទ្រីច្រើន?


- បានជាណឺរ៉ូន (កោសិកាប្រសាទ) មានមីតូកុងទ្រីច្រើន ព្រោះវាត្រូវការថាមពលច្រើន។

27. តើគេផ្អែកលើអ្វី ដើម្បីបែងចែកភាពខុសគ្នានៃណឺរ៉ូន?

- ដើម្បីបែងចែកភាពខុសគ្នានៃណឺរ៉ូន គេផ្អែកលើ៖
 - ពន្លឺយដែលបែកចេញពីតួកោសិកា (រូបរាង) និង
 - នាទីរបស់វា។

28. តើណឺរ៉ូនមានប៉ុន្មានប្រភេទ បើផ្អែកលើពន្លឺយរបស់វា? អ្វីខ្លះ? ចូររៀបរាប់ពីប្រភេទនីមួយៗ។

- បើផ្អែកលើពន្លឺយ គេចែកណឺរ៉ូនជាបីប្រភេទគឺ៖
 - **ណឺរ៉ូនឯកប៉ូល** ជាណឺរ៉ូនដែលមានពន្លឺយខ្លីមួយបែកចេញពីតួកោសិកា។
 - **ណឺរ៉ូនទ្វេប៉ូល** ជាណឺរ៉ូនដែលតួកោសិកាមានពន្លឺយពីរស្របគ្នា គឺមួយជានាក់ស្នូន និងមួយទៀតជាដង់ទ្រីត។
 - **ណឺរ៉ូនពហុប៉ូល** ជាណឺរ៉ូនដែលតួកោសិកាមានពន្លឺយចេញមកច្រើន។ វាមានដង់ទ្រីតខ្លីៗ ឆ្លាស់ៗជាច្រើន ហើយមាននាក់ស្នូនតែមួយគត់ ធំហើយវែង។



29. តើណឺរ៉ូនមានប៉ុន្មានប្រភេទ បើផ្អែកលើនាទីរបស់វា? អ្វីខ្លះ? ចូររៀបរាប់ពីប្រភេទនីមួយៗ។


- បើផ្អែកតាមនាទីរបស់វា គេចែកណឺរ៉ូនជាបីប្រភេទគឺ៖
 - **ណឺរ៉ូនវិញ្ញាណនាំ** មាននាទីដឹកនាំព័ត៌មានចេញពីផ្ទៃសរីរាង្គទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ។ វាជា**ណឺរ៉ូនឯកប៉ូល**។



- **ណឺរ៉ូនភ្ជាប់(អត្តរណឺរ៉ូន)** ស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ (ខួរក្បាល និងខួរឆ្អឹងខ្នង)។ វាមាននាទីបញ្ជូនបន្តនូវព័ត៌មានរវាងណឺរ៉ូនវិញ្ញាណនាំនិងណឺរ៉ូនចលករ។ ភាគច្រើនជា ណឺរ៉ូនទ្វេប៉ូល។
- **ណឺរ៉ូនចលករ** មាននាទីមាននាទីដឹកនាំព័ត៌មានពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទទៅកាន់សរីរាង្គប្រតិកម្ម (សាច់ដុំឬក្រពេញ)។ ភាគច្រើនជា ណឺរ៉ូនពហុប៉ូល។

30. តើរូបភាពនេះជាបង្ហាញពីអ្វី? ចូររៀបរាប់។

- រូបភាពនេះបង្ហាញពីទិសដៅរបស់អាំងត្យូចប្រសាទ។
- អាំងត្យូចប្រសាទចាប់ផ្តើមពីដង់ឌ្រីត(1)ចូលទៅតួកោសិកា(2) រួចចុះតាមអាក់ស្កន(3) រហូតដល់ចុងអាក់ស្កន។




31. តើអាំងត្យូចប្រសាទមានទិសដៅពីណាទៅណា?

- អាំងត្យូចប្រសាទនីមួយៗចាប់ផ្តើមចេញពីដង់ឌ្រីតមួយ ហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះ ទៅកាន់តួកោសិកា របស់ណឺរ៉ូនបន្ទាប់ ហើយចុះតាមអាក់ស្កនរហូតដល់ចុងអាក់ស្កន។

32. តើស៊ីណាប់ជាអ្វី?

- ស៊ីណាប់ ជាលំហូរតូចមួយដែលស្ថិតនៅចន្លោះចុងអាក់ស្កនរបស់ណឺរ៉ូនមួយទៅនឹងដង់ឌ្រីត ឬតួកោសិកានៃណឺរ៉ូនបន្ទាប់។




33. តើណឺរ៉ូនមួយភ្ជាប់ទៅនឹងណឺរ៉ូនមួយទៀតបានយ៉ាងដូចម្តេច?

- ណឺរ៉ូនមួយភ្ជាប់ទៅនឹងណឺរ៉ូនមួយទៀតបានដោយអាំងត្យូចប្រសាទធ្វើដំណើរពីដង់ឌ្រីតចុះតាមតួកោសិកាហើយបន្តទៅអាក់ស្កន។ ដូចនេះ អាក់ស្កនរបស់ណឺរ៉ូនមួយអាចភ្ជាប់ទៅនឹងដង់ឌ្រីត

ឬតួកោសិកានៃណឺរ៉ូនបន្ទាប់។ តែការភ្ជាប់រវាងណឺរ៉ូនពីរមិនប៉ះផ្ទាល់ជាមួយគ្នាទេ។

34. តើណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារ (Neurotransmitters) ជាអ្វី?


- ណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារ ជាសារធាតុគីមីដែលស្ថិតនៅក្នុងថង់តូចៗនៅផ្នែកខាងចុងនៃអាក់ស្ថនសម្រាប់បង្កើតជាអាំងភ្នំប្រសាទថ្មី។



35. តើអាំងភ្នំប្រសាទឆ្លងកាត់ស៊ីណាប្រសាទយ៉ាងដូចម្តេច?

- នៅចុងអាក់ស្ថន មានថង់តូចៗជាច្រើនដែលផ្ទុកសារធាតុគីមី (ណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារ) មានសភាពជាពពុះតូចៗ។ ពេលអាំងភ្នំទៅដល់ចុងអាក់ស្ថន ថង់ទាំងនោះក៏ផ្ទុះបែក ហើយបញ្ចេញណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារដែលសាយឆ្លងកាត់ស៊ីណាប្រសាទ។ បន្ទាប់មកណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារនេះក៏បង្កើតអាំងភ្នំប្រសាទនៅក្នុងឯងខ្រិតរបស់ណឺរ៉ូនបន្ទាប់ រួចវាក៏ធ្វើដំណើរតាមតួកោសិកា និងចុះតាមអាក់ស្ថន។

36. ចូររៀបរាប់ពីទិសដៅនៃអាំងភ្នំប្រសាទក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទ (ចាប់ពីពេលដែលអ្នកលើសម្លេងទូរស័ព្ទរោទ៍ រហូតដល់អ្នកលើកទូរស័ព្ទ)។





- ពេលសម្លេងទូរស័ព្ទរោទ៍ ធ្វើវិញ្ញាណក្នុងត្រចៀកចាប់យកសូរ រួចបង្កើតជាអាំងតង់ស៊ីតេប្រសាទក្នុង ណឺរ៉ូនវិញ្ញាណនាំហើយអាំងតង់ស៊ីតេប្រសាទធ្វើដំណើរចេញពីដងខ្នងមួយនៃណឺរ៉ូនវិញ្ញាណនាំចូលក្នុង តួកោសិកា ហើយចុះតាមអាក់ស្ថន។ នៅចុងអាក់ស្ថន អាំងតង់ស៊ីតេប្រសាទឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់ ហើយ ចូលទៅក្នុងណឺរ៉ូនភ្ជាប់ដែលនៅក្នុងខួរក្បាល។ បន្ទាប់ពី ខួរក្បាលបានបកស្រាយហើយថាជា សម្លេងទូរស័ព្ទរោទ៍ ពេលនោះខួរក្បាលក៏សម្រេចចិត្តថាលើក ឬមិនលើកទូរស័ព្ទនោះ។ នៅពេល ខួរក្បាលសម្រេចចិត្តថាលើក អាំងតង់ស៊ីតេប្រសាទក៏ធ្វើដំណើរចុះតាមបណ្តោយណឺរ៉ូនចលកររហូតដល់ សរីរាង្គប្រតិកម្ម(សាច់ដុំដៃ)។ សាច់ដុំដៃឆ្លើយ តបដោយការលើកទូរស័ព្ទ។

37. នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទ គេថាអាំងតង់ស៊ីតេប្រសាទធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនណាស់។ ចូរបញ្ជាក់ពីល្បឿនរបស់វា ក្នុង១វិនាទី និង ពន្យល់ថាមានអ្វីកើតឡើងបើវាធ្វើដំណើរយឺត ឬ មានអ្វីមួយទៅបង្អាក់វា?

- អាំងតង់ស៊ីតេប្រសាទធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនណាស់ គឺប្រហែល 120ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទី។
- ប្រសិនបើវាធ្វើដំណើរយឺត ឬមានអ្វីមួយទៅបង្អាក់វាវិញនោះ វាអាចធ្វើឱ្យសារពាង្គកាយមាន គ្រោះថ្នាក់ ឬបាត់បង់ស្មារតីជាដើម ដោយសារតែព័ត៌មានដែលទទួលបានយឺត ដូចនេះមិនអាច ឆ្លើយតបទៅនឹងរំញោចបានទាន់ពេលវេលាទេ។

38. ក្នុង១ថ្ងៃ តើមានអាំងតង់ស៊ីតេប្រសាទប៉ុន្មានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់យើង? ចូរលើកឧទាហរណ៍។



- ក្នុង១ថ្ងៃ មានអាំងតង់ស៊ីតេប្រសាទប្រហែលរាប់ពាន់លានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់យើង។
- ទាំងនេះជាឧទាហរណ៍នៃរំញោចដែលបង្កើតទៅជាអាំងតង់ស៊ីតេប្រសាទ៖ សម្លេងនាឡិការោទ៍ សម្លេង ម្តាយស្រែកហៅឱ្យក្រោកពីដំណេក មើលឃើញប្រាសាទដុះឆ្នេរ ដៃកាន់ប្រាសាទដុះឆ្នេរ មើលឃើញម្ហូបលើតុ ផ្កានិល្លយម្ហូប ម្ហូបឆ្ងាញ់ អានសៀវភៅ រៀបចំបន្ទប់ សំឡេងទូរស័ព្ទ...។

39. តើប្រព័ន្ធប្រសាទមនុស្សចែកចេញជាប៉ុន្មានផ្នែក? អ្វីខ្លះ? ចូររៀបរាប់។

- ប្រព័ន្ធប្រសាទមនុស្សចែកចេញជាពីរផ្នែកគឺ មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ និងបរិមណ្ឌលប្រសាទ។
 - មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទមានខួរក្បាល និង ខួរឆ្អឹងខ្នង។
 - បរិមណ្ឌលប្រសាទមានសរសៃប្រសាទទាំងអស់ដែលលាតសន្ធឹងនៅខាងក្រៅ មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ។

40. តើមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទមាននាទីអ្វី ?

- នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទ មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទមាននាទីជាកន្លែងទទួលព័ត៌មានពីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃរាងកាយ ព្រមទាំងបកស្រាយ និងបញ្ជាសកម្មភាពទៅគ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយ។



41. តើខួរក្បាលត្រូវបានការពារដោយអ្វីខ្លះ?


- ខួរក្បាលត្រូវបានការពារដោយ ឆ្អឹងលលាងក្បាល (Skull) ។ នៅជាប់ពីក្រោមឆ្អឹងលលាងក្បាលមានភ្នាសបីស្រទាប់គឺ ស្រទាប់ខួរ (Meninges) ។ ចន្លោះរវាងស្រទាប់ខាងក្នុងបង្អស់ និងខាងក្រៅបង្អស់ជាស្រទាប់កណ្តាលដែលមានទឹកខួរ។

42. តើទឹកខួរ Cerebrospinal fluid (CFS) មាននាទីអ្វី?

- ទឹកខួរមាននាទីទាញយកអុកស៊ីសែន គ្លុយកូស គោលិកាស និង អម្រែនពីឈាមទៅចិញ្ចឹមកោសិកាប្រសាទ។
- វាក៏ជាកំណល់ជួយការពារខួរក្បាលពីការប៉ះទង្គិចផ្សេងៗ។

43. តើខួរក្បាលមានប៉ុន្មានផ្នែក? អ្វីខ្លះ?

- ខួរក្បាលមានបីផ្នែកសំខាន់គឺ៖
 - ខួរធំ Cerebrum
 - ខួរតូច Cerebellum
 - ខួរកញ្ជើងក Brain Stem







44. តើខួរក្បាលទទួលសារធាតុចិញ្ចឹមពីណា?

- ខួរក្បាលទទួលសារធាតុចិញ្ចឹមពីទឹកខួរ។ វាទាញយកអុកស៊ីសែន និងសារធាតុចិញ្ចឹមពីឈាមទៅចិញ្ចឹមកោសិកាប្រសាទ។

45. តើខួរធំបង្កឡើងពីសារធាតុអ្វីខ្លះ?

- ខួរធំ ជាផ្នែកធំជាងគេនៃខួរក្បាល។
- ស្រទាប់ក្រៅ ឬសំបកខួរជាផ្នែកសំខាន់ ដែលបង្កឡើងពីស្រទាប់សារធាតុប្រផេះដែលមានកម្រាស់ពី2ទៅ4mm។ សារធាតុនេះ កើតពីតួកោសិកានៃឈាមរួចចលករ និងឈាមរួចភ្ជាប់។
- ស្រទាប់ក្នុង ជាសារធាតុស ដែលកើតពីភីបប្រសាទ។



46. តើផ្ទៃនៃសំបកខួរមានលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះ? ចូរប្រាប់ពីប្រយោជន៍របស់វា។

- ផ្ទៃនៃសំបកខួរធំមានផ្ទៃក្រឡាដូចគ្នា។ ផ្ទៃទាំងនេះបង្កើនផ្ទៃនៃស្រទាប់ សារធាតុប្រផេះ និងបង្កើនបំណិនគិតផងដែរ។

47. តើផ្ទៃនៃខួរធំមានទំនាក់ទំនងជាមួយបញ្ញាយ៉ាងដូចម្តេច?

- ផ្ទៃជាច្រើននៃសំបកខួរធំ បង្កើនផ្ទៃតំបន់យ៉ាងធំធេងដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការបង្កើនបំណិនគិតផងដែរ (ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ញា)។



48. តើសំបកខួរក្បាលមាននាទីអ្វីខ្លះ?

- សំបកខួរមាននាទីជាច្រើនដូចជា មានសតិ បញ្ញា ប្រឌិតញាណ ពិចារណា។
- សំបកខួរក៏ទទួលព័ត៌មានពីសរីរាង្គវិញ្ញាណទាំង៥ មានស្បែក អណ្តាត ត្រចៀក ភ្នែក និងច្រមុះ។

49. តើគេចែកខួរធំជាពីរផ្នែកដោយសារអ្វី? តើផ្នែកទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

- នៅចំណុចខួរក្បាលមានចង្កូរយ៉ាងជ្រៅ ដែលចែកខួរធំជាពីរអឌ្ឍគោល (អឌ្ឍគោលខួរឆ្វេង

និងអង្គគោលខួរស្តាំ)។ អង្គគោលទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនង ជាមួយគ្នាដោយឆ្លងកាត់តាម បាច់ប្រសាទ។ ក្រៅពីចង្កូរនេះ មានផ្នត់ជ្រៅមួយចំនួន ដែលចែកអង្គគោលខួរជាកំពកចំនួន៤ គឺកំពកថ្ងាស កំពកចំហៀង កំពកពយ និងកំពកសៀតផ្កា។




50. តើអង្គគោលខួរស្តាំ និងអង្គគោលខួរឆ្វេងមានទំនាក់ទំនងគ្នាដូចម្តេច? ឬក៏សួរថា៖ ហេតុអ្វីបានជា យើងមានរបួសនៅលើអង្គគោលខួរឆ្វេងបណ្តាលឱ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើ សារពាង្គកាយខាងស្តាំ?

- ព័ត៌មានចេញពីអង្គគោលខួរស្តាំ ត្រូវពិនិត្យចលនាសារពាង្គកាយខាងឆ្វេង។ ព័ត៌មានចេញពី អង្គគោលខួរឆ្វេង ត្រូវពិនិត្យចលនាសារពាង្គកាយខាងស្តាំ។ ដោយហេតុនេះ បើរបួសនៅលើ អង្គគោលមួយចំហៀងនឹងមានឥទ្ធិពលលើសារពាង្គកាយមួយចំហៀងផ្សេងទៀត។

51. តើចែកអង្គគោលខួរនីមួយៗជាប៉ុន្មានកំពក? អ្វីខ្លះ?

- ចែកអង្គគោលខួរនីមួយៗជា៤កំពកគឺ៖
 - កំពកថ្ងាស
 - កំពកចំហៀង
 - កំពកពយ
 - កំពកសៀតផ្កា



52. តើកំពកនីមួយៗនៃអង្គគោលខួរនីមួយៗមាននាទីដូចម្តេចខ្លះ?

- កំពកនីមួយៗទទួលព័ត៌មានចេញពីសរីរាង្គវិញ្ញាណទាំង៥។
 - កំពកថ្ងាស ឬកំពកខាងមុខ កំណត់នូវសកម្មភាព និងយាយ គិត និងចលនានៃសារពាង្គកាយ (ចលនាឆន្ទៈ)។



- កំពកសៀតផ្កា កំណត់ផ្នែករសជាតិ ក្លិន និងលឿងដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយជីវ្ហវិញ្ញាណ យានវិញ្ញាណ និងសោតវិញ្ញាណ។
- កំពកចំហៀង មានទំនាក់ទំនងជាមួយកាយវិញ្ញាណ (ការប៉ះទង្គិច)។
- កំពកពយប្ប កំពកខាងក្រោយ កំណត់នូវគំហើញដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយចក្ខុវិញ្ញាណ។

53. តើតាឡាមុសជាអ្វី? វាមាននាទីដូចម្តេច?


- តាឡាមុស ជាស្ថានីយបញ្ជូនបន្ត។ វាមាននាទីចាប់យកអាំងហ្ស៊ីតប្រសាទពីណឺរ៉ូនវិញ្ញាណនាំហើយបញ្ជូនទៅកាន់ផ្នែកត្រឹមត្រូវនៃសំបកខួរដែលនឹងត្រូវបកស្រាយ។ ក្រៅពីនេះ វាមាននាទីជ្រើសរើសព័ត៌មានមួយចំនួន ដែលអាចទប់ស្កាត់មិនឱ្យរំភើបខ្លាំងពេក។

54. តើអ៊ីប៉ូតាឡាមុសស្ថិតនៅកន្លែងណា? វាមាននាទីដូចម្តេច?

- អ៊ីប៉ូតាឡាមុសស្ថិតនៅផ្នែកបាតនៃខួរធំខាងក្រោមតាឡាមុស។
- អ៊ីប៉ូតាឡាមុសមាននាទីត្រួតពិនិត្យវេទនារម្មណ៍សំខាន់ៗ ទាក់ទងនឹងការថែរក្សាលំនឹងដូចជាការស្រេកឃ្លាន តំហែរក្សាសីតុណ្ហភាព តុល្យភាពទឹក និងសម្ពាធឈាម។
- វាក៏មាននាទីបង្កើត ឬធ្វេចការបញ្ចេញអរម៉ូនរបស់ក្រពេញអ៊ីប៉ូភីស។

55. តើផ្នែករបស់ខួរតូចមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

- ផ្នែករបស់ខួរតូច ក៏ចែកជាអឌ្ឍគោលខួរចំនួនពីរចំហៀងដែរ។ ស្រទាប់ខាងក្រៅរបស់ខួរតូចមានផ្ទុកជ្រៅជាច្រើនដែលកើតឡើងពីសារធាតុប្រផេះ ឯផ្នែកខាងក្នុងជាសារធាតុស ដូចនៅក្នុងខួរធំដែរ។



56. តើខួរតូចត្រួតពិនិត្យចលនាអ្វីខ្លះ?

- ខួរតូចត្រួតពិនិត្យចលនាឆន្ទៈទាំងអស់ និងចលនាឆន្ទៈមួយចំនួន។



57. តើខ្លួនតូចត្រួតពិនិត្យចលនាឆន្ទៈដូចម្តេចខ្លះ?

- នៅពេលសាច់ដុំបញ្ជូនអាំងតង់ត្យូប្រសាទតាមផ្លូវប្រសាទវិញ្ញាណនាំទៅខ្លួនតូច អាំងតង់ត្យូចនេះផ្តល់ព័ត៌មានពីទីតាំង និងអត្រានៃការកម្រិតសាច់ដុំ។ បន្ទាប់មក ខ្លួនតូចបញ្ជូនអាំងតង់ត្យូប្រសាទទៅសំបកខ្លួនដើម្បីឱ្យខ្លួនក្បាលកែលម្អ និងសម្របសម្រួលចលនានៃសាច់ដុំ។ ដូចនេះសំបកខ្លួនក្បាល និងខ្លួនតូចធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតចលនាឆន្ទៈមួយមានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងរលូន។
- ឧទាហរណ៍៖ ដៃចាប់កាន់នំចំណី រួចដាក់ចូលក្នុងមាត់។

58. ប្រសិនបើខ្លួនតូចខូចខាត តើនឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះ?

- ប្រសិនបើខ្លួនតូចខូចខាត សារពាង្គកាយនឹងបាត់បង់តុល្យភាព ឬ មានចលនាកម្រិតញ័រញ័យ។

59. ហេតុអ្វីបានជានៅពេលមនុស្សស្រវឹងខ្លាំង មានដំណើរទ្រេតទ្រោត ដៃចាប់កាន់វត្ថុមានលក្ខណៈញ័រញ័រ?

- នៅពេលមនុស្សស្រវឹងខ្លាំង មានដំណើរទ្រេតទ្រោត ដៃចាប់កាន់វត្ថុមានលក្ខណៈញ័រញ័រ ដោយសារនៅពេលស្រវឹង ខ្លួនតូចបាត់បង់នាទីត្រួតពិនិត្យចលនាឆន្ទៈ ការរក្សាលំនឹង។ ដូចនេះវាមិនបានកែលម្អ និងសម្របសម្រួលចលនារបស់សាច់ដុំក្នុងការធ្វើចលនា។ នៅពេលនោះ មនុស្សស្រវឹងមានដំណើរទ្រេតទ្រោត និងមិនអាចបញ្ជាបើខ្លួនឯងបាន។

60. តើខ្លួនកញ្ជឹងកមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

- ខ្លួនកញ្ជឹងកកើតឡើងពីស្រទាប់ក្រៅដែលជាសារធាតុស និងស្រទាប់ក្នុងជាសារធាតុប្រផេះ។
- ខ្លួនកញ្ជឹងកកើតឡើងពីភីបប្រសាទដែលភ្ជាប់ខ្លួនឆ្លងទៅផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃខ្លួនក្បាល។

61. តើខ្លួនកញ្ជឹងកមាននាទីដូចម្តេច?

- ខ្លួនកញ្ជឹងកមាននាទីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពឆន្ទៈរបស់សារពាង្គកាយ។
- ឧទាហរណ៍៖ ណឺរ៉ូនក្នុងខ្លួនកញ្ជឹងកតម្រូវដង្ហើម និងត្រួតពិនិត្យចង្វាក់បេះដូង។

62. តើខ្លួនឆ្អឹងខ្លងស្ថិតនៅឯណា?

- ខ្លួនឆ្អឹងខ្លង បន្តចេញពីខ្លួនក្បាល និងចេញពីផ្នែកចំហនៃបាតលលាដ៍ក្បាល។ វាលាតសន្លឹងចុះមកក្រោមប្រវែងប្រហែល 42 ទៅ 45cm ។ វាស្ថិតនៅក្នុងប្រហោងឆ្អឹងកងខ្លង។


63. តើខ្លួនឆ្អឹងខ្លងត្រូវបានការពារដោយអ្វី?

- ខ្លួនឆ្អឹងខ្លង ត្រូវបានការពារដោយ៖

- ឆ្អឹងខ្នង
- ស្រទាប់ខ្នង និង
- ទឹកខ្នង។

64. តើខ្លួនឆ្អឹងខ្នងកើតឡើងពីសារធាតុអ្វីខ្លះ?

- ខ្លួនឆ្អឹងខ្នងកើតឡើងពី៖
 - ស្រទាប់ក្រៅបង្កប់ជាសារធាតុស។
 - ស្រទាប់ក្នុងបង្កប់ជាសារធាតុប្រផេះ (មានរាងជាកូរូអ៊ែរ)។



65. តើសារធាតុប្រផេះ និងសារធាតុសកើតឡើងពីអ្វីខ្លះ?

- សារធាតុប្រផេះ កើតឡើងពីអន្តរណ៍រ៉ូន និងតួកោសិកានៃរ៉ូនចលករ។
- សារធាតុស កើតឡើងពីភីបរបស់អាក់ស៊ូន។

66. តើខ្លួនឆ្អឹងខ្នង មានទំនាក់ទំនងជាមួយខួរក្បាលយ៉ាងដូចម្តេច?

- ព័ត៌មានផ្នែកវិញ្ញាណនាំ និងចលករឆ្លងកាត់ពីខួរក្បាលទៅផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃសារពាង្គកាយតាមរយៈខ្លួនឆ្អឹងខ្នង។ ម្យ៉ាងទៀត សរសៃប្រសាទវិញ្ញាណនាំ និងចលករទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមកញ្ជីងត្រូវតែឆ្លងកាត់តាមខ្លួនឆ្អឹងខ្នង ទៅកាន់ខួរក្បាល ឬទៅសរីរាង្គផ្សេងៗ។

67. តើខ្លួនឆ្អឹងខ្នងមានសារៈសំខាន់ដែរឬទេ? ហេតុអ្វី?

- ខ្លួនឆ្អឹងខ្នងមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះ វាភ្ជាប់សរសៃប្រសាទនៃបរិមណ្ឌលប្រសាទ ទៅនឹងខួរក្បាលគឺ អាំងត្រូប្រសាទចេញពីរ៉ូនវិញ្ញាណនាំ ធ្វើចលនាតាមខ្លួនឆ្អឹងខ្នង ដោយឆ្លងកាត់



ណឺរ៉ូនភ្ជាប់ ឆ្ពោះទៅកាន់ខួរក្បាល។ អាំងត្យូចប្រសាទចេញពីខួរក្បាលចុះ ទៅខ្លួនឆ្អឹងខ្ទងតាម អន្តរណឺរ៉ូនឆ្ពោះទៅកាន់ណឺរ៉ូនចលករ។ អាំងត្យូចទាំងនេះធ្វើដំណើរ តាមបរិមណ្ឌលប្រសាទទៅ កាន់សាច់ដុំ និងក្រពេញ។

- ខ្លួនឆ្អឹងខ្ទងត្រួតពិនិត្យចលនាផ្លែចន្លោះៗដែលជាតំណបង្វ័យប្រវត្តិ។

68. តើបរិមណ្ឌលប្រសាទកើតឡើងពីផ្នែកណាខ្លះ? ឬ តើបរិមណ្ឌលប្រសាទមានសរសៃប្រសាទអ្វីខ្លះ?

- បរិមណ្ឌលប្រសាទកើតឡើងពី៖
 - សរសៃប្រសាទលលាដ៏ក្បាលចំនួន១២គូ ដែលបែកចេញពីខួរក្បាល និង
 - សរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្ទងចំនួន៣១គូ ដែលបែកចេញពីខ្លួនឆ្អឹងខ្ទង។

69. តើសរសៃប្រសាទលលាដ៏ក្បាលបែកចេញពីណា ? ហើយពាក់ព័ន្ធទៅទីណា?

- សរសៃប្រសាទលលាដ៏ក្បាលបែកចេញពីខួរក្បាល ។
- មួយផ្នែកធំ វាភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកផ្សេងៗនៅក្នុងក្បាល និងផ្ទៃមុខ ដូចជាសាច់ដុំដែលធ្វើឱ្យផ្អែក និងអណ្តាតមានចលនា។

70. តើសរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្ទងចំនួន31គូកើតឡើងពីសរសៃប្រសាទអ្វីខ្លះ?

- សរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្ទង31គូ មានសរសៃប្រសាទដូចជា ៖
 - 8គូ ចេញពីផ្នែកកញ្ជឹងក(1)
 - 12គូចេញពីផ្នែកទ្រូង (2)
 - 5គូ ចេញផ្នែកចង្កេះ (3)
 - 5គូទៀត ចេញផ្នែកត្រគាក(4)
 - 1គូចេញពីឆ្អឹងកញ្ជូញគូ(5)

71. តើសរីរាង្គសំខាន់ជាងគេក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទគឺជាអ្វី?

- សរីរាង្គសំខាន់ជាងគេក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទ គឺជាខួរក្បាល។

72. ហេតុអ្វីបានជាគេថាខួរក្បាលជាសរីរាង្គសំខាន់ជាងគេក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទ?

- ខួរក្បាលជាសរីរាង្គសំខាន់ជាងគេក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទ ព្រោះខួរក្បាលប្រមូលផ្តុំនូវណឺរ៉ូនរាប់ពាន់ លាន (100 000 000 000) និងជាកន្លែងទទួលព័ត៌មាន បកស្រាយ និងបញ្ជូនចេញទៅគ្រប់



ផ្នែកផ្សេងៗនៃសារពាង្គកាយឱ្យធ្វើចលនា។

73. តើខួរក្បាល និងខួរឆ្អឹងខ្នងត្រូវបានការពារដោយអ្វី?

- ខួរក្បាលត្រូវបានការពារដោយឆ្អឹងលលាដ៏ក្បាល។ នៅក្រោមឆ្អឹងលលាដ៏ក្បាលមានស្រោមខួរ នៅចន្លោះស្រទាប់ក្នុងបង្អស់ និងស្រទាប់កណ្តាលមានលំហមួយដែលពេញដោយទឹកខួរ។ ក៏ដូចជាខួរក្បាលដែរ ខួរឆ្អឹងខ្នង ត្រូវបានការពារដោយឆ្អឹងខ្នង ស្រោមខួរ និងទឹកខួរ។

74. តើសរសៃប្រសាទនីមួយៗបង្កឡើងពីអ្វីខ្លះ?

- សរសៃប្រសាទនីមួយៗកើតឡើងពីភិបប្រសាទ (អាក់ស្ថន ជួនកាលមានជង់ខ្លីត) ដែលរួមគ្នាជា បាច់ប្រសាទ ហើយបាច់ប្រសាទជាច្រើននេះរួមគ្នាបង្កើតបានជាសរសៃប្រសាទមួយ។



75. តើសរសៃប្រសាទមានប៉ុន្មានក្រុម? អ្វីខ្លះ? និងមាននាទីដូចម្តេច?

- សរសៃប្រសាទមានពីរក្រុម គឺសរសៃប្រសាទវិញ្ញាណនាំ និងសរសៃប្រសាទចលករ។
- សរសៃប្រសាទវិញ្ញាណនាំ ដឹកនាំព័ត៌មានពីសរីរាង្គវិញ្ញាណទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ។
- សរសៃប្រសាទចលករ ដឹកនាំព័ត៌មានពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទទៅកាន់សាច់ដុំ ឬក្រពេញ។

76. តើខួរក្បាលកំណត់ប្រភពរំញោចបានយ៉ាងដូចម្តេច?

- ខួរក្បាលបកស្រាយនូវផ្លូវដែលរំញោចធ្វើដំណើរ បន្ទាប់មកខួរក្បាលកំណត់បាននូវទីតាំងនៃប្រភពរបស់រំញោចនោះ។

77. តើប្រព័ន្ធប្រសាទចែកចេញជាប៉ុន្មានក្រុម? អ្វីខ្លះ?

- ប្រព័ន្ធប្រសាទចែកចេញជាពីរក្រុមគឺ៖ ប្រព័ន្ធប្រសាទសូម៉ាទិច និង ប្រព័ន្ធប្រសាទស្វ័យប្រវត្តិ។

78. តើប្រព័ន្ធប្រសាទទាំងពីរនេះ(សូម៉ាទិច និងស្វ័យប្រវត្តិ)មានសកម្មភាពដូចម្តេច?

- ប្រព័ន្ធប្រសាទសូម៉ាទិចមានណឺរ៉ូនដែលភ្ជាប់មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទទៅនឹងសាច់ដុំឆ្អុត ឬសាច់ដុំឆន្ទៈ។ ប្រព័ន្ធប្រសាទសូម៉ាទិចត្រួតពិនិត្យ និងសម្របសម្រួលសកម្មភាពឆន្ទៈនៃសារពាង្គកាយ ដូច



ជាការរត់ ការសរសេរ ការនិយាយជាដើម។ ប្រព័ន្ធប្រសាទស្វ័យប្រវត្តិ ភ្ជាប់មជ្ឈមណ្ឌល ប្រសាទ ទៅនឹងសាច់ដុំរូបិយ និងសាច់ដុំបេះដូង។

79. តើប្រព័ន្ធប្រសាទស្វ័យប្រវត្តិមានប៉ុន្មានផ្នែក? អ្វីខ្លះ ? តើផ្នែកនីមួយៗមានលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះ?

- ប្រព័ន្ធប្រសាទស្វ័យប្រវត្តិចែកចេញជាផ្នែកគឺ៖
 - ប្រព័ន្ធប្រសាទសំប៉ាទិច និង ប្រព័ន្ធប្រសាទប៉ារ៉ាសំប៉ាទិច។
- ប្រព័ន្ធប្រសាទសំប៉ាទិចធ្វើសកម្មភាពកាលណាមានភាពតានតឹង។

ឧទាហរណ៍៖ ពេលមានអាសន្ន ដូចជាឆ្កែដេញខ្មាំង អាំងតឺបបញ្ជាឱ្យបេះដូងដើរលឿន និង សម្ពាធឈាមខ្ពស់ អាចផ្តល់ថាមពលច្រើន ដូចនេះគេអាចរត់គេចពីឆ្កែបានរហ័ស។
- ប្រព័ន្ធប្រសាទប៉ារ៉ាសំប៉ាទិចមានសកម្មភាពផ្ទុយពីប្រព័ន្ធប្រសាទសំប៉ាទិច។

80. ចូរបង្ហាញភាពខុសគ្នានៃប្រព័ន្ធប្រសាទសំប៉ាទិច និងប្រព័ន្ធប្រសាទប៉ារ៉ាសំប៉ាទិច។

➢ ភាពខុសគ្នានៃប្រព័ន្ធប្រសាទសំប៉ាទិច និងប្រព័ន្ធប្រសាទប៉ារ៉ាសំប៉ាទិច៖

ប្រព័ន្ធប្រសាទសំប៉ាទិច (Sympathetic Nervous system) (ពេលមានភាពតានតឹង) (Fight or Flight)	ប្រព័ន្ធប្រសាទសំប៉ាទិច (Rest and Digest) (Parasympathetic Nervous system) (ធ្វើឱ្យសារពាង្គកាយត្រលប់មកសភាពធម្មតារវិញ)
-ពង្រីកប្រស្រីភ្នែក -ពង្រីកទងសួត - បន្ថយការបញ្ចេញទឹកមាត់ -បង្កើនល្បឿនចង្វាក់បេះដូង -បន្ថយសកម្មភាពរំលាយអាហារ -ឆ្លាចបំបែងក្លីកូស៊ីនទៅជាគ្រួសកូស -បញ្ចេញអេពីណេព្រីន និងណូអេពីណេព្រីនពីក្រពេញលើតម្រងនោម -បន្ថយប៊េរីស្តាល់ស៊ីស -ប្លោកនោមរលា	-បង្រួមប្រស្រីភ្នែក -បង្រួមទងសួត -បង្កើនការបញ្ចេញទឹកមាត់ -បន្ថយល្បឿនចង្វាក់បេះដូង -ឆ្លាចសកម្មភាពរំលាយអាហារ -ឆ្លាចបំបែងគ្រួសកូសទៅជាគ្រីកូស៊ីនក្នុងថ្លើម -បន្ថយការបញ្ចេញអេពីណេព្រីន និង ណូអេពីណេព្រីនពីក្រពេញលើតម្រងនោម -បង្កើនប៊េរីស្តាល់ស៊ីស -បង្រួមប្លោកនោម

81. តើរេផ្លិច(Reflex)ជាអ្វី?

- រេផ្លិច ជាសកម្មភាពធរណៈឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅនឹងរំញោចណាមួយដែលកើតឡើង



ដោយមិនបានគិតជាមុន (គ្មានការចូលរួមពីខ្លួនក្បាល)។


82. ហេតុអ្វីបានជាវេន្លិចអាចការពារសារពាង្គកាយបាន?

- វេន្លិចអាចការពារសារពាង្គកាយបាន ព្រោះវាជាសកម្មភាពអន្ត្រៈ ឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិ ទៅនឹងអំព្រោះចណាមួយដែលកើតឡើងដោយមិនបានគិតជាមុន។ ដូចនេះសកម្មភាពនេះ រហ័សណាស់ និងអាចការពារសារពាង្គកាយពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ ដូចជា ប៉ះវត្ថុស្រួច ឬក្តៅខ្លាំងពេក។

83. តើទម្រង់ណាខ្លះដែលទាក់ទងនឹងវេន្លិច?

- ទម្រង់ដែលទាក់ទងនឹងវេន្លិចមានដូចជា៖
 - ផ្លូបវិញ្ញាណ (លើសរីរាង្គវិញ្ញាណទាំងប្រាំ)
 - ណឺរ៉ូនវិញ្ញាណនាំ ណឺរ៉ូនភ្ជាប់ ណឺរ៉ូនចលករ
 - សរីរាង្គចលករ និង សរីរាង្គប្រតិកម្ម (សាច់ដុំ ឬក្រពេញ)។

84. ចូរដាក់ឈ្មោះលើរូបភាពស៊ីណាប់ (រូបទី1)។ ចូរពន្យល់ពីដំណើរនៃអាំងត្រូប្រសាទឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់។



1. អាក់ស្មូន
2. ទិសដៅអាំងត្រូប្រសាទ
3. មីតូកុងដ្រី
4. ចុងអាក់ស្មូន
5. ឯងខ្រិតនៃណឺរ៉ូនបន្ទាប់
6. ផ្លូប
7. ស៊ីណាប់
8. ណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារ
9. ថង់ផ្ទុកណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារ


នៅពេលអាំងត្រូប្រសាទធ្វើដំណើរទៅដល់ចុងអាក់ស្មូន ថង់តូចៗក៏ផ្ទុះ ហើយបញ្ចេញសារធាតុគីមី (ណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារ) ដែលសាយឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់។ សារធាតុទាំងនេះ ឆ្លាចបង្កើតបានអាំងត្រូប្រសាទនៅក្នុងឯងខ្រិតនៃណឺរ៉ូនមួយទៀត ហើយអាំងត្រូប្រសាទនេះបញ្ជូនទៅកាន់តួកោសិកា ហើយចុះតាមអាក់ស្មូន។

85. នៅពេលដែលរស់រវើកប៉ះឆ្នាំងអ៊ុតក្តៅដោយចៃដន្យ។ អ្នកក៏ដកដៃចេញយ៉ាងរហ័ស។

ក. តើសកម្មភាពបែបនេះហៅថាអ្វី?

ខ. តើអ្នកមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ឬទេ មុនពេលដកដៃចេញពីឆ្នាំងអ៊ីត?

គ. ចូរពណ៌នាថា តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានប្រតិកម្មតប រហ័សបែបនេះ?



- ក. សកម្មភាពនេះហៅថា រេផ្លិច។
- ខ. មុនពេលដកដៃចេញពីឆ្នាំងអ៊ីត យើងមិនមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ទេ។
- គ. នៅពេលយើងប៉ះឆ្នាំងអ៊ីតក្ដៅ ផ្លូវវិញ្ញាណកម្ដៅបង្កើតអាំងតង្គប្រសាទ ដែលធ្វើដំណើរ តាមខ្លួនវិញ្ញាណនាំចូលទៅផ្នែកខ្នងនៃសាច់ឆ្អឹងប្រផេះរបស់ខ្លួនឆ្អឹងខ្នង។ អាំងតង្គនេះឆ្លងកាត់អន្តរ ណឺរ៉ូនក្នុងខ្លួនឆ្អឹងខ្នងហើយចុះតាមខ្លួនចលករនៃសរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្នងដែលចេញពីផ្នែកខាងពោះ នៃសាច់ឆ្អឹងប្រផេះ។ តាមរយៈណឺរ៉ូនចលករ អាំងតង្គបានស្នាមសាច់ដុំដៃឱ្យកម្រិតដៃចេញពីឆ្នាំងអ៊ីត។ នេះជាចលនារេផ្លិច។ វាមិនទាក់ទងនឹងខួរក្បាលទេ។ ស្របពេលដែលយើងដកដៃចេញពីឆ្នាំងអ៊ីត ក្ដៅ អាំងតង្គក៏ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់អន្តរណឺរ៉ូនមួយផ្សេងទៀតក្នុងខ្លួនឆ្អឹងខ្នងទៅកាន់ខួរក្បាល។ នៅ ពេលនោះ យើងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់។ អាំងតង្គប្រសាទមួយផ្សេងទៀតធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ និយាយក្នុងខួរក្បាល។ នៅទីនោះ សញ្ញាត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាច់ដុំដៃបញ្ចេញសំឡេង ហើយយើង ស្រែកថា “អូយ”។

86. ហេតុអ្វីបានជាពេលមានការប៉ះទង្គិច ឬរបួសដោយមុតដាច់ ធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់?

- បានជាពេលមានការប៉ះទង្គិច ឬរបួសដោយមុតដាច់ ធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ព្រោះ នៅក្នុងស្រទាប់ក្រោមនៃសរសៃស្បែកមានផ្លូវវិញ្ញាណឈឺចាប់ដែលបង្កើតអាំងតង្គ



ប្រសាទ ហើយធ្វើដំណើរតាមសរសៃប្រសាទវិញ្ញាណនាំចូលទៅក្នុងខួរឆ្អឹងខ្លួន។ អាំងត្យូចនោះធ្វើដំណើរឡើងតាមខួរឆ្អឹងខ្លួនទៅកាន់ខួរក្បាល។ នៅទីនោះ ខួរក្បាលបកស្រាយអាំងត្យូចនេះធ្វើឱ្យមានការឈឺចាប់។

87. នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទ គេថាអាំងត្យូចប្រសាទធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនណាស់។ ចូរបញ្ជាក់ពីល្បឿនរបស់ វាក្នុង 1វិនាទី និងពន្យល់ថាមានអ្វីកើតឡើងបើវាធ្វើដំណើរយឺត ឬ មានអ្វីមួយទៅបង្អាក់វា?

- អាំងត្យូចប្រសាទធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿន ប្រហែល120m/1វិនាទី។
- ប្រសិនបើអាំងត្យូចប្រសាទធ្វើដំណើរយឺត ឬមានអ្វីទៅបង្អាក់វា នោះវានឹងធ្វើឱ្យណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារគ្មានសមត្ថភាពធ្វើការ។ បន្ទាប់មកអាំងត្យូចនឹងមិនត្រូវបានឆ្លាចឡើយ។ ដូចនេះ សារពាង្គកាយនឹងមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងរំញោចបានឡើយ។

88. តើអាស់កុលមានឥទ្ធិពលដូចម្តេចទៅលើប្រព័ន្ធប្រសាទ?

- អាស់កុល(Alcohol) ឆ្លងកាត់តាមក្រពះ និងភ្លាសពោះវៀនតូចចូលទៅក្នុងប្រដាប់បត់ឈាម។ ជាតិអាស់កុលរលាយហើយ ជ្រាបចូលតាមភ្លាសនៃណឺរ៉ូនដែលអាំងស្ទ័រមិនឱ្យមានការបញ្ចេញណឺរ៉ូបញ្ជូនសារដើម្បីបញ្ជូនអាំងត្យូចប្រសាទឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់។
- វាពន្លឺតសកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទធ្វើឱ្យការពិចារណា វិនិច្ឆ័យ សតិ និង ការប្រមូលផ្តុំអារម្មណ៍ថយចុះ។

89. តើកាហ្វេអ៊ីនមានឥទ្ធិពលដូចម្តេចទៅលើប្រព័ន្ធប្រសាទ?

- កាហ្វេអ៊ីន(Caffeine)ចូលទៅបំផ្លាញប្រព័ន្ធប្រសាទតាមរយៈភេសជ្ជៈ ដូចជាកាហ្វេ កូកា តែ និង ភេសជ្ជៈលើកកម្ពស់ផ្សេងៗ។ វាបង្កើនសកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ ដោយបង្កើនអត្រាចង្វាក់បេះដូង រលាប់រលប់ ដំណើរញ័រញ័រ ដេកមិនលក់ និងឆ្លាចតម្រងនោម ឱ្យផលិតទឹកនោមច្រើន។

90. តើនីកូទីនមានឥទ្ធិពលដូចម្តេចទៅលើប្រព័ន្ធប្រសាទ?

- នីកូទីន (Nicotine) មានក្នុងថ្នាំជក់ (tobacco) បង្កើនអរម៉ូនអេពីណេប្រីន បង្កើនអត្រាចង្វាក់បេះដូង សម្ពាធឈាម ជង្គឹម និងការបញ្ចេញអាស៊ីតក្នុងក្រពះ។



ជំពូក៣ តម្រូវផ្សេងៗរបស់សារពាង្គកាយ

មេរៀនទី២ សរីរាង្គវិញ្ញាណ

I. ចក្ខុវិញ្ញាណ

1. តើសរីរាង្គវិញ្ញាណជាអ្វី?
 - សរីរាង្គវិញ្ញាណ គឺជាសរីរាង្គដែលមានផ្ទុកកោសិកាផ្ទុលដែលរួសទៅនឹងរំញោចខាងក្រៅ ហើយវាជាអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានទៅឱ្យខួរក្បាល ឬខួរឆ្អឹងខ្លះតាមសរសៃប្រសាទវិញ្ញាណនាំ។
2. តើភ្នែកជាសរីរាង្គអ្វី? មាននាទីដូចម្តេច?
 - ភ្នែកជាសរីរាង្គនៃគំហើញ។ វាទទួលបានព័ត៌មានប្រហែល 80% ពីពិភពខាងក្រៅ។
 - វាមាននាទីប្រមូលផ្តុំពន្លឺពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ និងបង្កើតបានជារូបភាព និងប្រាប់ទៅខួរក្បាល ពីរូបភាពនោះ។
3. តើភ្នែកតែងឯងអាចមើលឃើញដែរឬទេ?
 - ភ្នែកតែងឯងមិនអាចមើលឃើញបានទេ ព្រោះភ្នែកគ្រាន់តែជាសរីរាង្គមួយដែលចាប់យករំញោចពន្លឺ និងបំប្លែងព័ត៌មាន ហើយបញ្ជូនទៅខួរក្បាល។ ខួរក្បាល ជាអ្នកបកស្រាយព័ត៌មាននេះឱ្យទៅជាគំហើញ។
4. តើគំហើញរបស់ភ្នែកទាំងពីរដូចគ្នាដែរឬទេ?
 - គំហើញរូបភាពរបស់ភ្នែកទាំងពីរមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច ប៉ុន្តែខួរក្បាលចាប់យករូបភាពពីភ្នែកទាំងពីរ ហើយសំយោគបញ្ចូលគ្នាទៅជារូបភាពតែមួយ ហើយផ្តល់នូវលក្ខណៈនៃគំហើញនៃវិមាត្របីបែប (3D) ដែលអាចឱ្យយើងវិនិច្ឆ័យពីប្រវែង និងទំហំនៃវត្ថុដែលយើងមើលឃើញ។
5. តើភ្នែកមានប៉ុន្មានផ្នែក? អ្វីខ្លះ?
 - ភ្នែកមានពីរផ្នែកគឺ៖
 - ផ្នែកខាងក្រៅជាសរីរាង្គការពារ ដែលមានរោមចិញ្ចើម ត្របកភ្នែក និងរោមភ្នែក។
 - ផ្នែកខាងក្នុងនៃភ្នែកមានកែវភ្នែក ប្រស្រីភ្នែក និងវន្តប្រស្រីភ្នែក។





6. តើគ្រាប់ភ្នែកមានភ្លាសប៉ុន្មានស្រទាប់? អ្វីខ្លះ?

- គ្រាប់ភ្នែកមានភ្លាស៣ស្រទាប់គឺ៖ ក្លរូទីច ក្លរូអ៊ីត និងវេទីន។

7. តើស្រទាប់ក្លរូទីចមានលក្ខណៈដូចម្តេច? មាននាទីអ្វី?

- ស្រទាប់ក្លរូទីច ជាស្រទាប់ក្រៅបង្អស់មានពណ៌ស ក្រាស់ រឹង ហើយស្ងួត។
- វាផ្តល់ទ្រង់ទ្រាយដល់គ្រាប់ភ្នែក និងការពារផ្នែកខាងក្នុងរបស់ភ្នែក។



8. តើករនេជាអ្វី?

- នៅខាងមុខនៃភ្នែក ភ្លាសក្លរូទីចឡើងថ្លាហើយប៉ោងដែលជាករនេរបស់ភ្នែក។
- ករនេនេះមានរាងកោងជាងទម្រង់របស់ភ្នែកទាំងមូល។

9. តើលក្ខណៈកោងរបស់ករនេមានប្រយោជន៍អ្វី?

- ផ្ទៃកោងនៃករនេជួយពន្លឺកាំរស្មីនៃពន្លឺដែលចាំងចូលមកក្នុងភ្នែកឱ្យរួមជួបជាមួយគ្នានៅ កន្លែងតែមួយលើភ្លាសវេទីន។

10. តើភ្លាសក្លរូអ៊ីតមានលក្ខណៈដូចម្តេច? តើវាមាននាទីអ្វីខ្លះ?

- ភ្លាសក្លរូអ៊ីត ជាស្រទាប់កណ្តាលស្តើង និងមានពណ៌ត្នោតចាស់។ វាសម្បូរដោយ សរសៃឈាមដែលជួយដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹមនិងអុកស៊ីសែន ទៅផ្គត់ផ្គង់ឱ្យស្រទាប់វេទីន និងរក្សាលំនឹង សីតុណ្ហភាពក្នុងភ្នែក។ ឯពណ៌ត្នោតចាស់បង្ការការជះត្រឡប់មកវិញនៃពន្លឺ នៅក្នុងគ្រាប់ភ្នែក។

11. តើផ្នែកខាងមុខនៃស្រទាប់ក្លរូអ៊ីតមានអ្វីខ្លះ?

- នៅផ្នែកខាងមុខនៃភ្នែក ស្រទាប់ក្លរូអ៊ីតឡើងក្រាស់ ហើយមានរាងជារង្វង់មូលគឺជា អង្គស៊ីលីយ៉េ។ ចេញពីអង្គស៊ីលីយ៉េ ស្រទាប់នេះឡើងស្តើង ហើយមានរាងមូល គឺជាប្រស្រីភ្នែក។



12. តើអង្គស៊ីលីប៊ែរជាអ្វី? មាននាទីដូចម្តេច?

- អង្គស៊ីលីប៊ែរ ជាសាច់ដុំរលីងដែលស្ថិតនៅជុំវិញភ្នែក។
- អង្គស៊ីលីប៊ែរត្រួតពិនិត្យរូបរាង (ទំហំ) កែវភ្នែកសម្រាប់គំហើញជិត និងគំហើញឆ្ងាយ។

13. តើប្រស្រីភ្នែកមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

- ប្រស្រីភ្នែកកើតឡើងពីសាច់ដុំរលីងដែលមានផ្ទុកជាតិពណ៌។ ជាតិពណ៌នៃស្រទាប់ក្លរូអ៊ីតនេះផ្តល់ពណ៌ដល់ប្រស្រីភ្នែករបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ដូចជាមនុស្សខ្លះមានប្រស្រីភ្នែកពណ៌ប្រផេះ ពណ៌ត្នោត ឬពណ៌ខៀវជាដើម។

14. តើរន្ធប្រស្រីជាអ្វី?

- រន្ធប្រស្រី ជារន្ធចំហមួយនៅចំកណ្តាលប្រស្រីភ្នែក។

15. តើប្រស្រីភ្នែកមាននាទីដូចម្តេច?

- ប្រស្រីភ្នែកមាននាទីតម្រូវទំហំនៃរន្ធប្រស្រីដើម្បីតម្រូវបរិមាណពន្លឺដែលចាំបាច់ចូល។

16. តើសារធាតុអ្វីដែលកំណត់ពណ៌ភ្នែករបស់មនុស្ស?


- សារធាតុដែលកំណត់ពណ៌ភ្នែករបស់មនុស្ស គឺមេឡានីន។

17. ហេតុអ្វីបានជាប្រស្រីភ្នែកមានពណ៌ខុសៗគ្នា?

- ប្រស្រីភ្នែកមានពណ៌ខុសៗគ្នា ព្រោះបរិមាណជាតិពណ៌មេឡានីនប្រែប្រួលទៅតាមមនុស្សម្នាក់ៗ ដូចជា មនុស្សខ្លះមានប្រស្រីភ្នែកពណ៌ប្រផេះ ពណ៌ត្នោត ពណ៌ខៀវជាដើម។

18. តើរន្ធប្រស្រីភ្នែករីកធំ ឬរួមតូចនៅពេលណា?

- នៅពេលដែលមានពន្លឺស្រទន់ រន្ធប្រស្រីភ្នែករីកធំដែលអាចឱ្យពន្លឺចូលទៅក្នុងភ្នែកបានច្រើន។
- នៅពេលពន្លឺថ្ងៃខ្លាំង រន្ធប្រស្រីរួមតូចដែលអាចឱ្យពន្លឺចូលក្នុងភ្នែកបានតិចតួច។





19. តើវេទិនមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

- វេទិន ជាស្រទាប់ក្នុងបង្អស់នៃគ្រាប់ផ្អែក ។ នៅលើស្រទាប់វេទិន មានកោសិកាសរសនីងពន្លឺពីរបែប គឺ កោសិកាកោន និងកោសិកាដំបង។

20. តើស្រទាប់វេទិនកើតឡើងពីស្រទាប់កោសិកាប៉ុន្មានយ៉ាង? អ្វីខ្លះ? ចូរប្រៀបធៀប។

- នៅក្នុងស្រទាប់វេទិនមានកោសិកា៨យ៉ាងគឺ៖
 - ស្រទាប់ក្នុងបង្អស់ជាស្រទាប់កោសិកាជាតិពណ៌។
 - ស្រទាប់កោសិកាសរសនីងពន្លឺពីរប្រភេទ គឺកោសិកាកោន និងកោសិកាដំបង។
 - ស្រទាប់ទី៣ ជាកោសិកាទ្វេប៉ូល។
 - ស្រទាប់ទី៤ ជាស្រទាប់កោសិកាកង់គ្នីយ៉ុង។ ភីបប្រសាទចេញពីកោសិកាកង់គ្នីយ៉ុងផ្គុំបញ្ចូលគ្នា ហើយបង្កើតបានជាសរសៃប្រសាទអុបទិចដែលដឹកនាំអាំងតង់ត្យូប្រសាទទៅកាន់ខួរក្បាល។

21. តើសរសៃប្រសាទអុបទិចជាអ្វី? មាននាទីដូចម្តេច?

- សរសៃប្រសាទអុបទិច ជាភីបប្រសាទចេញពីកោសិកាកង់គ្នីយ៉ុងផ្គុំគ្នាជាសរសៃប្រសាទអុបទិច។
- វាមាននាទីដឹកនាំអាំងតង់ត្យូប្រសាទពីវេទិនទៅកំពកពាយនៃសំបកខួរ។

22. តើកោសិកាដំបង និងកោសិកាកោនសរសនីងពន្លឺអ្វីខ្លះ?

- កោសិកាដំបងសរសនីងពន្លឺខ្សោយ។ វាអាចឱ្យមនុស្សមើលឃើញក្នុងពន្លឺខ្សោយដែលជាគំហើញពណ៌ស-ខ្មៅ។
- កោនសរសនីងពន្លឺខ្លាំងដែលវាអាចញែកពណ៌បានច្បាស់ និងអាចឱ្យមនុស្សមើលឃើញពណ៌ ក្នុងពន្លឺខ្លាំង។

23. តើគំហើញពណ៌នៃកោសិកាទាំងពីរនេះបានដោយសារអ្វី?

- គំហើញស ខ្មៅ និងពណ៌ អាចកើតឡើងបានដោយសារម៉ូលេគុលរ៉ូដូបស៊ីនសរសនីងពន្លឺខ្លាំង។

24. ចូរប្រៀបធៀបកោសិកាកោន និងកោសិកាដំបង។

- លក្ខណៈដូចគ្នា៖ ជាលីវ៉ូនដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់វេទិន។ ជាកោសិកាសរសនីងពន្លឺ និងតភ្ជាប់ដោយកោសិកាទ្វេប៉ូល។



លក្ខណៈខុសគ្នា

កោសិកាកោន	កោសិកាដំបង
• ដង់ទ្រីតមានទម្រង់ជាកោន • រួសនឹងពន្លឺខ្លាំងដែលអាចញែកពណ៌ខុសគ្នា • ទទួលខុសត្រូវក្នុងគំហើញពណ៌ • ក្នុងផ្សា មានកោសិកាកោនច្រើន តែក្រៅផ្សា មានកោសិកាកោនតិច។	• ដង់ទ្រីតមានទម្រង់ជាដំបង • រួសនឹងពន្លឺខ្សោយដែលមិនអាចញែកពណ៌ខុសគ្នាទេ • ទទួលខុសត្រូវក្នុងគំហើញស ខ្មៅ • ក្នុងផ្សា គ្មានកោសិកាដំបង តែក្រៅផ្សា មានកោសិកាដំបងច្រើន។

25. តើនៅលើស្រទាប់រេទីនមានអ្វីខុសគ្នាសម្គាល់?

- នៅលើស្រទាប់រេទីនមានស្នាមល្បឿង និងចំណុចខ្វាក់។
- ស្នាមល្បឿង ឬ ផ្សា ជាផ្នែករួសនឹងពន្លឺជាងគេនៅលើស្រទាប់រេទីន។ វាអាចឱ្យយើងមើលឃើញពណ៌។
- ចំណុចខ្វាក់(Blind spot) ជាកន្លែងដែលសរសៃឈាម និងសរសៃប្រសាទភ្ជាប់នឹងគ្រាប់ភ្នែក។ វាគ្មានកោសិកាសរសៃពន្លឺទេ ហើយក៏មិនផ្តល់ព័ត៌មានទៅកាន់ខួរក្បាលដែរ។

26. តើភ្នែកសរសៃមួយៗនៃគ្រាប់ភ្នែកមាននាទីដូចម្តេចខ្លះ?

- ស្រទាប់ក្លរូទីច ជាស្រទាប់ក្រៅដែលមានពណ៌សក្រាស់ រឹង ហើយស្ងួត។ វាមាននាទីផ្តល់ទ្រង់ទ្រាយដល់គ្រាប់ភ្នែក និងការពារផ្នែកខាងក្នុងរបស់ភ្នែក។
- ស្រទាប់ក្លរូទីត ជាស្រទាប់កណ្តាល ស្តើងសំបូរសរសៃឈាម និងជាតិពណ៌ត្នោតចាស់។ សរសៃឈាម នេះផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមទៅផ្គត់ផ្គង់ស្រទាប់រេទីន និងរក្សាលំនឹងសីតុណ្ហភាពក្នុងភ្នែក។ ជាតិពណ៌ត្នោតចាស់បង្ការពន្លឺជះត្រឡប់មកវិញ។
- ស្រទាប់រេទីន ជាស្រទាប់ក្នុងដែលមានកោសិកាសរសៃពន្លឺពីរបីបី កោសិកាកោន និងកោសិកាដំបង។ កោសិកាកោនបង្កើតឱ្យមានគំហើញពណ៌។ កោសិកាដំបងបង្កើតឱ្យមានគំហើញខ្មៅ ស។



27. ចូរពណ៌នាពីដំណើរការបង្កើតអាំងត្យូចប្រសាទនៅក្នុងភ្នែក។


- គំហើញស ខ្លោ និងពណ៌ អាចកើតឡើងបានដោយសារជាតិពណ៌រ៉ូដូបស៊ីនស្ថានីយ៍ពន្លឺខ្លាំង។ ម៉ូលេគុលរ៉ូដូបស៊ីនផ្សំឡើងពីស្រទ្វាយនៃជីវជាតិ A ជាមួយប្រូតេអ៊ីនក្នុងកោសិកាកោន និងកោសិកាដំបង។ នៅពេលពន្លឺប៉ះនឹងកោសិកាកោននិងកោសិកាដំបង វាបំបែកសម្ព័ន្ធគីមីនៅក្នុងម៉ូលេគុលរ៉ូដូបស៊ីន រួចបង្កើតបានជាអាំងត្យូចប្រសាទនាំទៅកាន់ខួរក្បាលតាមសរសៃប្រសាទអុបទិច។ បន្ទាប់មកខួរក្បាលបកស្រាយអាំងត្យូចប្រសាទទៅជាគំហើញ។

28. តើវេទិនត្រូវបានឆ្លាចយ៉ាងដូចម្តេច?

- នៅលើកោសិកាកោន និងកោសិកាដំបងប្រូតេអ៊ីនផ្សំជាមួយជាតិពណ៌ដែលបង្កើតបានជាម៉ូលេគុលរ៉ូដូបស៊ីន។ នៅពេលពន្លឺប៉ះជាមួយកោសិកាកោន និងកោសិកាដំបង វាបំបែកសម្ព័ន្ធគីមីនេះបង្កើតជាអាំងត្យូចប្រសាទដែលធ្វើដំណើរចេញពីកោសិកាកោន ឬកោសិកាដំបង តាមសរសៃប្រសាទអុបទិចទៅកាន់ខួរក្បាល។ បន្ទាប់មកខួរក្បាលបកស្រាយអាំងត្យូចជាគំហើញ។

29. តើកែវភ្នែកកើតឡើងពីអ្វី? និង មានរូបរាងដូចម្តេច?

- កែវភ្នែកកើតឡើងពីសារធាតុទន់ អន្លិល។ វាមានផ្នែកកណ្តាលក្រាស់ និងគែមជុំវិញស្តើង។



30. តើឃ្លប់នៃគ្រាប់ភ្នែកមនុស្សមានសារធាតុអ្វីខ្លះ?

- ឃ្លប់គ្រាប់ភ្នែក មានបីផ្នែកគឺ៖
 - ផ្នែកទី១ស្ថិតនៅខាងមុខចន្លោះករនេ និងប្រស្រីភ្នែក។



- ផ្នែកទី២ ស្ថិតនៅខាងក្រោយចន្លោះប្រស្រីភ្នែក និងកែវភ្នែក។
ផ្នែកទាំងពីរនេះមានសារធាតុរាវថ្នាំដែលជាអ៊ុយម៉ែនទឹក។
- ផ្នែកទី៣ ជាលំហនៅពីក្រោយកែវភ្នែកដែលមានសារធាតុរាវថ្នាំអន្លិល។ សារធាតុរាវនេះ
ជាអ៊ុយម៉ែនខ្លះ។

31. តើសារធាតុរាវទាំងពីរ (អ៊ុយម៉ែនទឹក និងអ៊ុយម៉ែនខ្លះ) មាននាទីដូចម្តេច?

- អ៊ុយម៉ែនទឹកមាននាទីរក្សាលំនឹង នៅក្នុងយួរប្រាប់ភ្នែក។
- អ៊ុយម៉ែនខ្លះមាននាទីផ្តល់នូវទម្រង់មាំមួនប្រាប់ភ្នែក និងបង្ការភ្នែកពីសម្ពាធខាងក្រៅ។

32. តើអ៊ុយម៉ែនទឹក និងអ៊ុយម៉ែនខ្លះផលិតចេញពីអ្វី?

- អ៊ុយម៉ែនទឹក និងអ៊ុយម៉ែនខ្លះ ផលិតចេញពីសរសៃប្តូរនៅក្នុងអង្គស៊ីប៊ីយ៉េ។ វាក៏ផ្តល់សារធាតុ
ចិញ្ចឹម បន្ថែមសម្រាប់កែវភ្នែក និងស្រទាប់រេទីន។

33. ហេតុអ្វីបានជាកង្វះវីតាមីនA អាចបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺខ្វាក់មាស់?

- បានជាកង្វះវីតាមីនA អាចបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺខ្វាក់មាស់ ពីព្រោះគំហើញ ស-ខ្មៅ និងពណ៌
កើតឡើង ដោយសារជាតិពណ៌រូសនិងពន្លឺស្រឡាយ វីតាមីនA។ កង្វះវីតាមីនAបណ្តាលឱ្យ
មើលមិនឃើញ នៅពេលមានពន្លឺខ្សោយ។

34. តើសរីរាង្គឧបសម្ព័ន្ធរបស់កែវភ្នែកមានអ្វីខ្លះ? ចូររៀបរាប់។


- សរីរាង្គឧបសម្ព័ន្ធមានពីរផ្នែកគឺ៖ សរីរាង្គការពារ និងសរីរាង្គចលករ។
 - សរីរាង្គការពារមាន ប្រឡង់ភ្នែក ត្របកភ្នែក រោមភ្នែក ក្រពេញទឹកភ្នែក។
 - សរីរាង្គចលករមាន សាច់ដុំភ្នែក។

35. តើអ្វីជាប្រឡង់ភ្នែកមាននាទីអ្វី?

- អ្វីជាប្រឡង់ភ្នែក ការពារភ្នែកទល់នឹងការប៉ះទង្គិចផ្សេងៗ។ នៅលើអ្វីនេះមានរន្ធជាច្រើន ដែល
អាចឱ្យសរសៃឈាមនិងសរសៃប្រសាទជ្រៀតចូលទៅក្នុងយួរប្រាប់ភ្នែកបាន។

36. តើត្របកភ្នែកមាននាទីអ្វី?

- ត្របកភ្នែក មាននាទីការពារភ្នែកពីការហុយចូលរបស់ផូបេដី និងសត្វល្អិត។
- នៅលើត្របកភ្នែកនីមួយៗមានរោមភ្នែកប្រហែល100ដែលជាសំណាញ់ការពារភ្នែក។



37. តើក្រពេញទឹកភ្នែកមាននាទីអ្វី?

- ក្រពេញទឹកភ្នែក មាននាទីបញ្ចេញទឹកភ្នែកដែលធ្វើឱ្យប្រឡង់ភ្នែកមានភាពសើម ការពារភាពស្ងួត និងការរលាកនៅពេលប៉ះនឹងធូលី ពន្លឺខ្លាំង។

38. តើទឹកភ្នែកកើតឡើងពីសារធាតុអ្វីខ្លះ?


- ទឹកភ្នែកកើតឡើងពីទឹក អំបិល លីសូសូម និងសមាសធាតុសរីរាង្គផ្សេងៗដែលផលិតចេញពី ភ្នាសស្មៅស្មៅ។

39. តើសាច់ដុំភ្នែកមាននាទីធ្វើអ្វី?

- សាច់ដុំភ្នែកមាននាទីបង្កើនក្រាបភ្នែកធ្វើឱ្យភ្នែកមានចលនា។

40. តើសាច់ដុំភ្នែកមានប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?

- សាច់ដុំភ្នែកមានចំនួន៦គឺ៖ សាច់ដុំលើ សាច់ដុំលើបញ្ជិត សាច់ដុំកណ្តាល សាច់ដុំចំហៀង សាច់ដុំក្រោម និង សាច់ដុំក្រោមបញ្ជិត។





41. តើភាពមិនប្រក្រតីនៃភ្នែកមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?

- ភាពមិនប្រក្រតីនៃភ្នែកមានបួនប្រភេទគឺ៖
 - ភ្នែកម្ជុប (Myopia)
 - ភ្នែកអ៊ីពែមេត្រូប (Hypermetropic)
 - ប្រេសប៊ីត (Presbyte) និង
 - អាស្តីម៉ាត (Astigmatisme)។

42. តើភ្នែកម្ជុបមានលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះ?

- ភ្នែកម្ជុបគឺ មើលវត្ថុឆ្ងាយមិនច្បាស់។ ចម្ងាយអប្បបរមានៃគំហើញច្បាស់ គឺខ្លីជាងភ្នែកធម្មតា។ ចំពោះវត្ថុនៅឆ្ងាយ រូបភាពកើតឡើងនៅខាងមុខទទឹង គឺប្រព័ន្ធអុបទិចបង្រួមខ្លាំងពេក។
- ដូចនេះត្រូវកែភ្នែកម្ជុបដោយពាក់វ៉ែនតាឡង់ទីពង្រីកដើម្បីទាញរូបភាពមកកើតនៅលើទទឹងវិញ។

43. តើភ្នែកអ៊ីពែមេត្រូប និងប្រេសប៊ីតមានលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះ?

- ភ្នែកអ៊ីពែមេត្រូប និងប្រេសប៊ីត៖ មើលវត្ថុជិតច្បាស់។ ចម្ងាយអប្បបរមានៃគំហើញច្បាស់ គឺឆ្ងាយជាងភ្នែកធម្មតា។ ចំពោះវត្ថុនៅជិត រូបភាពកើតឡើងនៅខាងក្រោយទទឹង គឺប្រព័ន្ធអុបទិចបង្រួមតិច។ ដូចនេះត្រូវកែភ្នែកអ៊ីពែមេត្រូបដោយពាក់វ៉ែនតាឡង់ទីបង្រួមដើម្បីទាញរូបភាពមកកើតនៅលើទទឹងវិញ។

44. តើភ្នែកអាស្តីម៉ាតមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

- ចំពោះភ្នែកអាស្តីម៉ាត៖ រូបភាពតែមួយមើលឃើញច្បាស់ខ្លះ និងមិនច្បាស់ខ្លះ។ កំណែងគ្រាប់ភ្នែកមិនស្មើគ្នា។ ដូចនេះត្រូវកែភ្នែកអាស្តីម៉ាតដោយពាក់វ៉ែនតាឡង់ទីមិនស្មើគ្នា។


45. ដើម្បីបង្កើតរូបភាពមួយច្បាស់ល្អ តើកែភ្នែកនិងខ្លួនក្បាលធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

- កែភ្នែកមាននាទីរៀបចំការស្តីពីទាំងនោះឱ្យទៅជារូបភាព។
- ដំបូងពន្លឺនីមួយៗប្រាប់ខ្លួនក្បាលត្រឹមតែបំណែកតូចៗនៃរូបភាពដែលវាចាប់បាន។ បន្ទាប់មកខ្លួនក្បាលដាក់បំណែកតូចៗទាំងនោះបញ្ចូលគ្នាឱ្យទៅជារូបភាពមួយពេញលេញ។ អង្គស៊ីរ៉េប៊ីល និងសរសៃចំណងជួយកែភ្នែកដើម្បីបង្កើតរូបភាពច្បាស់ល្អ។



46. ដើម្បីពិនិត្យមើលរូបភាពមួយច្បាស់ល្អ តើកែវភ្នែកត្រូវមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

- កែវភ្នែកត្រូវមានកម្រាស់ត្រឹមត្រូវ៖
 - កែវភ្នែកក្រាស់ឱ្យរូបភាពនៃវត្ថុមួយច្បាស់ នៅពេលវត្ថុនោះស្ថិតនៅជិតវា។
 - កែវភ្នែកស្តើងឱ្យរូបភាពនៃវត្ថុមួយច្បាស់ នៅពេលវត្ថុនោះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីវា។



47. តើកម្លាំងសម្របតម្រូវជាអ្វី?

- កម្លាំងសម្របតម្រូវ ជាបំណិនដែលធ្វើឱ្យកែវភ្នែកមានកម្រាស់ត្រឹមត្រូវ អាចឱ្យយើងមើលឃើញវត្ថុផ្សេងៗស្ថិតនៅចម្ងាយខុសៗគ្នា។

48. តើអង្គស៊ីលីប៊ែរចូលរួមដូចម្តេចក្នុងការសម្របតម្រូវរបស់ភ្នែក?

- ការចូលរួមរបស់អង្គស៊ីលីប៊ែរ ក្នុងការសម្របតម្រូវរបស់ភ្នែក៖ ដោយសារអង្គស៊ីលីប៊ែរជាសាច់ដុំជុំវិញកែវភ្នែក ដូចនេះពេលមើលវត្ថុជិត អង្គស៊ីលីប៊ែរកម្រាស់ ទាញចូល (រួមតូច) ហើយសរសៃចំណងប្រធានលុះ នាំឱ្យកែវភ្នែកឡើងក្រាស់។ ប៉ុន្តែនៅពេល មើលវត្ថុឆ្ងាយ អង្គស៊ីលីប៊ែរបន្លូរ (ទាញចេញ) ហើយសរសៃចំណងឡើងតឹង ហើយទាញកែវ ភ្នែកឱ្យឡើងស្តើង ដែលធ្វើឱ្យយើងមើលឃើញរូបភាពនៃវត្ថុឆ្ងាយនោះបានច្បាស់។


49. ហេតុអ្វីបានជានៅពេលដែលអ្នកដើរចេញពីកន្លែងដែលមានពន្លឺខ្លាំង ហើយចូលទៅក្នុងកន្លែងមួយដែលមានពន្លឺតិចតួច អ្នកមិនអាចមើលឃើញភ្លាមៗនៅក្នុងកន្លែងនោះ?

- ព្រោះនៅពេលអ្នកនៅកន្លែងមានពន្លឺខ្លាំង កោសិកាកោនដែលជាធាតុរួមសំខាន់នៃពន្លឺខ្លាំងមានសកម្មភាពខ្លាំង រីឯកោសិកាដំបងដែលជាធាតុទទួលពន្លឺខ្សោយមិនធ្វើការទេ។ ដូចនេះ នៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ កោសិកាដំបងចាប់ផ្តើមមានសកម្មភាពជំនួសកោសិកាកោន

ហើយរូសនឹងពន្លឺខ្សោយបន្តិចម្តងៗ។ ដូចនេះ បន្ទាប់ពីបន្ទាំងពន្លឺខ្សោយបានបន្តិច ភ្នែករបស់អ្នកក៏អាចមើលឃើញក្នុងពន្លឺខ្សោយវិញ។

50. តើគេប្រដូចកែវភ្នែកទៅនឹងអ្វី? នៅពេលក្រឡេកមើលវត្ថុមួយ តើភ្នែករបស់យើងបង្កើតរូបភាពយ៉ាងដូចម្តេច?

- កែវភ្នែកប្រៀបប្រដូចទៅនឹងម៉ាស៊ីនថតរូបមួយ។ ប្រសិនបើភ្នែកជាដូចជាប្រាម។ មជ្ឈដ្ឋានថ្នាំបង្កើតបានជាអុបសិទ្ធិប ឯស្រទាប់ទើនមាននាទីដូចជាហ្វីលមរូបថត។
- នៅពេលយើងមើលវត្ថុណាមួយ កែវភ្នែកបង្កើតរូបភាពនៃវត្ថុនោះនៅលើស្រទាប់ទើន។ រូបភាពនេះមានលក្ខណៈត្រលប់ចុះក្រោម។ បន្ទាប់មកខួរក្បាលត្រលប់រូបភាពនៅលើទើន មកសភាពដើមវិញ ហើយកែវភ្នែករបស់យើងមើលវត្ថុនោះក្នុងសភាពធម្មតាវិញ។




II. រោគវិញ្ញាណ

1. តើសួរសម្តែង ជាន់ញោចអ្វី?

- សួរសំឡេង ជាន់ញោចមេកានិច។

2. តើត្រចៀកមាននាទីអ្វី?

- ត្រចៀកមាននាទី៖
 - ចាប់យកសួរ និង
 - ផែនក្បាលនឹង។





2. តើត្រចៀកមានប៉ុន្មានផ្នែក? អ្វីខ្លះ?

- ត្រចៀកចែកជា បីផ្នែកសំខាន់ៗគឺ ត្រចៀកក្រៅ ត្រចៀកកណ្តាល និងត្រចៀកក្នុង។

3. តើត្រចៀកក្រៅកើតឡើងពីអ្វីខ្លះ?


- ត្រចៀកក្រៅកើតឡើងពី៖ ស្លឹកត្រចៀក និងបំពង់សោតវិញ្ញាណ(រន្ធត្រចៀក)
 - ស្លឹកត្រចៀកជាបន្ទះស្បែករាងឡាវ ដែលទ្រទ្រង់ដោយឆ្អឹងខ្លីៗវាមាននាទីប្រមូលផ្តុំរលកសូរ។
 - បំពង់សោតវិញ្ញាណមាននាទីនាំរលកសូរទៅកាន់ ក្រដាសត្រចៀក។
 - ចំពោះមនុស្សពេញវ័យបំពង់សោតវិញ្ញាណកើតពីឆ្អឹងខ្លី និងឆ្អឹងមានប្រវែង 3-4cm ។

4. តើអាចម៍ត្រចៀកកើតឡើងពីអ្វី? មាននាទីអ្វី?

- អាចម៍ត្រចៀក ជាសារធាតុពិសេសមានលក្ខណៈដូចក្រមួនស្ថិតនៅតាមបណ្តោយបំពង់សោតវិញ្ញាណ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងពីសារធាតុដែលបញ្ចេញដោយក្រពេញសេបូមនិងក្រពេញញើសលាយបញ្ចូលគ្នា។
- វាមាននាទីការពារមិនឱ្យវត្ថុផ្សេងៗ ធ្លូចចិត្ត សត្វល្អិត ឬមេរោគចូលក្នុងត្រចៀកបាន។

5. តើត្រចៀកកណ្តាលរួមមានអ្វីខ្លះ?

- ត្រចៀកកណ្តាលរួមមាន៖
 - ✓ ក្រដាសត្រចៀក
 - ✓ ឆ្អឹងតូចៗ៣ (ឆ្អឹងញ្ច្រូង ឆ្អឹងទ្រនាប់ និងឆ្អឹងឈ្នាន់)
 - ✓ និងបង្អួចរាងពងក្រពើ (ប្រមោយអឺស្តាស)។





6. តើក្រដាសត្រចៀកជាអ្វី? ស្ថិតនៅឯណា?

- ក្រដាសត្រចៀក ជាឆ្មាសមួយស្តើង ហើយយឺត ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងចុងនៃបំពង់សោតវិញ្ញាណ និងជាផ្នែកផ្ដើមនៃត្រចៀកកណ្តាល។

7. តើប្រមោយអីស្ថាសជាអ្វី? មាននាទីអ្វី?

- ប្រមោយអីស្ថាស ជាបំពង់មួយដែលភ្ជាប់ត្រចៀកកណ្តាលទៅនឹងបំពង់ក។
- វាមាននាទីធ្វើឱ្យសម្ពាធខាងក្នុងនៃត្រចៀកកណ្តាលស្មើនឹងសម្ពាធខាងក្រៅសារពាង្គកាយដើម្បី បង្ការការរំហែកក្រដាសត្រចៀក។

8. តើត្រចៀកកណ្តាលមាននាទីយ៉ាងដូចម្តេច? ចូរពន្យល់។ (ហេតុអ្វីត្រចៀកកណ្តាលជាអ្នកបំពង់សំឡេង?)

- ត្រចៀកកណ្តាលមាននាទីជាអ្នកបំពង់សម្លេងឱ្យកាន់តែខ្លាំង ព្រោះ ត្រចៀកកណ្តាលទាក់ទងនឹង ត្រចៀកក្នុងដោយសារបង្កូរចរាចរពងក្រពើដែលពាសដោយភ្នាស។ វាសម្លេងពីក្រដាសត្រចៀក តាមរយៈចង្វាក់ឆ្អឹងតូចៗមកកាន់បង្កូរចរាចរពងក្រពើ។ លំព្រួននៃក្រដាសត្រចៀកនេះបណ្តាលឱ្យខ្លួន ញ័រញ័យដល់បង្កូរចរាចរពងក្រពើ។

9. ហេតុអ្វីបានជាមេរោគនៅក្នុងច្រមុះ និងបំពង់កអាចចម្លងជំងឺដល់ត្រចៀកបាន?

- បានជាមេរោគនៅក្នុងច្រមុះ និងបំពង់កអាចចម្លងជំងឺដល់ត្រចៀកបាន ព្រោះត្រចៀកកណ្តាល ភ្ជាប់ទៅនឹងបំពង់កដោយសារប្រមោយអីស្ថាសដែលអាចឱ្យមេរោគធ្វើដំណើរពីច្រមុះទៅ បំពង់កតាមប្រមោយនេះ។

10. តើជំងឺត្រចៀកមានអាការៈដូចម្តេចខ្លះ?

- ជំងឺត្រចៀកមានអាការៈដូចជា ការឈឺចាប់ក្នុងត្រចៀក ហ៊ឹងត្រចៀក រមាស់ក្នុងត្រចៀក ត្រចៀកមានអារម្មណ៍ក្តៅ មានអារម្មណ៍ថាមានធាតុរាវក្នុងត្រចៀក។ ជំងឺឆ្លងមួយចំនួនអាច ឱ្យក្រដាសឆ្លុះឆ្លាយ។

11. តើផ្នែកនៃត្រចៀកក្នុងមានអ្វីខ្លះ?

- ផ្នែកនៃត្រចៀកក្នុងមានដូចជា៖
 - បំពង់រាងគូទខ្យង (មាននាទីក្នុងល្បី)
 - បំពង់រាងពាក់កណ្តាលរង្វង់ចំនួនបី (មាននាទីថែរក្សាថែរលំនឹង)។



12. តើរលកសូរកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?

- សំឡេងនីមួយៗធ្វើឱ្យខ្យល់ដែលនៅជុំវិញប្រភពសំឡេងញ័រញ័រ។ លំញ័រនេះបង្កើតបានជារលកសូរ។

13. តើល្បឿនកើតឡើងនៅផ្នែកណាមួយនៃត្រចៀក?

- ល្បឿនកើតឡើងនៅពេលរលកសូរធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ត្រចៀកក្នុង។

14. ចូរពណ៌នាពីដំណើរបកស្រាយរលកសូរ។

- រលកសូរដែលប្រមូលផ្តុំនៅត្រចៀកក្រៅចុះតាមបំពង់សោតវិញ្ញាណទៅកាន់ក្រដាសត្រចៀក។ រលកសូរនេះបណ្តាលឱ្យក្រដាសត្រចៀកញ័រ។ លំញ័រនេះត្រូវបានដឹកនាំឆ្លងកាត់ត្រចៀកកណ្តាលតាមឆ្អឹងតូចៗបី។ បន្ទាប់មកឆ្អឹងតូចទីបីញ័រផ្លូវនឹងភ្នាសស្តើងនៃបង្អួចរាងពងក្រពើ។ លំញ័ររបស់ភ្នាសនេះធ្វើឱ្យធាតុរាវក្នុងបំពង់រាងគូឡូងញ័រដែលបណ្តាលឱ្យរោមល្អិតៗនៃកោសិកាធូលក្នុងបំពង់នោះញ័រ។ បន្ទាប់មកកោសិកាធូលប្តូរលំញ័រទៅជារំងាប់ប្រសាទ ដែលស្ថិតនៅជុំវិញចុងភីបប្រសាទ រួចត្រូវបានដឹកនាំទៅកាន់សំបកខ្លួនតាមសរសៃប្រសាទ សោតវិញ្ញាណ និងត្រូវបកស្រាយជាសំឡេង។

15. តើរលកសូរមានឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកផ្សេងៗនៃត្រចៀកយ៉ាងដូចម្តេច?

- ស្លឹកត្រចៀកប្រមូលផ្តុំរលកសូរ ហើយរន្ធត្រចៀក ដឹកនាំរលកសូរទៅកាន់ត្រចៀកកណ្តាល ដោយឆ្លងកាត់ក្រដាសត្រចៀក។ ក្រដាសត្រចៀកញ័រ ហើយលំញ័រនេះត្រូវបានឆ្លងកាត់ត្រចៀកកណ្តាលតាមឆ្អឹងតូចៗបី។ ឆ្អឹងតូចទីបីញ័រ បណ្តាលឱ្យភ្នាសបង្អួចរាងពងក្រពើញ័រ។ លំញ័រនៃភ្នាសនេះ ធ្វើឱ្យធាតុរាវនៅក្នុងបំពង់រាងគូឡូងញ័រដែលបណ្តាលឱ្យរោមល្អិតៗ នៃកោសិកាធូលក្នុងបំពង់នោះញ័រ។ ក្រោយមកកោសិកាធូលប្តូរលំញ័រទៅជារំងាប់ប្រសាទ។

16. តើផ្នែកណាមួយនៃត្រចៀកដែលមាននាទីក្នុងការរក្សាលំនឹងរបស់សារពាង្គកាយ?

- ត្រចៀកផ្នែកខាងក្នុង និងខ្លួនតូចសហការគ្នាដើម្បីរក្សាលំនឹងរបស់សារពាង្គកាយ។

17. តើត្រចៀក និងខ្លួនតូចសហការគ្នាថែរក្សាលំនឹងយ៉ាងដូចម្តេច?

- ត្រចៀកក្នុងមានបំពង់ពាក់កណ្តាលរង្វង់ចំនួនបីដែលពេញទៅដោយសារធាតុរាវខាប់ និងមានស្រទាប់កោសិកាទាំងបី។ ពេលបង្វិលក្បាល ឬ គ្រវីខ្លួន សារធាតុរាវ និង រោមញ័រធ្វើចលនា។ ចលនាមេកានិចនៃរោមញ័រឆ្លាចចុងភីបប្រសាទឱ្យបង្កើតជារំងាប់ប្រសាទ។ បន្ទាប់មករំងាប់ប្រសាទធ្វើដំណើរតាមសរសៃប្រសាទសោតវិញ្ញាណទៅកាន់ខ្លួនតូច។ ខ្លួនតូចបកស្រាយទិសដៅរបស់



ចលនា ហើយបញ្ជូនអាំងតង់ស៊ីតេប្រសាទទៅកាន់ខ្លួនធំៗ នៅទីនោះអាំងតង់ស៊ីតេដែលចេញពីឈើរ៉ូនចលករ ឆ្លាចសាច់ដុំផ្នែកក្បាល និងកង្វិរក្បាច់តាំងរបស់ក្បាល។

18. ហេតុអ្វីបានជាត្រចៀកដែលមានជំងឺឆ្លងមានបញ្ហាទៅនឹងតុល្យភាពលំនឹង?

- មេរោគបង្កជំងឺឆ្លងបណ្តាលឱ្យត្រចៀកឡើងហើមដែលធ្វើឱ្យសារធាតុរាវនៅក្នុងត្រចៀកដាក់សម្ពាធទៅលើបំពង់ពាក់កណ្តាលរង្វង់ និងបណ្តាលឱ្យរោមល្អិតៗនៅលើកោសិកាផ្ទុលនៅក្នុងបំពង់នោះឱ្យសញ្ញានៃវិញ្ញាណតុល្យភាពនៅក្នុងខ្លួនក្បាលមិនត្រឹមត្រូវ។

19. តើសរីរាង្គបកស្រាយសួរសំឡេងជាត្រចៀក ឬជាអ្វី? ចូរបកស្រាយ។

- ត្រចៀកមិនមែនជាសរីរាង្គបកស្រាយសួរសំឡេងទេ។ វាជាសរីរាង្គដែលមានផ្ទុលវិញ្ញាណ ចាប់យករលកសួរ ហើយបំប្លែងជាអាំងតង់ស៊ីតេប្រសាទ បញ្ជូនតាមសរសៃប្រសាទសោតវិញ្ញាណទៅកាន់ខ្លួនក្បាល (កំពកសៀតផ្តា) ដែលនៅទីនោះ ត្រូវបានបកស្រាយជា សំឡេង។

20. ហេតុអ្វីបានជាពេលឈប់បង្វិលខ្លួន តែនៅតែមានអារម្មណ៍ថាឆ្គងឆោង?

- បានជានៅពេលឈប់បង្វិលភ្លាម សារធាតុរាវនេះនៅក្នុងបំពង់ពាក់កណ្តាលរង្វង់នៅ មានចលនា និងឆ្លាចចុងភីបប្រសាទឱ្យបញ្ជូនអាំងតង់ស៊ីតេប្រសាទទៅកាន់ខ្លួនក្បាល។

21. តើធាតុរាវ និងរោមល្អិតៗក្នុងបំពង់រាងកូនខ្វងនៃត្រចៀកក្នុងមាននាទីអ្វី?

- ធាតុរាវ និងរោមល្អិតៗក្នុងបំពង់រាងកូនខ្វងនៃត្រចៀកក្នុងបណ្តាលឱ្យរោមល្អិតៗនៃកោសិកាផ្ទុលស្រទាប់ក្នុងរបស់បំពង់រាងកូនខ្វងញ័រ។ បន្ទាប់មក លំញ័រនេះប្តូរជាអាំងតង់ស៊ីតេប្រសាទ។


III. ផ្នែកវិញ្ញាណ

1. តើអណ្តាតមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

- អណ្តាតមានលក្ខណៈជាបន្ទះដែលមានអព្រាញនៅ ពាសពេញផ្ទៃអណ្តាត ជាពិសេសនៅផ្នែកកណ្តាលនៃអណ្តាត។

2. តើអព្រាញជាអ្វី?

- អព្រាញ ជាកន្ទួលតូចៗដែលបង្កប់ពន្លកជីវ្យាវិញ្ញាណ។







3. តើពន្លកជីវ្ហាវិញ្ញាណជាអ្វី? ស្ថិតនៅឯណា?

- ពន្លកជីវ្ហាវិញ្ញាណ ជាផ្នូលវិញ្ញាណរសជាតិ។ ភាគច្រើន វាស្ថិតនៅលើផ្ទៃអណ្តាត ប៉ុន្តែវាក៏មាននៅលើផ្ទៃនៃក្រអូមមាត់ ដើមក និងកន្លើតផងដែរ។

4. តើពន្លកជីវ្ហាវិញ្ញាណមានទម្រង់ដូចម្តេច? ចូរប្រាប់។

- ពន្លកជីវ្ហាវិញ្ញាណមានរាងជាពងក្រពើដែលស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្ទៃជញ្ជាំងនៃអព្រាញនីមួយៗ។ អព្រាញនីមួយៗមានពន្លកជីវ្ហាវិញ្ញាណច្រើន។ ពន្លកជីវ្ហាវិញ្ញាណនីមួយៗកើតពីកោសិកាទម្រង់គឺ កោសិកាទម្រង់ និងកោសិកាពន្លកជីវ្ហាវិញ្ញាណដែលបញ្ចប់ដោយរន្ធល្អិតៗ។ រន្ធល្អិតៗទាំងនោះបើកចំហទៅរកផ្ទៃនៃអណ្តាតនៅក្នុងរន្ធរសជាតិមួយ។ នៅក្នុងកោសិកាពន្លកជីវ្ហាវិញ្ញាណមានណឺរ៉ូនវិញ្ញាណសាំមួយ ឬច្រើនដែលផ្តុំគ្នាបានជាសរសៃប្រសាទវិញ្ញាណសាំ។



5. តើរសជាតិជាអ្វី?

- រសជាតិជាសារធាតុគីមីនៅក្នុងអាហារ បន្លែ ផ្លែឈើ ឬធាតុសង្ខេប។

6. តើរសជាតិសំខាន់ៗមានប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?

- រសជាតិសំខាន់ៗបួនគឺ ផ្អែម ប្រៃ ជួរ និងល្អិត។

7. តើអណ្តាតរួសនឹងរសជាតិអ្វីខ្លះ? ចូរបញ្ជាក់ទីតាំងលើអណ្តាតដែលរួសនឹងរសជាតិសំខាន់ៗ។

- អណ្តាតរួសនឹងរសជាតិបួនសំខាន់គឺ ផ្អែម ប្រៃ ជួរ និងល្អិត។
- ទីតាំងលើអណ្តាតដែលរួសនឹងរសជាតិសំខាន់ៗបួនមាននៅ៖



- ផ្នែកខាងចុងអណ្តាតរួសនឹងរសជាតិផ្អែម
- ផ្នែកគល់អណ្តាតរួសនឹងរសជាតិល្វីង
- ផ្នែកចំហៀង ទាំងសងខាងអណ្តាតពាក់កណ្តាលខាងមុខ រួសនឹងរសជាតិប្រៃ
- ផ្នែកចំហៀងទាំងសងខាងអណ្តាតពាក់កណ្តាលខាងក្រោយរួសនឹងរសជាតិជួរ។

8. ហេតុអ្វីបានជាពន្លកជីវ្ហាវិញ្ញាណរួសនឹងសារធាតុជាសូលុយស្យុង?

- បានជាពន្លកជីវ្ហាវិញ្ញាណរួសទៅនឹងសារធាតុជាសូលុយស្យុង ព្រោះសារធាតុជាសូលុយស្យុង ងាយប្រជាបច្ចុប្បន្ននឹងអាចឆ្លាចពន្លកជីវ្ហាវិញ្ញាណបាន។

9. តើអាំងត្រូចកើតមាននៅកន្លែងណានៃអណ្តាត?

- អាំងត្រូចកើតមាននៅកន្លែងនៅពេលពន្លកជីវ្ហាវិញ្ញាណត្រូវបានឆ្លាច កោសិកាវិញ្ញាណរួសនឹង
- រសជាតិក៏បង្កើតអាំងត្រូចប្រសាទដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ខួរក្បាលត្រង់កំពកសៀតផ្កា តាមសរសៃប្រសាទវិញ្ញាណនាំបន្ទាប់មកសំបកខួរបកប្រែអាំងត្រូចនេះឱ្យទៅជារសជាតិ។

10. តើវិញ្ញាណរសជាតិ និងក្លិនមានទំនាក់ទំនងគ្នាដូចម្តេច?

- រសជាតិនៃអាហារទាក់ទងនឹងវិញ្ញាណរសជាតិផង និងវិញ្ញាណក្លិនផង។ ក្លិនឈ្មួញរបស់អាហារ ឆ្លាចក្លិន ហើយអាហារនៅក្នុងមាត់ឆ្លាចផ្តល់រសជាតិ។ ដូចនេះ វិញ្ញាណទាំងពីរមានទំនាក់ទំនង បំពេញគ្នាដើម្បីឱ្យអាហារមានរសជាតិឆ្ងាញ់។

11. ហេតុអ្វីបានជាក្លែងមានភាពរួសទៅនឹងរសជាតិច្រើនជាងមនុស្សពេញវ័យ?

- បានជាក្លែងមានភាពរួសទៅនឹងរសជាតិច្រើនជាងមនុស្សពេញវ័យព្រោះអណ្តាតក្លែងមានពន្លក ជីវ្ហាវិញ្ញាណច្រើនជាងមនុស្សពេញវ័យ។

IV. យានវិញ្ញាណ

1. តើច្រមុះមាននាទីអ្វី?

- ច្រមុះមាននាទីពីរគឺ ដកដង្ហើម និង ហិតក្លិន។

2. តើក្លិនជាអ្វី?

- ក្លិន ជាសារធាតុគីមីដែលមាននៅក្នុងអាហារភេសជ្ជៈ គ្រឿងក្រអូបជាច្រើន។

3. តើក្លិន និងរសជាតិមានទំនាក់ទំនងគ្នាដូចម្តេច?



- ជាធម្មតា អាហារតែងតែមានក្លិនឈ្ងុយ។ នៅពេលម៉ូលេគុលក្លិន ហើរទៅប៉ះជាមួយភ្នាស់នៅក្នុង រន្ធច្រមុះបណ្តាលឱ្យរសជាតិកាន់តែប្រសើរឡើង។

4. តើផ្លូវវិញ្ញាណរូសនឹងក្លិនហៅថាអ្វី?

- ផ្លូវវិញ្ញាណរូសនឹងក្លិនគឺ ជាគោសិកាយានវិញ្ញាណដែលស្ថិតនៅក្នុងភ្នាស់សើមនៃរន្ធច្រមុះ។

5. តើតំបន់ដែលអាចចាប់យកក្លិនបាននៅក្នុងរន្ធច្រមុះនីមួយៗមានផ្ទៃក្រឡាប៉ុន្មាន?



- តំបន់ដែលអាចចាប់យកក្លិនបានមានផ្ទៃក្រឡាប្រហែល 10cm^2 ។

6. តើតំបន់យានវិញ្ញាណមានទម្រង់ដូចម្តេច?

- តំបន់យានវិញ្ញាណមានទម្រង់ ជាស្រទាប់ស្តើងដែលកើតឡើងពីកោសិកាបីយ៉ាងគឺ៖
កោសិកាទ្រទ្រង់ កោសិកាមូលដ្ឋាន និង កោសិកាយានវិញ្ញាណ។

7. តើស្រទាប់សើមនៃច្រមុះកើតឡើងពីកោសិកាអ្វីខ្លះ?

- ស្រទាប់សើមនៃច្រមុះកើតឡើងពី៖
 - កោសិកាទ្រទ្រង់
 - កោសិកាមូលដ្ឋាន និង
 - កោសិកាយានវិញ្ញាណ។



8. តើស្រទាប់កោសិកានីមួយៗនៃតំបន់យានវិញ្ញាណមាននាទីដូចម្តេច?

- កោសិកាទ្រទ្រង់ផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមដល់កោសិកាយានវិញ្ញាណ និងធ្វើឱ្យស្នូលក្នុងរន្ធច្រមុះមាន ពណ៌លឿងភ្លាវ។



- កោសិកាមូលដ្ឋាន ជាស្រទាប់បាតសម្រាប់ទ្រទ្រង់ផ្នែក ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយានវិញ្ញាណ។
- កោសិកាយានវិញ្ញាណ ជាផ្នែកវិញ្ញាណក្ខិនដែលចាប់យកម៉ូលេគុលក្លិន ដើម្បីបង្កើតជាអាំងតង់តេប្រសាទ បញ្ជូនទៅសរសៃប្រសាទយានវិញ្ញាណ។

9. តើនៅពេលផ្តល់ក្លិនត្រូវបានឆ្លាច តើមានអ្វីកើតឡើង? ឬចូរពណ៌នាដំណើរអាំងតង់តេប្រសាទ

- ម៉ូលេគុលក្លិនត្រូវបានស្រូបចូលតាមខ្យល់ដង្ហើមចូល ហើយរលាយទៅក្នុងស្រទាប់ស្នេស្តរលាយច្រមុះ។ នៅពេលនោះរោមញ័រនៃកោសិកាយានវិញ្ញាណត្រូវបានឆ្លាច ដោយសារធាតុគីមីរលាយនោះ ហើយបង្កើតបានជាអាំងតង់តេប្រសាទដែលត្រូវបានដឹកនាំទៅកាន់ខួរក្បាល តាមសរសៃប្រសាទយានវិញ្ញាណ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានបកប្រែដោយមជ្ឈមណ្ឌលយានវិញ្ញាណ ដែលស្ថិតនៅក្នុងកំពកសៀតផ្តា។

10. ហេតុអ្វីបានជាពេលអ្នកគ្រុនផ្តាសាយ ឬតឹងច្រមុះ បរិភោគអាហារមិនស្ងួនឆ្អឹងសជាតិ?

- ព្រោះសជាតិនៃអាហារទាក់ទងនឹងវិញ្ញាណក្ខិនផង និងវិញ្ញាណរសជាតិផង។ នៅពេលគ្រុនស្រទាប់ស្នេស្តក្នុងច្រមុះក្លាយជាខាតដែលនាំឱ្យផ្តល់យានវិញ្ញាណចំពេញមុខងារមិនបានត្រឹមត្រូវ។ ដូចនេះហើយ ពេលបរិភោគអាហារ យើងពុំស្ងួនឆ្អឹងសជាតិ។

V. កាយវិញ្ញាណ

1. តើស្បែកជាអ្វី? មាននាទីដូចម្តេច?

- ស្បែក ជាសរីរាង្គដែលធំជាងគេបំផុតក្នុងសារពាង្គកាយ។
- ស្បែក មាននាទីជាច្រើនដូចជា៖
 - ការពារសារពាង្គកាយពីឥទ្ធិពលរូបនិងគីមីនៃមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ។
 - បង្ការការជ្រៀតចូលនៃមេរោគ។
 - បង្ការការបាត់បង់ជាតិទឹក។
 - ការពារកោសិកាពីកាំរស្មីស្វាយអ៊ុលត្រា។
 - ជាកន្លែងបញ្ជូនខ្លួន។
 - បញ្ចេញកាកសំណល់ (ក្រពេញញើស)។
 - ថែរក្សាសំណើមដល់សារពាង្គកាយ។



- បញ្ចេញជាតិខ្លាញ់។
- ស្រូបយកសារធាតុមួយចំនួន (ឱសថ)។
- ទទួលរំញោច។
- បន្ថយកំដៅដោយការបញ្ចេញក្រហម។

2. តើស្បែកកើតឡើងពីស្រទាប់អ្វីខ្លះ? ចូររៀបរាប់។

- ស្បែកមានពីរស្រទាប់គឺ ស្រទាប់អេពីឌែម និងស្រទាប់ដែម។
- ស្រទាប់អេពីឌែម ជាស្រទាប់កោសិកាដាច់។ វាមាននាទីការពារសារពាង្គកាយប្រឆាំងនឹងភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមួយចំនួន។
- ស្រទាប់ដែមជាស្រទាប់កោសិកាសរសៃ។ វាសម្បូរសរសៃឈាម និងមានផ្ទុកវីតាមីនជាច្រើន ដូចជាផ្ទុកវីតាមីនស៊ីតូគីណូត សម្ពាធមួយចំនួន បំណះទង្គិច ឈឺចាប់។

3. តើផ្ទុកកាយវិញ្ញាណមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ? ស្ថិតនៅស្រទាប់ណាដែលស្បែក?

- ផ្ទុកកាយវិញ្ញាណមានប្រាំប្រភេទគឺ ផ្ទុកសម្ពាធ ផ្ទុកកំដៅ ផ្ទុកបំណះទង្គិច ផ្ទុកត្រជាក់ និងផ្ទុកការឈឺចាប់។
- ផ្ទុកកាយវិញ្ញាណស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់ដែមរបស់ស្បែក។

4. តើផ្ទុកកាយវិញ្ញាណស្ថិតនៅកន្លែងណាខ្លះនៃស្រទាប់ដែម? ហើយឆ្លើយតបនឹងរំញោចអ្វីខ្លះ?

- ផ្ទុកបំណះទង្គិចសម្បូរនៅលើចុងម្រាមដៃ ត្រចក់ភ្នែក បបួរមាត់ ចុងអណ្តាត និងបាតដៃ។ វាឆ្លើយតបទៅនឹងការបំណះទង្គិច។ តំបន់សម្បូរផ្ទុកទាំងនេះឆ្លើយតបទៅនឹងរំញោចលឿនជាងតំបន់ផ្សេងទៀត។
- ផ្ទុកសម្ពាធមាននៅត្រង់តំបន់សន្លាក់ ជាលិកាសាច់ដុំ ។ វាឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ពាធនៅពេលដែលមានការសង្កត់ខ្លាំង (សម្ពាធខ្លាំង) ទៅលើផ្ទៃកាយទាំងនោះ។
- ផ្ទុកការឈឺចាប់លាតសន្ធឹងក្រោមស្រទាប់របស់អេពីឌែម។ វាឆ្លើយតបដោយការបញ្ជូនភាពឈឺចាប់នៅពេលមានការមុត ការដាច់ និងការរលាកផ្សេងៗ។
- ផ្ទុកកំដៅនៅក្នុងស្រទាប់ជ្រៅរបស់ដែម ។ វាឆ្លើយតបទៅនឹងកម្ដៅនៅពេលមានបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាពផ្សេងៗ។



- ធ្នូលត្រជាក់ស្ថិតនៅជិតផ្ទៃស្បែក។ វាឆ្លើយតបទៅនឹងភាពត្រជាក់នៅពេលមានបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាពផ្សេងៗ។

5. តើស្រទាប់អេពីដែមរបស់ស្បែកជាអ្វី? មាននាទីអ្វី?

- ស្រទាប់អេពីដែម ជាស្រទាប់ក្រៅបង្អស់របស់ស្បែក។
- វាមាននាទីការពារសារពាង្គកាយពីគ្រោះថ្នាក់ផ្នែករូប គីមី និងជារាំងទប់ទល់នឹងមេរោគ។

6. ចូររៀបរាប់ពីលក្ខណៈរបស់ស្រទាប់អេពីដែម។

- ជាស្រទាប់ក្រៅបង្អស់របស់ស្បែក ដែលមានកម្រាស់ 0.7mm
- បង្កឡើងដោយកោសិកាអេពីតេល្យូម។ ស្រទាប់លើងាប់ផ្ទុកកេរ៉ាទីនហើយកោសិកា ស្រទាប់ក្រោមធ្វើចំណែកយ៉ាងរហ័ស។
- មានកោសិកាមេឡាណូស៊ីតផលិតជាតិពណ៌ខ្មៅស្បែក។
- គ្មានសរសៃឈាម និង គ្មានធ្នូលវិញ្ញាណទេ លើកលែងតែ ធ្នូលឈឺចាប់។
- គ្មានក្រពេញញើស ក្រពេញសេបូម និងសាច់ដុំរលីងទេ។
- ទទួលសារធាតុចិញ្ចឹមតាមរយៈបន្ទាយពី សរសៃឈាមរបស់ខ្មែម។

7. តើស្រទាប់អេពីដែមទទួលសារធាតុចិញ្ចឹមពីណា បើស្រទាប់នេះគ្មានសរសៃឈាម?

- ស្រទាប់អេពីដែមទទួលសារធាតុចិញ្ចឹមពីសរសៃឈាមនៅក្នុងស្រទាប់ខ្មែមតាមបន្ទាយ។

8. តើស្រទាប់ខ្មែមរបស់ស្បែកជាអ្វី? តើវាកើតឡើងពីអ្វី?

- ស្រទាប់ខ្មែម ជាស្រទាប់ទីពីររបស់ស្បែក ដែលស្ថិតនៅពីក្រោមស្រទាប់អេពីដែម។
- វាកើតឡើងពីសរសៃឈាម សរសៃទឹករងៃ សាច់ដុំរលីង ចុងភ័បប្រសាទ ក្រពេញសេបូម ក្រពេញញើស និង ធ្នូលវិញ្ញាណផ្សេងៗ ជាដើម។

9. ចូររៀបរាប់ពីលក្ខណៈរបស់ស្រទាប់ខ្មែម។

- ជាស្រទាប់ក្រៅបង្អស់របស់សារពាង្គកាយ (នៅលើខ្មែម) និងមានកម្រាស់ 4mm។
- វាបង្កឡើងដោយជាលិកាសន្លាសរសៃឈាម និងកូឡាសែនដែលជាស្រទាប់រស់។
- គ្មានកោសិកាមេឡាណូស៊ីតទេ។




- មានសរសៃឈាម មានផ្លូវវិញ្ញាណទាំង៥ប្រភេទ ។មានក្រពេញញើស ក្រពេញសេបូម សាច់ដុំ រលីងភ្ជាប់នឹងឫសរោម។ សរសៃឈាមផ្គត់ផ្គង់សារធាតុចិញ្ចឹមដល់ អេពីឌែមតាមរយៈបន្ទាយ។

10. តើសរីរាង្គបន្ទាប់បន្សំដែលមាននៅលើស្បែកមានអ្វីខ្លះ?

- សរីរាង្គបន្ទាប់បន្សំដែលមាននៅលើស្បែកមាន ក្រពេញនៅក្នុងស្បែក រោម និងក្រចក។

11. តើនៅក្នុងស្បែកមានក្រពេញអ្វីខ្លះ?

- នៅក្នុងស្បែកមានក្រពេញសេបូម និងក្រពេញញើស។



12. តើក្រពេញសេបូមមាននៅកន្លែងណាខ្លះក្នុងខ្លួនមនុស្ស? បញ្ចេញអ្វី?

- ក្រពេញសេបូមមាននៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ លើកលែងតែបាតដៃ និងបាតជើង។ វាសម្បូរច្រើននៅលើស្បែកក្បាល ឬផ្ទៃមុខ។
- វាបញ្ចេញសេបូម ដែលជាល្បាយនៃរូបធាតុខ្លាញ់ និងកម្ទេចកំទីកោសិកានៅក្នុងឫសរោម តាមបំពង់ខ្លីៗដែលបើកចំហនៅលើផ្ទៃស្បែក។ សេបូមក៏ជាបំពង់ទប់ទល់នឹងជំងឺដែលបង្កឡើងដោយបាក់តេរី និងផ្សិត។ នៅលើផ្ទៃស្បែក មានក្រពេញនេះប្រហែល $100/1\text{cm}^2$ ។
- ប៉ុន្តែនៅលើស្បែកក្បាល និងស្បែកមុខ ក្រពេញសេបូមអាចមានរហូតដល់ $400-900/1\text{cm}^2$ ។

13. តើសេបូមជាអ្វី? មាននាទីអ្វី?

- សេបូម ជាល្បាយនៃរូបធាតុខ្លាញ់ និងកម្ទេចកំទីកោសិកានៅក្នុងឫសរោមដែលបញ្ចេញដោយក្រពេញសេបូម។
- វាមាននាទីជាបំពង់ទប់ទល់នឹងជំងឺដែលបង្កឡើងដោយបាក់តេរី និងផ្សិត។



14. តើក្រពេញញើសមានលក្ខណៈដូចម្តេច? ចូររៀបរាប់។

➢ ក្រពេញញើសមានលក្ខណៈដូចជា៖

- មានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងស្បែក
- មានរាងបំពង់ឆ្មារៗនិងអង្គពង្សដូចបាល់ ហើយបើកចំហនៅលើផ្ទៃស្បែកហៅថាវន្តញើស
- វាបញ្ចេញ ទឹក សារធាតុខនិដ អ៊ីយ៉ូន ...។
- វាបញ្ចេញញើសបញ្ចេញប្រហែល 500-600ml/24h
- វាមាននាទីតម្រូវសីតុណ្ហភាពរបស់សារពាង្គកាយតាមរយៈរំហួតញើស។

15. តើញើសបង្កឡើងពីអ្វី? មាននាទីដូចម្តេចចំពោះសារពាង្គកាយ?

- ញើសបង្កឡើងពីទឹក សារធាតុខនិដ អ៊ីយ៉ូន និងសារធាតុផ្សេងៗទៀត។
- ញើសមាននាទីតម្រូវសីតុណ្ហភាពនៃសារពាង្គកាយតាមរយៈរំហួតញើស។

16. តើសីតុណ្ហភាពនៃសារពាង្គកាយមេរដោយសារអ្វី?

- សីតុណ្ហភាពនៃសារពាង្គកាយមេរដោយសារកម្ដៅលើសត្រូវបានបញ្ចេញតាមរំហួតទឹកដោយការបែកញើស។

17. តើក្នុង១ថ្ងៃ សារពាង្គកាយបញ្ចេញញើសបានប្រហែលប៉ុន្មាន?

- មនុស្សធម្មតាបញ្ចេញញើសក្នុងមួយថ្ងៃពី 500-600ml។

18. តើក្រពេញអាប៉ូគ្រីនជាអ្វី? មាននៅណា?

- ក្រពេញអាប៉ូគ្រីន ជាក្រពេញញើសមួយប្រភេទដែលបញ្ចេញញើសមានក្លិនអាក្រក់។
- វាមាននៅត្រង់ក្បែក ក្រពៀន និងនៅជុំវិញចុងដោះ។

19. តើរោមគ្របដណ្តប់នៅកន្លែងណាខ្លះ? កើតឡើងពីអ្វី?

- រោមគ្របដណ្តប់សារពាង្គកាយទាំងមូលលើកលែងតែ បាតដៃ បាតជើង និងបច្ចុរមាត់។

20. តើរោមកើតឡើងពីអ្វី?

- សរសៃរោមកើតឡើងពីកោសិកាអេពីឌេមរីង ហើយដាច់ លើកលែងតែគល់រោមដែលមានជីវិត (ស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់ខ្ទេម)។



21. តើរោមធ្វើចលនាបានដោយសារអ្វី?

- រោមធ្វើចលនាបានដោយសារសាច់ដុំរលីងភ្ជាប់ទៅនឹងគល់រោមនីមួយៗ។
- នៅពេលសាច់ដុំរលីងនេះកម្រាស់ រោមអាចធ្វើចលនាដោយងើបឈរត្រង់នៅលើផ្ទៃស្បែក។

22. នៅពេលយើងភ័យខ្លាច រំភើប នៅក្រោមខ្យល់ ឬសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំង ហេតុអ្វីបានជាយើងបះរោម?

- នៅពេលយើងភ័យខ្លាច រំភើប ឬនៅក្រោមខ្យល់ ឬសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំង យើងបះ រោមត្រង់ ព្រោះមានការកម្រាស់សាច់ដុំរលីងដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគល់រោមនីមួយៗបណ្តាលឱ្យរោមមាន ចលនាងើបត្រង់ឡើងលើផ្ទៃស្បែកមានសភាពដូចជាស្បែកគីង្កក់ (ព្រីសឃ្មុរគីង្កក់)។

23. ហេតុអ្វីបានជារោមមានពណ៌?

- ពណ៌រោមកំណត់ដោយជាតិពណ៌មេឡានីន ដែលផលិតចេញពីកោសិកាមេឡាណូស៊ីតនៃស្រទាប់ អេពីឌែមនៅផ្នែកបាតនៃគល់រោម។ កាលណាមានមេឡានីនច្រើន រោមមានពណ៌ខ្មៅ។ ការផលិត មេឡានីនតិច ធ្វើឱ្យសក់មានពណ៌ទង់ដែង។ សក់ពណ៌ក្រហមបណ្តាលមកពីជាតិពណ៌ដែក។

24. តើស្បែកដែលមានសភាពស្អាតខ្លាំង ឬមានខ្លាញ់ច្រើន បណ្តាលមកពីអ្វី?

- ស្បែកដែលមានសភាពស្អាតខ្លាំង បណ្តាលមកពីក្រពេញសេបូមផលិតសារធាតុខ្លាញ់មិនគ្រប់គ្រាន់ ឬ បណ្តាលមកពីការលាងសម្អាតស្បែកញឹកញាប់ខ្លាំងពេកដែលអាចធ្វើឱ្យស្បែកបែកប្រេះស្រក។
- ស្បែកដែលមានខ្លាញ់ច្រើន បណ្តាលមកពីក្រពេញសេបូមបញ្ចេញខ្លាញ់ច្រើនពេក។

25. ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សម្នាក់ៗមានស្បែក រោម សក់ មានពណ៌ខុសៗគ្នា?

- ព្រោះបរិមាណជាតិពណ៌មេឡានីនមានខុសៗគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ដែលកំណត់ដោយ ពហុស័ន។
- បើមនុស្ស មានអាយុលើសដែលផលិតមេឡានីនច្រើន នោះវានឹងធ្វើឱ្យមានពណ៌ខ្មៅ។
- បើមនុស្សមានអាយុលើសដែលផលិតមេឡានីនតិច នោះវានឹងធ្វើឱ្យមានពណ៌ផ្សេងៗដូចជា សក់ពណ៌ទង់ដែង ស្បែកពណ៌ស ឬផ្លែកពណ៌ត្នោត។ល។
- ចំពោះមនុស្សខ្លះមានសក់ពណ៌ក្រហមដោយសារមានជាតិពណ៌ដែក។

26. ហេតុអ្វីបានជាពេលវ័យចំណាស់ ឬមានអារម្មណ៍តានតឹង សក់បាត់បង់ជាតិពណ៌?

- បានជាពេលវ័យចំណាស់ ឬមានអារម្មណ៍តានតឹង សក់បាត់បង់ជាតិពណ៌ ព្រោះការផលិត



មេឡានីនធ្លាក់ចុះ។ ការផលិតមេឡានីន មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងអាយុ ឬភាពតានតឹងនៃអារម្មណ៍។ ដូចនេះ ការផលិតមេឡានីនធ្លាក់ចុះ នាំឱ្យសក់បាត់បង់ជាតិពណ៌ (ស្កូវ)។

27. ចូរប្រៀបធៀបស្រទាប់អេពីខែម និងស្រទាប់ខែមនៃស្បែក។

➢ **លក្ខណៈដូចគ្នា៖** ជាស្រទាប់របស់ស្បែកដែលគ្របដណ្តប់គ្រប់ផ្នែកនៃសារពាង្គកាយ។

លក្ខណៈខុសគ្នា៖

ស្រទាប់អេពីខែម	ស្រទាប់ខែម
- ជាស្រទាប់ក្រៅបង្អស់របស់សារពាង្គកាយ (នៅលើខែម) - មានកម្រាស់ 0.7mm - បង្កឡើងដោយកោសិកាអេពីតេលូម។ - ស្រទាប់លើដាច់ផ្ទុកកេរ៉ាទីនហើយកោសិកាស្រទាប់ក្រោមធ្វើចំណែកយ៉ាងរហ័ស។ - គ្មានសរសៃឈាម - មានកោសិកាមេឡាណូស៊ីត - គ្មានធូលីវិញ្ញាណទេ លើកលែងតែ ធូលីឈើចាប់ - គ្មានក្រពេញញើស ក្រពេញសេបូម និងសាច់ដុំរលីងទេ។ - ទទួលសារធាតុចិញ្ចឹមតាមរយៈបន្សាយពីសរសៃឈាមរបស់ខែម។	- ជាស្រទាប់ក្រៅបង្អស់របស់សារពាង្គកាយ (នៅលើខែម) - មានកម្រាស់ 4mm - បង្កឡើងដោយជាលិកាសន្លាសសរសៃឃីត និងកូឡាសែនដែលជាស្រទាប់រស់។ - មានសរសៃឈាម - គ្មានកោសិកាមេឡាណូស៊ីត - មានធូលីវិញ្ញាណទាំង៥ប្រភេទ - មានក្រពេញញើស ក្រពេញសេបូម សាច់ដុំរលីងភ្ជាប់នឹងឫសរោម។ - សរសៃឈាមផ្គត់ផ្គង់សារធាតុចិញ្ចឹមដល់អេពីខែមតាមរយៈបន្សាយ។

28. ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សភ្ញាក់មានស្បែក និងរោមគ្មានពណ៌?

➢ ការផលិតជាតិពណ៌ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយសែន។ អវត្តមានសែនត្រួតពិនិត្យការសំយោគ (អង់ស៊ីមផេណុលអុកស៊ីដាសសម្រាប់សំយោគ) មេឡានីនមិនដំណើរការ ជាហេតុធ្វើឱ្យការសំយោគមេឡានីនក៏មិនមានដែរ។ ដូច្នេះអវត្តមានមេឡានីននាំឱ្យរោម និងស្បែកគ្មានពណ៌។



29. តើក្រចកកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?

- ក្រចកនីមួយៗមានសន្លះក្រចក និងគល់ក្រចក។ សន្លះក្រចកកើតឡើងពីកោសិកាអេពីតេល្យូមស្បែក។ គល់សន្លះក្រចកមានរាងពាក់កណ្តាលចំណិតលោកខែ ដែលនៅទីនោះ កោសិកាអេពីតេល្យូមធ្វើចំណែកយ៉ាងសកម្ម។ ក្រោយពីធ្វើចំណែក កោសិកាទាំងនោះបញ្ចេញកដោយជាតិកេរ៉ាទីន ហើយប្រែជាក្រិន។

30. តើសន្លះក្រចកលូតវែងដោយសារអ្វី?



- សន្លះក្រចកលូតវែង ដោយសារការលូតលាស់ផ្នែកគល់ក្រចកដែលរុញសន្លះក្រចកឱ្យលូតវែងទៅមុខ។

31. តើការលូតលាស់របស់ក្រចកអាចប្រែប្រួលដោយសារអ្វី?

- ការលូតលាស់របស់ក្រចកអាចប្រែប្រួលដោយសារអរម៉ូន ជំងឺ និងរបបអាហារ។

32. តើក្រចកមានកម្រាស់ជាមធ្យមប៉ុន្មាន? និងអាចលូតលាស់បានប្រវែងប៉ុន្មានក្នុង១អាទិត្យ?

- ក្រចកមានកម្រាស់ជាមធ្យម ពី 0.5 -0.7mm
- ក្រចកអាចលូតលាស់ជាមធ្យម ប្រហែល 0.5-1mmក្នុងមួយអាទិត្យ។



33. ហេតុអ្វីបានជាផ្ទុលវិញ្ញាណមានសារៈសំខាន់?

- បានជាផ្ទុលវិញ្ញាណមានសារៈសំខាន់ ពីព្រោះវាធ្វើឱ្យសារពាង្គកាយមានតំណបង្កើនការពារខ្លួន ឬរក្សាថេរលំនឹង។

34. នៅក្នុងសារពាង្គកាយ តើរបាយនៃធូលវិញ្ញាណក្នុងស្បែកដូចគ្នាដែរឬទេ?


- របាយនៃធូលវិញ្ញាណទាំងអស់ប្រែប្រួលទៅតាមទីតាំងនៅលើស្បែកហៅថាទីតាំងនៃវិញ្ញាណ។
- ឧទាហរណ៍៖ នៅចុងម្រាមដៃផ្នែកប្រអប់ដៃមានធូលវិញ្ញាណយឺតប្រហែល 60 កន្លែង និងធូលវិញ្ញាណបំណះទង្គិចចំនួន 100 កន្លែងក្នុង 1cm^2 ។ ផ្នែកខ្លះដៃនៅចុងម្រាមដៃដដែលមានធូលវិញ្ញាណយឺតប្រហែល 100 កន្លែង ប៉ុន្តែមានធូលបំណះទង្គិចតែ 9 កន្លែងតែប៉ុណ្ណោះ។

35. ចូរសង្ខេបព័ត៌មានដែលសរីរាង្គវិញ្ញាណទទួលបាន។

- គំហើញជា ការឆ្លើយតបទៅនឹងថាមពលពន្លឺ។ ល្បឿនអាស្រ័យទៅនឹងរលកសូរ រីឯតំហែរក្បាលនឹងអាស្រ័យទៅនឹងចលនារបស់ធាតុរាវនៅក្នុងបំពង់ពាក់កណ្តាលរង្វង់នៅក្នុងត្រចៀកក្នុង។ បំណះទង្គិច ឆ្លើយតបទៅនឹងថាមពលមេកានិច។ រសជាតិ និងក្លិនឆ្លើយតបទៅនឹងសារធាតុគីមី។

36. ប្រព័ន្ធសរីរាង្គទាំងអស់ធ្វើការរួមគ្នា ហើយប្រព័ន្ធមួយមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រព័ន្ធមួយផ្សេងទៀត។ តើប្រព័ន្ធប្រសាទ និងសរីរាង្គវិញ្ញាណធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

- សរីរាង្គវិញ្ញាណទាំងអស់ ជាធូលសម្រាប់ចាប់យករំញោចទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅសារពាង្គកាយ។ ធូលទាំងនេះបង្កើតឱ្យមានអាំងតង្កាប្រសាទដែលបញ្ជូនព័ត៌មានទៅឱ្យមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ។





ជំពូក៣ តម្រូវផ្សេងៗរបស់សារពាង្គកាយ

មេរៀនទី៣ ប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន

1. តើប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីនជាអ្វី?

- ប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន គឺជាបណ្តុំនៃក្រពេញអង់ដូគ្រីនទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សព្រមទាំងសកម្មភាពនៃអរម៉ូនរបស់វា។

2. ដើម្បីថែរក្សាមជ្ឈដ្ឋានសារពាង្គកាយឱ្យមានតុល្យភាពជាមួយមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ តើប្រព័ន្ធសរីរាង្គណាខ្លះ ដែលចូលរួមក្នុងចលនការនេះ? ចូរពន្យល់ពីទំនាក់ទំនងនៃប្រព័ន្ធទាំងនេះដោយលើកឧទាហរណ៍។

- ដើម្បីថែរក្សាមជ្ឈដ្ឋានសារពាង្គកាយឱ្យមានតុល្យភាពជាមួយមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ មានប្រព័ន្ធពីរគឺប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន និងប្រព័ន្ធប្រសាទដែលសម្របសម្រួលការងារនេះ។
- ឧទាហរណ៍៖ ពេលមានឆ្កែដេញខាំ ឬត្រូវឃ្ល័ង្កដេញទិច ប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងគ្នាដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនៃសារពាង្គកាយ។ ភ្នែកទទួលបានព័ត៌មានព្រៃស ឬឃ្ល័ង្កហើយបង្កើតជាអាំងតង់ស៊ីតេប្រសាទ។ អាំងតង់ស៊ីតេត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ក្រពេញខួរលើតម្រងនោមដែលបញ្ចេញអរម៉ូនម្យ៉ាងដើម្បីឱ្យសារពាង្គកាយមានប្រតិកម្មតបត និងការពារខ្លួន។

3. តើក្រពេញជាអ្វី? ចូរលើកឧទាហរណ៍។

- ក្រពេញ ជាសរីរាង្គឯកទេសដែលកើតឡើងពីកោសិកាអេពីតេល្យូមសម្រាប់បញ្ចេញសារធាតុចាំបាច់សម្រាប់សារពាង្គកាយ។
- ឧទា៖ ក្រពេញទឹកដោះ ក្រពេញញើស ក្រពេញភេទ...។

4. តើក្រពេញមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?

- ក្រពេញមានពីរប្រភេទគឺ៖
 - ក្រពេញអិចសូគ្រីន និង ក្រពេញអង់ដូគ្រីន។

5. តើក្រពេញអិចសូគ្រីនជាអ្វី? ចូរឱ្យឧទាហរណ៍។ តើផលិតផលរបស់វាជាអ្វី?

- ក្រពេញអិចសូគ្រីន ជាក្រពេញដែលបញ្ចេញផលិតផលរបស់វាតាមបំពង់នាំទៅក្រៅសារពាង្គកាយ ឬទៅក្នុងសរីរាង្គក្នុង។ ឧទា៖ ក្រពេញញើស ក្រពេញទឹកភ្នែក។



6. តើក្រពេញអង់ដូត្រីនជាអ្វី? ចូរឱ្យឧទាហរណ៍។ តើផលិតផលរបស់វាជាអ្វី?

- ក្រពេញអង់ដូត្រីន ជាក្រពេញដែលបញ្ចេញផលិតផល(អរម៉ូន)របស់វាផ្ទាល់ទៅក្នុងចរន្តឈាម។
ឧទាហរណ៍: ក្រពេញអ៊ីប៉ូភីស ក្រពេញអ៊ីប៉ូតាឡាមុស ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត...

7. ចូរប្រៀបធៀបក្រពេញអ៊ីចសូត្រីននិង អង់ដូត្រីន។

- លក្ខណៈដូចគ្នា៖ ជាក្រពេញបញ្ចេញសារធាតុពិសេសដែលមានឥទ្ធិពលលើកោសិកា គោល ដៅ ឬសារធាតុណាមួយក្នុងប្រហោងសារពាង្គកាយ។ វាបង្កឡើងពីកោសិកាអេពីតេល្យូម។

លក្ខណៈខុសគ្នា៖

ក្រពេញអ៊ីចសូត្រីន	ក្រពេញអង់ដូត្រីន
• មានបំពង់នាំ • ផលិតសរសៃឈាមអាហារសំណល់មេតាបូលីស • មានអំពើលើសារធាតុណាមួយក្នុងលំហនៃសរីរាង្គ ឬចេញក្រៅសារពាង្គកាយ • បញ្ចេញសតាមបំពង់នាំ ឧទាហរណ៍: ក្រពេញទឹកដោះ ក្រពេញញើស...	• គ្មានបំពង់នាំ • ផលិតអរម៉ូន • មានឥទ្ធិពលលើកោសិកាគោលដៅ • បញ្ចេញអរម៉ូនទៅក្នុងចរន្តឈាមដោយផ្ទាល់ ឧទាហរណ៍: ក្រពេញអ៊ីប៉ូភីស ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត...


8. តើក្រពេញចម្រុះ(Mixed gland)ជាអ្វី? ចូរឱ្យឧទាហរណ៍។

- ក្រពេញចម្រុះ៖ ជាក្រពេញដែលមាននាទីជាក្រពេញអ៊ីចសូត្រីនផង និងជាក្រពេញអង់ដូត្រីនផង។ ឧទាហរណ៍: ក្រពេញលំពែង ក្រពេញមាត់(អ្នក ពងស្វាស)...

9. តើប្រព័ន្ធអង់ដូត្រីនមនុស្សកើតឡើងពីក្រពេញអ្វីខ្លះ?



- ប្រព័ន្ធអង់ដូត្រីនរបស់មនុស្សកើតពីក្រពេញអង់ដូត្រីនជាច្រើនដូចជា៖
 - អ៊ីប៉ូតាឡាមុស (កោសិកាណឺរ៉ូនបញ្ចេញ)
 - អ៊ីប៉ូភីស
 - ទីរ៉ូអ៊ីត
 - ប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត
 - ទីមុស

- លំពែង -ក្រពេញលើតម្រងនោម -និង ក្រពេញរោទ (អ្នករៀន និងពងស្វាស)។



10. តើអម្ព័ន្ធជាអ្វី?

- អម្ព័ន្ធ ជាសារធាតុគីមីដែលផលិតឡើងដោយក្រពេញអង់ដូគ្រីន។
វាមានឥទ្ធិពលទៅ លើមេតាបូលីសនៃកោសិកាគោលដៅ។
ឧទា៖ អម្ព័ន្ធអាំងស៊ីយលីន អម្ព័ន្ធតេស្តូស្តេរ៉ូន អម្ព័ន្ធលូតហាស់.....។



11. តើកោសិកាគោលដៅជាអ្វី?

- កោសិកាគោលដៅ (target cell) ជាកោសិកាដែលមានផ្ទៃសម្រាប់ចាប់យកអម្ព័ន្ធយថាប្រភេទ។



12. តើអរម្មនមានឥទ្ធិពលទៅលើសារពាង្គកាយទាំងមូលដែរឬទេ? ចូរឱ្យឧទាហរណ៍បញ្ជាក់។

- អរម្មនគ្មានឥទ្ធិពលទៅលើសារពាង្គកាយទាំងមូលទេ ព្រោះអរម្មនមានឥទ្ធិពលនៅកន្លែងណាមួយដែលត្រូវការវាតែប៉ុណ្ណោះ។
- ឧទាហរណ៍៖ រំញ័រចង្វាក់នៃការជញ្ជក់ទឹកដោះរបស់ទារកបានឆ្លាចក្រពេញអ៊ីប៉ូភីសឱ្យបញ្ចេញអរម្មនអុកស៊ីតូស៊ីន។ អរម្មននេះធ្វើដំណើរតាមចរន្តឈាមម្តាយ ហើយឆ្លាចកោសិកាសាច់ដុំជុំវិញកោសិកាក្រពេញទឹកដោះ។ នៅពេលកោសិកាសាច់ដុំក្រ្តាក់ វាធ្វើឱ្យក្រពេញទឹកដោះបញ្ចេញទឹកដោះតាមរន្ធតូចៗនៅខាងចុងដោះ។ ដូចនេះអរម្មនអុកស៊ីតូស៊ីនឆ្លាចកោសិកាគោលដៅ (កោសិកាសាច់ដុំ) ឱ្យធ្វើចលនាដើម្បីជម្រុញកោសិកាក្រពេញទឹកដោះឱ្យផលិតទឹកដោះ។

13. ហេតុអ្វីបានជាអរម្មនឆ្លាចតែកោសិកាគោលដៅ?

- អរម្មនឆ្លាចតែកោសិកាគោលដៅ ព្រោះកោសិកាគោលដៅមានធូលីនៅលើភ្នាសកោសិកា ដែលមានទម្រង់ត្រូវគ្នានឹងទម្រង់របស់អរម្មន បង្កើតបានជាសារធាតុចម្រុះ-ធូលីអរម្មន។ សារធាតុនេះហើយដែលធ្វើឱ្យកោសិកាគោលដៅឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើរបស់អរម្មន។

14. ផ្នែកលើមូលហេតុអ្វីបានជាគេចែកអរម្មនជាពីរក្រុម? មានអ្វីខុស? ចូររៀបរាប់។

- គេចែកអរម្មនជាពីរក្រុមដោយផ្អែកលើធាតុបង្កនៃអរម្មន។ អរម្មនទាំងពីរក្រុមមានដូចជា អរម្មនប៊ុបទីត និងអរម្មនស្តេរ៉ូអ៊ីត។
- អរម្មនប៊ុបទីត ជាអរម្មនដែលកើតពី ម៉ូលេគុលអាស៊ីតអាមីនេមិនអាចឆ្លងកាត់ភ្នាសកោសិកា ព្រោះវាមិនអាចរលាយនៅក្នុងលីពីត។
- អរម្មនស្តេរ៉ូអ៊ីត ជាអរម្មនដែលកើតពីម៉ូលេគុលលីពីតតូចៗ វាអាចឆ្លងកាត់ភ្នាសកោសិកាបាន។ (អរម្មនភេទដូចជា តេស្តូស្តេរ៉ូន និងអ៊ីស្ត្រូសែនជាដើម)។

15. តើអរម្មនប៊ុបទីតជាម៉ូលេគុលអ្វី?

- អរម្មនប៊ុបទីត ជាម៉ូលេគុលនៃប្រភេទអាស៊ីតអាមីនេដែលមិនអាចឆ្លងកាត់ភ្នាសកោសិកាបានទេ។

16. ហេតុអ្វីបានជាអរម្មនប៊ុបទីតមិនអាចឆ្លងកាត់ភ្នាសកោសិកាបាន?

- ព្រោះអរម្មនប៊ុបទីត ជាម៉ូលេគុលធំៗ ហើយមិនអាចរលាយនៅក្នុងស្រទាប់លីពីតដែលជាសមាសធាតុរបស់ភ្នាសកោសិកា។



17. តើអរម៉ូនប៊ីបទីតមានអំពើទៅលើកោសិកាគោលដៅតាមវិធីណា?

- វាភ្ជាប់ទៅនឹងភ្នាសនៃកោសិកាគោលដៅដោយសារធូលីនៅលើភ្នាសមានទម្រង់ត្រូវគ្នានឹងអរម៉ូន។ ចំណងភ្ជាប់រវាងអរម៉ូនធូលីធ្វើឱ្យមានការភ្ជាប់ទៅនឹងប្រូតេអ៊ីន G ហើយធ្វើឱ្យអង់ស៊ីមដែលភ្ជាប់លើផ្ទៃខាងក្នុងរបស់ភ្នាសកោសិកាសកម្មឡើង។ បន្ទាប់មកអង់ស៊ីម អាដេនីលស៊ីក្លាស បំប្លែង ATP ទៅជាម៉ូលេគុល AMP រង់។ ម៉ូលេគុល AMP រង់សាយភាយទៅក្នុងស៊ីតូប្លាសកោសិកា គោលដៅហើយចងភ្ជាប់ជាមួយអង់ស៊ីមផ្សេងៗដែលធ្វើឱ្យអង់ស៊ីមទាំងនោះសកម្ម។ កាលណា អង់ស៊ីមទាំងនោះសកម្មវាទៅឆ្លាចឱ្យកោសិកាគោលដៅ ធ្វើឱ្យមានសកម្មភាព ឬ បង្កាក់សកម្មភាពផ្សេងៗនៃកោសិកាគោលដៅ ដែលមានដូចជា ចំណែកកោសិកា ការផ្តាច់ ការបញ្ចេញ មេតាបូលីសកើនឡើង ឬថយចុះ និង ការកម្រិតនៃសាច់ដុំជាដើម។

18. តើអរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីតជាម៉ូលេគុលអ្វី?

- អរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីត ជាម៉ូលេគុលលីពីតតូចៗដែលផលិតឡើងពីកូឡេស្តេរ៉ូល។

19. ហេតុអ្វីបានជាអរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីតអាចឆ្លងកាត់ភ្នាសកោសិកាបាន?

- អរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីតអាចឆ្លងកាត់ភ្នាសកោសិកាបាន ព្រោះអរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីត ជាម៉ូលេគុលលីពីតតូចៗដែលអាចរលាយនៅក្នុងស្រទាប់លីពីតនៃ ភ្នាសកោសិកាគោលដៅ។

20. តើអរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីតធ្វើសកម្មភាពដូចម្តេចទៅលើកោសិកាគោលដៅ?

- ពេលអរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីតជ្រាបចូលទៅក្នុងកោសិកា វាបានភ្ជាប់ទៅនឹងធូលីនៅក្នុងស៊ីតូប្លាសកោសិកា ហើយបង្កើតបានជាសារធាតុចម្រុះអរម៉ូន-ធូលី។ បន្ទាប់មក ម៉ូលេគុលនេះក៏បាន ចូលទៅក្នុងណ្វៃយ៉ូនៃកោសិកាគោលដៅ។ នៅក្នុងណ្វៃយ៉ូ ម៉ូលេគុលចម្រុះនេះបានឆ្លាចសែនយថាប្រភេទមួយឱ្យចម្លងក្រមជា ARNm។ ARNm ចេញពីណ្វៃយ៉ូទៅក្នុងស៊ីតូប្លាស ហើយដឹកនាំការសំយោគប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទមួយ។

21. ចូរប្រៀបធៀបអរម៉ូនប៊ីបទីត និងអរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីត។

- ចំណុចដូចគ្នា៖
 - ភ្ជាប់ទៅនឹងធូលីកោសិកាគោលដៅ
 - មានឥទ្ធិពលលើកោសិកាគោលដៅ



- និងបំប្លែងនាទីរបស់កោសិកាគោលដៅ។

ចំណុចខុសគ្នា

អរម៉ូនប៉ូបទីត	អរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីត
▪ ម៉ូលេគុលនៃច្រវាក់អាស៊ីតអាមីនេ ▪ មិនអាចឆ្លងកាត់ភ្លាសកោសិកា ▪ សកម្មភាពកើតមានឡើងនៅក្នុងស៊ីតូប្លាស ▪ ធ្វើសកម្មភាពលឿន ▪ មានឥទ្ធិពលលើកោសិកាគោលដៅរយៈពេលខ្លី	▪ ម៉ូលេគុលបីពីតតូចៗ ▪ អាចឆ្លងកាត់ភ្លាសកោសិកាបាន ▪ សកម្មភាពកើតឡើងនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូ បន្ទាប់មកក្នុងស៊ីតូប្លាស ▪ ធ្វើសកម្មភាពយឺត ▪ មានឥទ្ធិពលលើកោសិកាគោលដៅ រយៈពេលយូរ

22. តើអរម៉ូនត្រូវបានសំយោគឡើងនៅពេលណា?

- នៅពេលដែលសារពាង្គកាយត្រូវការវា ទើបក្រពេញអង់ដូគ្រីនសំយោគអរម៉ូន។

23. តើសារពាង្គកាយត្រូវការបរិមាណអរម៉ូនច្រើនដែរឬទេ?

- សារពាង្គកាយត្រូវការបរិមាណអរម៉ូនក្នុងបរិមាណតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ហើយបរិមាណនេះត្រូវតែថេរជានិច្ច។

24. ប្រសិនបើសារពាង្គកាយមានបរិមាណអរម៉ូនច្រើនឬតិចពេក តើបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាអ្វី?

- ក្នុងសារពាង្គកាយមានដំណើរការមិនប្រក្រតី ដែលបណ្តាលឱ្យសារពាង្គកាយមានជំងឺ ហើយអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរ។

25. តើការរក្សាបរិមាណអរម៉ូនថេរក្នុងសារពាង្គកាយកើតឡើងដោយសារចលនការអ្វី?

- ដោយសារចលនការ តំណបត្រលប់អវិជ្ជមាន (Negative feedback)។

26. ចូរបង្ហាញពីការរក្សាកម្រិតគ្រួសក្នុងឈាមឱ្យនៅក្នុងដែនកំណត់មួយ។

- ក្រោយពេលបរិភោគអាហារសម្បូរដោយជាតិគ្រួសស៊ីត ប្រដាប់រំលាយអាហារបំបែកគ្រួសស៊ីតឱ្យទៅជាស្តេរ៉ូអាយ (គ្រួសកូស) ចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមតាមភ្លាសពោះវៀនតូចៗ លទ្ធផលនៃកំណើនកម្រិតជាតិស្តេរ៉ូ (គ្រួសកូស) ក្នុងចរន្តឈាមឆ្លាចកោសិកាមួយចំនួន របស់លំពែងឱ្យបញ្ចេញអរម៉ូន



អាំងស៊ុយលីន។ អ័រម៉ូនអាំងស៊ុយលីនធ្វើការកាត់កាបូអ៊ីស៊ីតនៅក្នុងកោសិកាដែលបង្កើនការប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតថាមពល ឬស្តុកទុកក្រោមទម្រង់ជាគ្លីកូសេន។ អត្រានៃការបញ្ចេញអាំងស៊ុយលីនធ្លាក់ចុះ នៅពេលដែល កម្រិតគ្លុយកូសចាកចេញពីចរន្តឈាមចូលទៅក្នុងកោសិកា។




27. តើតំណបត្រឡប់អវិជ្ជមាន(Negative feedback)ជាអ្វី?

- តំណបត្រលប់អវិជ្ជមាន ជាកំណើននៃសារធាតុមួយបង្ហាត់ដំណើរការដែលដឹកនាំឱ្យមានកំណើននោះ។

28. តើអ៊ីប៉ូតាឡាមុសជាអ្វី? ស្ថិតនៅកន្លែងណា? មាននាទីដូចម្តេច?

- ជាផ្នែកមួយនៃខួរក្បាលដែលមានទីតាំងនៅបាតនៃខួរខាងក្រោមតាឡាមុស។
- វាមាននាទីត្រួតពិនិត្យការបញ្ចេញរបស់ក្រពេញអ៊ីប៉ូភីស។



29. តើអ៊ីប៉ូតាឡាមុសផលិតអ័រម៉ូនអ្វីខ្លះ? តើអ័រម៉ូនទាំងនោះផលិតចេញពីអ្វី? ស្តុកនៅឯណា?

- អ៊ីប៉ូតាឡាមុសផលិត អ័រម៉ូនអង់ទីឌីអ៊ីយវេទីច ឬ (ADH) និងអ័រម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីន។



- អរម៉ូនទាំងនោះផលិតចេញពីកោសិកាណឺរ៉ូនបញ្ចេញនៃអ៊ីប៉ូតាឡាមុស។
- វាត្រូវបានស្តុកទុកនៅក្នុងអ៊ីប៉ូភីសក្រោយ។

30. តើអរម៉ូនអង់ឌីអ៊ីយរេទីច និងអរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីនត្រូវបានបញ្ចេញទៅក្នុងចរន្តឈាមនៅពេលណា?

- អរម៉ូនទាំងពីរនេះត្រូវបានបញ្ចេញទៅក្នុងចរន្តឈាមនៅពេលដែលកោសិកាណឺរ៉ូនបញ្ចេញត្រូវបានឆ្លោច ផ្នែកខាងចុងនៃអាក់ស្ថនក៏បញ្ចេញADH និងអុកស៊ីតូស៊ីនទៅក្នុងឈាម។

31. តើអ៊ីប៉ូភីសជាអ្វី? ស្ថិតនៅកន្លែងណា? មានប៉ុន្មានផ្នែក? អ្វីខ្លះ?

- អ៊ីប៉ូភីស ជាក្រពេញតូចមួយ មានអង្កត់ផ្ចិតប្រហែល1សង់ទីម៉ែត។
- វាស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាល ខាងក្រោមអ៊ីប៉ូតាឡាមុស។
- វាត្រូវបានចែកចេញជាពីរផ្នែកគឺ អ៊ីប៉ូភីសមុខ និងអ៊ីប៉ូភីសក្រោយ។

32. តើអ៊ីប៉ូភីសក្រោយផលិតអរម៉ូនដែរឬទេ?

- អ៊ីប៉ូភីសក្រោយមិនផលិតអរម៉ូនទេ ប៉ុន្តែវាស្តុកទុកអរម៉ូនADH និងអុកស៊ីតូស៊ីនដែលផលិតដោយកោសិកាណឺរ៉ូនបញ្ចេញរបស់អ៊ីប៉ូតាឡាមុស។

33. តើអរម៉ូនADH និងអរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីនមាននាទីដូចម្តេចខ្លះ?

- អរម៉ូនADHមាននាទីឆ្លាចតម្រងនោមធ្វើឱ្យជ្រាបទឹកចេញឡើងវិញពីបំពង់ប្រមូលផ្តុំដែលជាផ្នែកមួយនៃណេប្រុងនៅក្នុងតម្រងនោម។
- អរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីនមាននាទីឆ្លាចការកម្រិតនៃសាច់ដុំរបស់ស្បូនដែលជួយរុញទារកឱ្យចេញពីស្បូនម្តាយនៅពេលសម្រាលកូន។ អុកស៊ីតូស៊ីនក៏ធ្វើឱ្យសាច់ដុំដែលស្ថិតនៅជុំវិញកោសិកាក្រពេញទឹកដោះកម្រិត ដើម្បីបញ្ចេញទឹកដោះតាមរន្ធតូចៗនៅជុំវិញចុងដោះ។

34. ចូរបកស្រាយសកម្មភាពតំណបត្រឡប់អវិជ្ជមាននៃអរម៉ូនADH។

- សកម្មភាពតំណបត្រឡប់អវិជ្ជមាននៃអរម៉ូននេះគឺទាក់ទងទៅនឹងកំហាប់ឈាម។
- នៅពេលឈាមខាប់ កោសិកាប្រសាទដែលរួសទៅនឹងសំពាធនៃអូស្មូសឆ្លាចឱ្យបញ្ចេញអរម៉ូន ADHពីផ្នែកចុងអាក់ស្ថនក្នុងអ៊ីប៉ូភីសក្រោយទៅក្នុងចរន្តឈាម។ ADH ឆ្លាចតម្រងនោមឱ្យស្រូបទឹកពីបំពង់ប្រមូលផ្តុំ។ នៅពេលឈាមត្រឡប់ទៅរាវវិញ អរម៉ូនត្រូវបានបញ្ឈប់មិនឱ្យបញ្ចេញទៀតទេ។



35. តើកោសិកាណាជាកោសិកាគោលដៅនៃអ័រម៉ូនADH?

- កោសិកាគោលដៅរបស់អ័រម៉ូនADHគឺ កោសិកានៃបំពង់ប្រមូលផ្តុំដែលជាផ្នែកមួយនៃពេនទ្រីប្រុងក្នុងតម្រងនោម។

36. តើអ៊ីប៉ូភីសមុខស្ថិតនៅឯណា? ផលិតអ័រម៉ូនអ្វីខ្លះ?

- អ៊ីប៉ូភីសមុខស្ថិតនៅជាប់ និងខាងមុខអ៊ីប៉ូភីសក្រោយ។
- សកម្មភាពរបស់វាត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយអ៊ីប៉ូតាឡាមុស។
- វាផលិតអ័រម៉ូន៦ប្រភេទ គឺ៖
 - អ័រម៉ូនលូតាលីន (GH)
 - អ័រម៉ូនប្រូឡាក់ទីន(PRL)
 - អ័រម៉ូនមេឡាណូស៊ីត ស្ទីម៉ូយ៉ូឡីង(MSL)
 - អ័រម៉ូនទីរ៉េអូស្ទីម៉ូយ៉ូលីន(TSL)
 - អ័រម៉ូនអាដ្រែណូកូរទីកូត្រូប(ACTH)
 - អ័រម៉ូនកូណាដូស្ទីម៉ូយ៉ូលីន(FSH)

37. តើអ័រម៉ូនទាំង៦របស់ក្រពេញអ៊ីប៉ូភីសមុខផលិតចេញពីកោសិកាតែមួយប្រភេទរបស់អ៊ីប៉ូភីសឬទេ?

- អ័រម៉ូនទាំងនេះមិនផលិតចេញពីកោសិកាតែមួយប្រភេទរបស់អ៊ីប៉ូភីសទេ គឺវាត្រូវបានផលិតចេញពីកោសិកាប្រភេទផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្នុងអ៊ីប៉ូភីសមុខ។

38. ក្នុងចំណោមអ័រម៉ូនទាំង៦ ដែលផលិតដោយអ៊ីប៉ូភីសមុខ តើអ័រម៉ូនណាខ្លះដែលមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់ ទៅលើសារពាង្គកាយ?

- ក្នុងចំណោមអ័រម៉ូនទាំង៦ មានអ័រម៉ូនចំនួនបីដែលមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់ទៅលើសារពាង្គកាយគឺ អ័រម៉ូនលូតាលីន អ័រម៉ូនប្រូឡាក់ទីន និងអ័រម៉ូនមេឡាណូស៊ីតស្ទីម៉ូយ៉ូឡីង។

39. ចូរពណ៌នាពីអ័រម៉ូនលូតាលីន ឬសូម៉ាតូត្រូពីន។

- អ័រម៉ូនលូតាលីន(សូម៉ាតូត្រូពីន) (GH) មានឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់កម្ពស់ គឺទៅលើការលូតលាស់ឆ្អឹងខ្ចី និងឆ្អឹង។



- នៅវ័យកុមារ បើអ័រម៉ូន GH នេះតិចពេក បណ្តាលឱ្យកុមារកើតជំងឺក្រិន។ ប៉ុន្តែបើផលិតច្រើនពេក កុមារនឹងក្លាយជាមនុស្សយក្ស (ដំឡោក)។
- ជាពិសេស វាក៏មានឥទ្ធិពលផ្ទាល់ទៅលើមេតាបូលីសប្រូតេអ៊ីន គ្លុយស៊ីត និងលីពីត។

40. តើអ័រម៉ូនលូតលាស់ត្រូវបានផលិតចេញពីក្រពេញណា? មានឥទ្ធិពលដូចម្តេច?

- អ័រម៉ូនលូតលាស់ត្រូវបានផលិតចេញពីក្រពេញអ៊ីប៉ូភីសមុខ។
- វាមានឥទ្ធិពលទៅលើសារពាង្គកាយ ៖
 - មានឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់ឆ្អឹងខ្នង និងឆ្អឹង។
 - មានឥទ្ធិពលទៅលើមេតាបូលីសប្រូតេអ៊ីន គ្លុយស៊ីត និងលីពីត។

41. តើប្រូឡាក់ទីនជាអ្វី? ផលិតឡើងនៅពេលណា និងមាននាទីអ្វី?

- ប្រូឡាក់ទីន ជាអ័រម៉ូនដែលផលិតចេញពីក្រពេញអ៊ីប៉ូភីសមុខ។
- វាត្រូវបានផលិតនៅក្រោយពេលសម្រាលកូន ដើម្បីឆ្លាចឱ្យក្រពេញទឹកដោះលូតលាស់ និងផលិតទឹកដោះ។
- វាក៏មានទៅលើមេតាបូលីស គ្លុយស៊ីត និងលីពីតផងដែរ។

42. តើមេឡាណូស៊ីត ស្ទីមុយឡង់(MSL) ជាអ្វី? មាននាទីអ្វី?

- មេឡាណូស៊ីត ស្ទីមុយឡង់(MSL) ជាអ័រម៉ូនដែលផលិតដោយក្រពេញអ៊ីប៉ូភីសមុខ។
- វាមាននាទីឆ្លាចកោសិកាមេឡាណូស៊ីតរបស់ស្បែកឱ្យបង្កើន ការផលិតជាតិពណ៌មេឡានីន។

43. តើអ័រម៉ូនណាខ្លះរបស់អ៊ីប៉ូភីសមុខដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើក្រពេញផ្សេងទៀត?

- អ័រម៉ូនរបស់អ៊ីប៉ូភីសមុខដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើក្រពេញផ្សេងទៀតមានដូចជា អ័រម៉ូនទីរ៉េអូស្ទីមុយលីន អ័រម៉ូនអាដ្រេណូកូរទីកូត្រូប និង អ័រម៉ូនកូណាដូស្ទីមុយលីន។

44. តើទីរ៉េអូស្ទីមុយលីន(TSH) ជាអ្វី? មាននាទីអ្វី?

- ទីរ៉េអូស្ទីមុយលីន(TSH) អ័រម៉ូនដែលផលិតដោយក្រពេញអ៊ីប៉ូភីសមុខ។
- វាមាននាទីឆ្លាចក្រពេញទីរ៉េអូអ៊ីតឱ្យសំយោគ និងបញ្ចេញអ័រម៉ូនទីរ៉ុកស៊ីន។

45. តើអាដ្រេណូកូរទីកូត្រូប(ACTH)ជាអ្វី? មាននាទីអ្វី?

- អាដ្រេណូកូរទីកូត្រូប(ACTH) អ័រម៉ូនដែលផលិតដោយក្រពេញអ៊ីប៉ូភីសមុខ។



- វាមាននាទីឆ្លាចក្រពេញករតិចលើតម្រងនោមឱ្យបញ្ចេញ អម្រឹតករទីស្នូល។

46. តើកូណាដូស្ត្រីមុយលីន(FSH និង LH) ជាអ្វី? មាននាទីអ្វី?

- កូណាដូស្ត្រីមុយលីន ជាអម្រឹតដែលផលិតដោយក្រពេញអ៊ីប៉ូភីសមុខ។ វាមានអម្រឹតពីរគឺ FSH (ផូលីគុយឡូស្ត្រីមុយលីន) និង LH(លុយតេអ៊ីសីសង់)។
- វាមាននាទីឆ្លាចក្រពេញភេទឱ្យផលិតកាម៉ែតញី និងកាម៉ែតឈ្មោល។

47. តើអម្រឹតរបស់អ៊ីប៉ូភីសមុខមានឥទ្ធិពលដូចម្តេចទៅលើរាងកាយយ៉ាងដូចម្តេច?

- អម្រឹតរបស់អ៊ីប៉ូភីសមុខមានពីរក្រុម។ ក្រុមទីមួយមានអម្រឹតចំនួនបីដែលមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់ទៅលើសារពាង្គកាយមានដូចជាអម្រឹតលូតលាស់ អម្រឹតប្រូឡាក់ទីន និងអម្រឹតមេឡាណូស៊ីតស្ត្រីមុយឡង់។ ក្រុមទីពីរ មានអម្រឹតចំនួនបីដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការផលិតអម្រឹតរបស់ក្រពេញអង់ដូគ្រីនផ្សេងៗទៀតដូចជា អម្រឹតទីរ៉េអូស្ត្រីមុយលីនអម្រឹតអាដ្រែណូករទីកូត្រូប និងអម្រឹតកូណាដូស្ត្រីមុយលីន។

48. តើក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតស្ថិតនៅឯណា? ផលិតអម្រឹតអ្វី?

- ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតស្ថិតនៅត្រង់កចំពីក្រោមបំពង់សំឡេង និងមុខបំពង់ខ្យល់។
- វាផលិតអម្រឹតពីរគឺ ទីរ៉ុកស៊ីន និងកាល់ស៊ីតូនីន។



49. តើទីរ៉ុកស៊ីនជាអ្វី? មាននាទីអ្វីខ្លះ?

- ទីរ៉ុកស៊ីន ជាអម្រឹតដែលផលិតដោយក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត។
- អម្រឹតទីរ៉ុកស៊ីនមាននាទីបង្កើនអត្រាមេតាបូលីសប្រូតេអ៊ីន គ្រួសារស៊ីត និងខ្លាញ់។

50. តើអម្រឹតទីរ៉ុកស៊ីនកើតឡើងពីម៉ូលេគុលអ្វីខ្លះ?

- អម្រឹតទីរ៉ុកស៊ីនកើតឡើងពីអាស៊ីតអាមីនេទីរ៉ុកស៊ីនពីរ ដោយភ្ជាប់អាតូមអ៊ីយ៉ូតចំនួនបួន។

51. ចូរពន្យល់ពីការបង្កើនអត្រាមេតាបូលីសរបស់អម្រឹតទីរ៉ុកស៊ីន។

- អម្រឹតទីរ៉ុកស៊ីនបង្កើនអត្រាមេតាបូលីសដោយមិនសំដៅទៅលើកោសិកាគោលដៅណាមួយទេ គឺវាឆ្លាចគ្រប់កោសិកាទាំងអស់នៃរាងកាយឱ្យធ្វើមេតាបូលីសដោយមានអត្រាលឿន។ គ្រួសារកូសភាគច្រើនត្រូវបានបំបែក ហើយថាមពលភាគច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់។ បរិមាណ ទីរ៉ុកស៊ីនច្រើន



ពេកនាំឱ្យកើតជំងឺបាស៊ីដូ។

52. តើមានផលលំបាកអ្វីខ្លះដែលបណ្តាលមកពីការបញ្ចេញបរិមាណទឹកស៊ីនច្រើនពេក និងតិចពេក?

ផលលំបាកដែលបណ្តាលមកពីការបញ្ចេញបរិមាណទឹកស៊ីនច្រើនពេកនិងតិចពេកគឺ៖

- បើបរិមាណទឹកស៊ីនតិចពេក ៖ នៅពេលពេញវ័យបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺមីស៊ីដេម(Myxoedeme) ដែលធ្វើឱ្យឡើងទំហំ ជ្រុះសក់ ជីពចរលោតយឺត សីតុណ្ហភាពថយចុះ។
- បើបរិមាណទឹកស៊ីនច្រើនពេក៖ បណ្តាលឱ្យកើតជំងឺបាស៊ីដូ (Basedow)ដែលនាំឱ្យមានការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពរាងកាយ កំណើនសម្ពាធឈាម កំណើនអត្រាចង្វាក់បេះដូង និងកំណើនមេតាបូលីស ហើយស្រកទម្ងន់។

53. ចូរបកស្រាយសកម្មភាពតំណបត្រឡប់អវិជ្ជមាននៃអម្ពូនទឹកស៊ីន។

- នៅពេលអ៊ីប៉ូតាឡាមុស ដឹងថាកម្រិតទឹកស៊ីនចុះទាប វាក៏ផលិតអម្ពូនទឹកស៊ីនតបញ្ចេញ(TRH) ដែលឆ្លាចក្រពេញអ៊ីប៉ូតាឡាមុសឱ្យបញ្ចេញTSH។ TSHឆ្លាចការផលិតទឹកស៊ីន។ កំណើនកម្រិតTSH និងទឹកស៊ីន បង្ហាញការផលិតTRHនៃអ៊ីប៉ូតាឡាមុស។ ដូចនេះ កម្រិតអម្ពូនទឹកស៊ីនក្នុងរាងកាយត្រូវបានពិនិត្យដោយតំណបត្រឡប់អវិជ្ជមាន។

54. តើកង្វះជាតិអ៊ីយ៉ូតក្នុងរបបអាហារបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាអ្វី?

- កង្វះជាតិអ៊ីយ៉ូតក្នុងរបបអាហារអាចបណ្តាលឱ្យក្រពេញទឹកស៊ីនប៉ោងធំដែលបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺពក។

55. តើគេអាចបង្ការជំងឺពកបានដោយរបៀបណា?

- គេអាចបង្ការជំងឺពកបានដោយការបរិភោគអាហារដែលមានជាតិអ៊ីយ៉ូតដូចជា ត្រី និងអាហារសមុទ្រផ្សេងៗ មានអំបិលអ៊ីយ៉ូតជាដើម។

56. តើកម្រិតកាល់ស្យូម(Ca^{2+}) ក្នុងឈាមត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយអម្ពូនអ្វី?

- អម្ពូនកាល់ស្យូនីន ត្រួតពិនិត្យកម្រិតកាល់ស្យូម (Ca^{2+})ក្នុងឈាម។

57. ចូរប្រាប់ពីការតម្រូវកាល់ស្យូមរបស់អម្ពូនកាល់ស្យូនីន។


- នៅពេលកម្រិត(Ca^{2+}) ក្នុងឈាមកើនឡើង ក្រពេញទឹកស៊ីនតបញ្ចេញអម្ពូនកាល់ស្យូនីន។ អម្ពូនកាល់ស្យូនីនចាប់យក(Ca^{2+}) ក្នុងឈាម រួចស្តុកទុកក្នុងខ្លួន។



- នៅពេលកម្រិត(Ca^{2+}) ក្នុងឈាមថយចុះទាបជាងធម្មតា ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតបង្កាក់ការបញ្ចេញអរម៉ូនកាល់ស៊ីតូនីន។ ប៉ុន្តែកម្រិតទាបនេះ បានឆ្លាចការបញ្ចេញអរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត(PTH) ដោយក្រពេញប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត។

58. តើក្រពេញប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតមានទីតាំងនៅឯណា? ផលិតអរម៉ូនអ្វី?

- ក្រពេញប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត ជាក្រពេញតូចៗចំនួនបួន ដែលបង្កប់ក្នុងផ្នែកខាងក្រោយនៃក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត។
- ក្រពេញនេះផលិតអរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត។



59. តើអរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតមាននាទីអ្វី?


- អរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត មាននាទីតម្រូវមេតាបូលីសកាល់ស្យូម និងផូស្វាតនៅក្នុងសារពាង្គកាយ។

60. តើអរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតតម្រូវកម្រិតកាល់ស្យូមក្នុងឈាមយ៉ាងដូចម្តេច?

- នៅពេលកម្រិត(Ca^{2+}) ក្នុងឈាមធ្លាក់ចុះ អរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតធ្វើឱ្យមានការបញ្ចេញកាល់ស្យូម ពីឆ្អឹងទៅក្នុងប្លាស្មា។
- នៅពេលកម្រិត(Ca^{2+}) ក្នុងឈាមឡើងលើសកម្រិតមួយច្បាស់លាស់ អរម៉ូនកាល់ស៊ីតូនីន ឆ្លាចឱ្យមានការចាប់យកកាល់ស្យូមលើសពីក្នុងឈាម ស្តុកទុកនៅក្នុងឆ្អឹង។ នៅពេលកម្រិត(Ca^{2+}) ធ្លាក់ចុះ ក្រពេញប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតឈប់ផលិតអរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត (PTH)។

61. តើមានផលលំបាកអ្វីខ្លះដែលបណ្តាលមកពីការលើសអរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត(PTH) និងកង្វះPTH?

- កង្វះPTH ធ្វើឱ្យកម្រិតកាល់ស្យូមក្នុងឈាមទាប ដែលបណ្តាលឱ្យសាច់ដុំប្រែជាស្បូនស្បាត ហើយកម្រិតយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលហៅថា តេតាណូស។
- ការបញ្ចេញPTH លើសបណ្តាលមកពីកង្វះ PTH ពេក បណ្តាលឱ្យមានការដកយកកាល់ស្យូមពីក្នុងឆ្អឹង ហើយធ្វើឱ្យឆ្អឹងប្រែជាស្បូន ងាយបាក់។



62. តើកាល់ស្យូមមាននាទីដូចម្តេចខ្លះក្នុងសារពាង្គកាយ?

- កាល់ស្យូមមាននាទីធ្វើឱ្យមានការលូតលាស់ត្រឹមត្រូវ





នៃសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវចិត្ត ចូលរួមក្នុងដំណើរកំណកឈាម លំនាំប្រសាទ និងការកម្រិតសាច់ដុំ។

63. តាមធម្មតា តើកម្រិតកាល់ស្យូមក្នុងឈាមមានប៉ុន្មាន?

- តាមធម្មតា កម្រិតកាល់ស្យូមក្នុងឈាម មាន0.1mgក្នុងឈាម1ml។

64. ចូរប្រាប់ពីក្រពេញលើតម្រងនោមរបស់មនុស្ស។ (ឬតើក្រពេញលើតម្រងនោមមានប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?)

- មនុស្សមានក្រពេញលើតម្រងនោមចំនួនពីរ ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃតម្រងនោម។
- ក្រពេញនីមួយៗមានទម្ងន់ប្រហែល12g ដែលសម្បូរដោយសរសៃឫស។
- ចែកជាពីរផ្នែកគឺ ផ្នែកខាងក្រៅជាក្រពេញករតិចលើតម្រងនោម និងផ្នែកខាងក្នុងជាក្រពេញខ្លួនលើតម្រងនោម ។



65. តើក្រពេញខ្លួនលើតម្រងនោមផលិតអរម៉ូនអ្វីខ្លះ?

- ផលិតអរម៉ូនពីរគឺ អរម៉ូនអេពីណេត្រីន ឬអាត្រីណាលីន និង អរម៉ូនលូអេពីណេត្រីន។

66. តើអរម៉ូនអេពីណេត្រីន ឬអាត្រីណាលីនមានឥទ្ធិពលដូចម្តេចខ្លះ? ចូរពន្យល់។

- ស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌ គេចចេញ និងទប់ទល់ (Fight or flight) អរម៉ូនអេពីណេត្រីន ឬ អាត្រីណាលីន ធ្វើឱ្យមានកំណើនសម្ពាធឈាម បង្កើនអត្រាចង្វាក់បេះដូង កំណើនកំហាប់គ្រួសកូស និងអត្រាកំណកឈាមក្នុងសរសៃឈាម។ វាធ្វើឱ្យរន្ធប្រស្រីភ្នែករីកធំ បង្កើនសរសៃឈាមក្រោមស្បែក ធ្វើឱ្យស្បែកឡើងស្លាំង និង បណ្តាលឱ្យញើរ។
- ចលនាផ្សេងៗដែលកើតឡើងទាំងនេះ ធ្វើឱ្យយើងស្ថិតក្នុងសកម្មភាពប្រុងប្រយ័ត្ន និងទប់ទល់



ប្តូរតែចេញ។ វាត្រូវបានបញ្ចេញដើម្បីឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងភាពតានតឹង ដូចជា ការភ័យខ្លាច កំហឹង ការឈឺចាប់ ឬការហាត់ប្រាណ។ វាឆ្លើយតបបានរហ័សទៅនឹងភាពអាសន្នមួយចំនួន ដូចជានៅពេលមានឆ្កែដេញខាំ ឬពេលរុករានដៃហៀបនឹងធ្លាក់ពីលើដើមឈើជាដើម។

67. តើអ័រម៉ូនណូអេពីណេព្រីន ឬណូអេព្រីណេលីនត្រូវបានផលិតចេញពីអ្វី? មានឥទ្ធិពលដូចម្តេចខ្លះ?

- អ័រម៉ូនណូអេពីណេព្រីន ត្រូវបានសំយោគចេញពីតួកោសិកានៃឈាម
- វាសកម្មក្នុងការដឹកនាំអាំងតង់ទៅកោសិកាផ្សេងៗ និងមានឥទ្ធិពលលើការកម្រិតក្រហមឈាមនៃសរសៃឈាម។

68. តើក្រពេញក្រវិលលើតម្រងនោមផលិតអ័រម៉ូនអ្វីខ្លះ? មានឥទ្ធិពលដូចម្តេចលើសារពាង្គកាយ?

- ក្រពេញក្រវិលលើតម្រងនោមផលិតអ័រម៉ូនករទីសូល និងអ័រម៉ូនអាដីស្កូរ៉ូន។

69. តើអ័រម៉ូនករទីសូលមានឥទ្ធិពលអ្វី?

- អ័រម៉ូនករទីសូលជួយជម្រុញអ៊ីដ្រូកូរីសប្រូតេអ៊ីន និងទីក្លីសេរីតឱ្យទៅជាអាស៊ីតអាមីនេ និងអាស៊ីតខ្លាញ់(គ្លីសេរ៉ូល)។ បន្ទាប់មក ថ្លើមបំបែកវាទៅជាគ្រួសារកូសតែឱ្យកម្រិតគ្រួសារកូសនៅក្នុងឈាមកើនឡើង។

70. តើអ័រម៉ូនករទីសូលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ក្រពេញណាខ្លះ?

- អ័រម៉ូនករទីសូលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីប៉ូតាឡាមុស និងអ៊ីប៉ូភីសមុខ។

71. ចូរពន្យល់ពីការបញ្ចេញអ័រម៉ូននេះ។

- អ៊ីប៉ូតាឡាមុស ផលិតអ័រម៉ូនCRH (Cortico-releasing Hormone) ដើម្បីទៅឆ្លាចអ៊ីប៉ូភីសមុខឱ្យបញ្ចេញអ័រម៉ូនអាដ្រីណេកូរីកូត្រូប(ACTH)។ ACTH ឆ្លាចក្រពេញក្រវិលលើតម្រងនោមឱ្យបញ្ចេញអ័រម៉ូនករទីសូល។ អ័រម៉ូនករទីសូលជម្រុញអ៊ីដ្រូកូរីសប្រូតេអ៊ីន និងទីក្លីសេរីតឱ្យទៅជាអាស៊ីតអាមីនេ និងអាស៊ីតខ្លាញ់ (គ្លីសេរ៉ូល) ហើយថ្លើមបំបែកវាទៅជាគ្រួសារកូសតែឱ្យមានកំណើនកម្រិតគ្រួសារកូសសម្រាប់បញ្ចេញ ថាមពលក្នុងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗ។

72. ក្រៅពីទីតាំងលើតម្រងនោម តើវាងតម្រងនោម និងក្រពេញលើតម្រងនោម មានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាបែបណាដែរ?

- ក្រៅពីទីតាំងលើតម្រងនោម ក្រពេញក្រវិលលើតម្រងនោមបញ្ចេញអ័រម៉ូនអាដីស្កូរ៉ូន ដែល



តម្រូវការជ្រាបចេញនៃអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូម និងបញ្ចេញអ៊ីយ៉ុងប៉ូតាស្យូមពីតម្រងនោម។

73. តើកម្រិតអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូមមានសារៈសំខាន់អ្វី?

- កម្រិតអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូមសម្រាប់រក្សាសម្ពាធឈាមឱ្យនៅថេរក្នុងសារពាង្គកាយ។

74. តើអម្នូនអាចជួយស្ត្រីមាននាទីអ្វី?

- អម្នូនអាចជួយស្ត្រីមាននាទី តម្រូវកម្រិតអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូម និងកម្រិតប៉ូតាស្យូមក្នុងឈាមនៅត្រង់តម្រងនោម។

75. តើអម្នូនអាចជួយស្ត្រីស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ក្រពេញអ៊ីប៉ូភីសមុខដែរឬទេ?

- ការបញ្ចេញអម្នូនអាចជួយស្ត្រីស្ថិតនៅក្រោមបញ្ហានៃក្រពេញអ៊ីប៉ូភីសមុខទេ ប៉ុន្តែកំហាប់សូដ្យូមក្នុងឈាម តម្រូវឱ្យមានការបញ្ចេញអម្នូនអាចជួយស្ត្រី។

76. ចូរបកស្រាយពីដំណើរតម្រូវកម្រិតសូដ្យូមនៅក្នុងឈាម។

- នៅពេលកម្រិតសូដ្យូមក្នុងឈាមទាប តម្រងនោមផលិតអង់ស៊ីមរេណាំង។ កំណើនអង់ស៊ីមរេណាំងឆ្លាចឱ្យមានកំណើនការផលិតអម្នូនអង់ស៊ីប្រូតង់ស៊ីន I និង II ដែលឆ្លាចការបញ្ចេញអម្នូនអាចជួយស្ត្រី។ អាចជួយស្ត្រីឱ្យមានការជ្រាបចេញនៃអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូមពីតម្រងនោមទៅក្នុងប្លាស្មាឈាម។ នៅពេលកម្រិតសូដ្យូមក្នុងឈាមកើនឡើង ទឹកត្រូវបានជ្រាបចេញពីតម្រងនោមដែលជាហេតុធ្វើឱ្យសម្ពាធនិងមាឌឈាមត្រូវបានរក្សាលំនឹង។

77. តើកម្រិតសូដ្យូមក្នុងឈាមមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេច?

- កម្រិតសូដ្យូមក្នុងឈាមមានសារៈសំខាន់ក្នុងតំហែររក្សាសម្ពាធឈាម។ ហើយកំហាប់សូដ្យូមតម្រូវមិនផ្ទាល់ទៅនឹងការបញ្ចេញអម្នូនអាចជួយស្ត្រី។

78. តើរេណាំងជាអ្វី?

- រេណាំង ជាអង់ស៊ីមដែលផលិតដោយតម្រងនោមនៅពេលកម្រិតសូដ្យូមចុះទាប។

79. តើរេណាំងមាននាទីអ្វី?


- រេណាំង មាននាទីផ្លាស់ប្តូរប្រូតេអ៊ីនប្លាស្មាល្មោះអង់ស៊ីប្រូតង់ស៊ីណូសែនទៅជាអង់ស៊ីប្រូតង់ស៊ីន I ដែលបន្លាប់មកវាក៏ក្លាយជាអង់ស៊ីប្រូតង់ស៊ីន II ហើយអង់ស៊ីប្រូតង់ស៊ីន II ឆ្លាចតម្រងនោមឱ្យបញ្ចេញអម្នូនអាចជួយស្ត្រី។ នេះជាប្រព័ន្ធរេណាំងអង់ស៊ីប្រូតង់ស៊ីនអាចជួយស្ត្រី។

80. តើប្រព័ន្ធរណាមួយអង់ស៊ីយូតង់ស៊ីន អាចដូស្តេរ៉ូន មានឥទ្ធិពលដូចម្តេច?

- ប្រព័ន្ធនេះបង្កើនសម្ពាធឈាមតាមវិធីពីរយ៉ាងគឺ៖
 - វិធីទីមួយ៖ អង់ស៊ីយូតង់ស៊ីន បង្កើនកូនអាក់ទែដោយផ្ទាល់។
 - វិធីទីពីរ៖ អាចដូស្តេរ៉ូនឆ្លាចឱ្យមានជម្រាបចេញនៃសូដ្យូមពីតម្រងនោមទៅក្នុងឈាមវិញ។

81. តើលំពែងស្ថិតនៅណា? ជាអ្វី?

- លំពែងស្ថិតនៅទីកណ្តាលពោះចន្លោះតម្រងនោម និងនៅពីលើពោះវៀនតូចក្រោមក្រពះ។
- វាជាសរីរាង្គមួយដែលមានលក្ខណៈជាក្រពេញចម្រុះ។



82. ចូរពណ៌នាពីលក្ខណៈជាក្រពេញអង់ដូគ្រីនរបស់លំពែង។

- លំពែងជាក្រពេញអង់ដូគ្រីនដែលកើតឡើងពីកោសិកាមួយក្រុម ហៅថាអ៊ីយូឡុងសេរីង។ អ៊ីយូឡុងសេរីងមួយកើតពីកោសិកាពីរប្រភេទគឺកោសិកាបេតា (β) បញ្ចេញអ័រម៉ូនអាំងស៊ុលីន និងកោសិកាអាស់ហ្វា (α) បញ្ចេញអ័រម៉ូនគ្លុយកាកុង។ អ័រម៉ូនទាំងពីរនេះតម្រូវមេតាបូលីសគ្នាមួយក្នុងក្នុងឈាម។

83. ហេតុអ្វីបានជាគេថាលំពែងជាក្រពេញចម្រុះ? ចូរពន្យល់។

- លំពែងជាក្រពេញចម្រុះព្រោះ លំពែងជាក្រពេញអ៊ីប៉ូគ្រីនផង និងអង់ដូគ្រីនផង។



- លំពែង ជាក្រពេញអង្គដង្ហើម ព្រោះវាមានកោសិកាសម្រាប់បញ្ចេញអម្នូនគ្នាមកក្នុង និងអម្នូនអាំងស៊ុយលីន។
- លំពែង ជាក្រពេញអិចសូត្រីន ព្រោះនៅក្នុងលំពែងមានក្រពេញអាស៊ីតស៊ីត្រិកដែលបញ្ចេញរសលំពែងសម្រាប់រំលាយអាហារ។

84. ក្រោយពេលបរិភោគអាហារ តើសារធាតុចិញ្ចឹមអ្វីដែលមាននៅក្នុងឈាម?

- សារធាតុចិញ្ចឹមដែលមាននៅក្នុងឈាមក្រោយពេលបរិភោគអាហារមានដូចជា គ្រួសកូស អាស៊ីតអាមីនេ វីតាមីន អាស៊ីតខ្លាញ់ និងគ្លីសេរ៉ុល។

85. នៅពេលកម្រិតគ្រួសកូសកើនឡើង តើលំពែងបញ្ចេញអម្នូនអ្វី? ហើយមានសកម្មភាពដូចម្តេច?

- នៅពេលកម្រិតគ្រួសកូសកើនឡើង លំពែងបញ្ចេញអម្នូនអាំងស៊ុយលីន។
- អម្នូននេះឆ្លាចកោសិកាគោលដៅឱ្យចាប់យកគ្រួសកូសសម្រាប់ស្តុកទុក និងប្រើប្រាស់។

86. តើអាំងស៊ុយលីនជាអ្វី? មាននាទីដូចម្តេច?

- អាំងស៊ុយលីន ជាអម្នូនដែលផលិតដោយកោសិកាបេតាបស់លំពែង។
- វាមាននាទីបន្ថយកំណើនកម្រិតគ្រួសកូសក្នុងចរន្តឈាម។

87. តើកោសិកាណាខ្លះជាកោសិកាគោលដៅរបស់អម្នូនអាំងស៊ុយលីន?

- កោសិកាគោលដៅរបស់អម្នូនអាំងស៊ុយលីនមានដូចជាកោសិកាថ្លើម កោសិកាសាច់ដុំជាប់ឆ្អឹង និងជាលិកាខ្លាញ់ជាដើម។

88. ចូរពណ៌នាពីសកម្មភាពរបស់អម្នូនអាំងស៊ុយលីន។

- នៅពេលកម្រិតគ្រួសកូសកើនឡើងខ្ពស់ អាំងស៊ុយលីនឆ្លាចកោសិកាគោលដៅ (កោសិកាថ្លើម កោសិកាសាច់ដុំជាប់ឆ្អឹង និងជាលិកាខ្លាញ់) ឱ្យចាប់យកគ្រួសកូសប្រើប្រាស់ជាប្រភពថាមពលសម្រាប់សកម្មភាពផ្សេងៗ។ ឯម៉ូលេគុលគ្រួសកូសដែលនៅសល់ អាំងស៊ុយលីនបំប្លែងឱ្យទៅជាគ្លីកូសែន ហើយស្តុកទុកនៅក្នុងកោសិកាថ្លើម និងសាច់ដុំជាប់ឆ្អឹង។ ម្យ៉ាងទៀតគ្រួសកូសក៏ត្រូវបានបំប្លែងជាខ្លាញ់ ហើយស្តុកទុកក្នុងជាលិកាខ្លាញ់។

89. ជាធម្មតា ហេតុអ្វីបានជាគ្មានគ្រួសកូសមាននៅក្នុងទឹកនោមដែលបញ្ចេញមកក្រៅ?

- ព្រោះគ្រួសកូសត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាថាមពល ខ្លះស្តុកទុកក្នុងកោសិកាថ្លើមនិងសាច់ដុំ និងខ្លះទៀត



ស្តុកទុកក្នុងជាលិកាខ្លាញ់។

90. តើលំពែងផលិតអម្ពន្ធគ្នុងក្រុមនៅពេលណា?

- លំពែងផលិតអម្ពន្ធគ្នុងក្រុម នៅពេលកម្រិតគ្រួសារក្នុងគ្រួសារមានចុះក្រោមកម្រិតកំណត់ លំពែងបញ្ចេញគ្រួសារក្នុងដើម្បីដំឡើងបរិមាណគ្រួសារក្នុងគ្រួសារឱ្យដល់កម្រិតកំណត់វិញ។

91. ចូរពណ៌នាពីសកម្មភាពរបស់អម្ពន្ធគ្នុងក្រុម។

- ការថយចុះនៃគ្រួសារក្រោមកម្រិតកំណត់បានឆ្លាចលំពែងឱ្យបញ្ចេញគ្រួសារក្នុងទៅក្នុងចរន្ត ឈាម។ គ្រួសារក្នុងបានឆ្លាចកោសិកាគោលដៅឱ្យផលិតគ្រួសារ។ នៅក្នុងថ្លើម គ្រួសារក្នុងបំប្លែងគឺ កូសែនឱ្យទៅជាគ្រួសារ។ បន្ទាប់មក គ្រួសារសាយចេញពីថ្លើមចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមយ៉ាងរហ័ស ។ នៅពេលគឺកូសែនដែលស្តុកក្នុងថ្លើមបានបញ្ចេញអស់ គ្រួសារក្នុងនឹងធ្វើឱ្យអាស៊ីតអាមីនេ និង អាស៊ីតខ្លាញ់ប្លែងទៅជាគ្រួសារវិញ។

92. នៅពេលយើងបរិភោគគ្រួសារស៊ីតមិនគ្រប់គ្រាន់ តើសារពាង្គកាយរបស់យើងនឹងធ្វើដូចម្តេច?

- សារពាង្គកាយរបស់យើងនឹងអាចបំប្លែងខ្លាញ់និងប្រូតេអ៊ីនឱ្យទៅជាគ្រួសារស៊ីតដើម្បីផ្តល់ជា គ្រួសារសម្រាប់តម្រូវការថាមពលនៅក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់សារពាង្គកាយ។

93. តើធ្វើដូចម្តេចទើបដឹងថាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម?

- ដើម្បីដឹងថាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម គេត្រូវធ្វើវិភាគទឹកនោម ដោយលទ្ធផលឃើញមានកម្រិត ជាតិស្ករច្រើនក្នុងទឹកនោម។

94. ហេតុអ្វីបានជាមានគ្រួសារច្រើនក្នុងទឹកនោម?

- បានជាមានគ្រួសារច្រើនក្នុងទឹកនោមមកពីកង្វះអម្ពន្ធអាំងស៊ីយលីន ឬអវត្តមានអម្ពន្ធនេះ។

95. តើជំងឺទឹកនោមផ្អែមបណ្តាលមកពីមូលហេតុអ្វី?

- នៅពេលដែលកោសិកាបេតា ផលិតអាំងស៊ុយលីនមិនគ្រប់គ្រាន់ ធ្វើឱ្យបរិមាណគ្រួសារក្នុង ឈាមកើនឡើង ហើយតម្រងនោមមិនអាចធ្វើឱ្យគ្រួសារទាំងអស់ជ្រាបចេញវិញបាន។ ដូចនេះ គ្រួសារលើសត្រូវបានបញ្ចេញទៅក្នុងទឹកនោម ដែលបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម។

96. តើជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានអាការៈដូចម្តេចខ្លះ? តើអាចព្យាបាលបានឬទេ?

- ជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានអាការៈដូចជា ហត់ អស់កម្លាំង ញ័រដៃញ័រជើង ស្រកទម្ងន់ នោមញឹក




ស្រែកទឹកខ្លាំង និងចុះខ្សោយ។

- គេអាចព្យាបាលបានដោយមានរបបអាហារត្រឹមត្រូវ និងលេបថ្នាំ ឬចាក់អាំងស៊ុយលីនជា រៀងរាល់ថ្ងៃ ទើបអាចត្រួតពិនិត្យជំងឺបាន ។ បើមិនព្យាបាលទេ អ្នកជំងឺអាចនឹងស្លាប់។

97. ចូរពណ៌នាសង្ខេបពីតំហែរក្បាច់កម្រិតគ្រួសារក្នុងឈាមតាមរូបបំព្រួញទំព័រទី១១០។

- ដំណាក់ទី១៖ ក្រោយពេលបរិភោគអាហារ គ្រួសារ ចូល ទៅក្នុងចរន្តឈាមយ៉ាងរហ័ស។ កោសិកាមិនអាចចាប់យកវាបានទាន់ពេលសម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាប្រភពថាមពល។ ដូចនេះគ្រួសារកើនឡើង។
- ដំណាក់ទី២៖ កោសិកាបេតារបស់លំពែងត្រូវបានឆ្លាចឱ្យ បញ្ចេញអាំងស៊ុយលីនទៅក្នុងឈាម។ នៅពេលនេះកោសិកាអាចចាប់យកគ្រួសារមកប្រើប្រាស់។
- ដំណាក់ទី៣៖ កោសិកាសាច់ដុំ ថ្លើម លំពែងនិងកោសិកាផ្សេងៗរបស់សារពាង្គ កាយប្រើប្រាស់ គ្រួសារជាប្រភពថាមពលឬបំប្លែងទៅជាគ្លីកូសេន ហើយស្តុកទុកក្នុងកោសិកាសាច់ដុំនិងថ្លើម។ ដូចនេះកម្រិតគ្រួសារនៅក្នុងឈាមត្រឡប់មកនៅធម្មតាវិញ។
- ដំណាក់ទី៤៖ នៅចន្លោះពេលអាហារកម្រិតគ្រួសារនៅក្នុងឈាមធ្លាក់ចុះពីកម្រិតធម្មតា។
- ដំណាក់ទី៥៖ កោសិកាបស់លំពែង(អាល់ហ្វា) ត្រូវបានឆ្លាចឱ្យបញ្ចេញអរម៉ូនគ្រួសាកក់ទៅក្នុង ឈាម។ កោសិកាសាច់ដុំ ថ្លើម បំប្លែងគ្លីកូសេនឱ្យទៅជាគ្រួសារ។ តែមានតែកោសិកាថ្លើមទេ ដែលបញ្ចេញគ្រួសារទៅក្នុងឈាម។





98. តើក្រពេញឆាទមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?

- ក្រពេញឆាទមានពីរប្រភេទគឺ អូរ៉ែ (ចំពោះមនុស្សស្រី) និងពងស្វាស (ចំពោះមនុស្សប្រុស)។

99. តើក្រពេញឆាទមាននាទីដូចម្តេចខ្លះ?

- ក្រពេញឆាទមាននាទីផលិតកាម៉ែត និងអម្មនីយកម្មជួយក្នុងការលូតលាស់ប្រដាប់បន្តពូជ។

100. តើអូរ៉ែផលិតអម្មនីយកម្មអ្វីខ្លះ?

- អូរ៉ែផលិតអម្មនីយកម្មអីស្ត្រូសែន និងប្រូសេស្តេរ៉ូន។

101. តើអម្មនីយកម្មអីស្ត្រូសែនត្រូវបានផលិតចេញពីអ្វី?

- អម្មនីយកម្មអីស្ត្រូសែន ត្រូវបានផលិតចេញពីកោសិកាផ្លូវចិត្តនៃអូរ៉ែដោយឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លាចរបស់ FSH។ អង្គលៀងដែលកើតពីការផ្ទុះបែកនៃផ្លូវចិត្តក៏បញ្ចេញអម្មនីយកម្មនេះដែរ។

102. តើអម្មនីយកម្មអីស្ត្រូសែនមាននាទីដូចម្តេច?

- មាននាទីធ្វើឱ្យស្រទាប់ភ្នាសសើមស្បូនឡើងក្រាស់ ដោយបង្កើនចំណែកមីតូស្ទនៃកោសិកា។
- មានឥទ្ធិពលទៅលើលក្ខណៈឆាទបន្ទាប់របស់មនុស្សស្រីដែរ។
- ពេលមានផ្ទៃពោះ សុកជាអ្នកបញ្ចេញអម្មនីយកម្មអីស្ត្រូសែន។

103. ហេតុអ្វីបានជាគេថាអូរ៉ែ ជាក្រពេញចម្រុះ?

- អូរ៉ែ ជាក្រពេញចម្រុះ ព្រោះអូរ៉ែជាក្រពេញអិចសូត្រីនផង និងអង់ដូត្រីនផង។
- វាជាក្រពេញអិចសូត្រីន ព្រោះវាបង្កើត អូរ៉ូស៊ីត II ដែលធ្វើដំណើរពីអូរ៉ែទៅដៃស្បូន
- វាជាក្រពេញអង់ដូត្រីន ព្រោះវាបញ្ចេញអម្មនីយកម្មអីស្ត្រូសែន និងប្រូសេស្តេរ៉ូនទៅក្នុងចរន្តឈាម។

104. តើអម្មនីយកម្មប្រូសេស្តេរ៉ូនត្រូវបានផលិតចេញពីអ្វី?

- អម្មនីយកម្មប្រូសេស្តេរ៉ូនត្រូវបានផលិតចេញពីកោសិកាផ្លូវចិត្តដ៏ក្រាបដែលផ្ទុះបែកក្រោមការឆ្លាចរបស់អម្មនីយកម្ម LH។

105. តើអម្មនីយកម្មប្រូសេស្តេរ៉ូនមាននាទីដូចម្តេច?

- អម្មនីយកម្មប្រូសេស្តេរ៉ូនមាននាទីឆ្លាចឱ្យភ្នាសសើមស្បូនឡើងកម្រាស់សម្រាប់កាច់សម្បុករហូតដល់ខែទី 4 នៃការមានផ្ទៃពោះ ហើយសុកក៏បញ្ចេញអម្មនីយកម្មនេះបន្ត។
- អម្មនីយកម្មនេះថែរក្សាគភ៌ដែលបណ្តាលឱ្យសាច់ដុះស្បូនសម្រាក និងឆ្លាចក្រពេញទឹកដោះឱ្យលូត



លាស់។

106. តើពងស្វាសបញ្ចេញអម្រូនអ្វី?

- ពងស្វាសបញ្ចេញអម្រូនតេស្តូស្តេរ៉ូន (ជាអម្រូនមនុស្សប្រុស អង់ដ្រូសេនសំខាន់ជាងគេ)។

107. តើអម្រូនតេស្តូស្តេរ៉ូនមាននាទីអ្វី?

- អម្រូនតេស្តូស្តេរ៉ូនមាននាទីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការលូតលាស់លក្ខណៈភេទបន្ទាប់របស់មនុស្សប្រុសដូចជា សម្លេងគ្រលរ ដុះពុកចង្កា...។

108. ហេតុអ្វីបានជាគេថាពងស្វាសជាក្រពេញចម្រុះ?


- ពងស្វាស ជាក្រពេញចម្រុះ ព្រោះវាជាក្រពេញអ៊ីចសូត្រីនផង និងអង់ដ្រូត្រីនផង។
- វាជាក្រពេញអ៊ីចសូត្រីន ព្រោះវាផលិតនិងបញ្ចេញស្តេរ៉ូម៉ាតូស្តេរីតមកក្រៅសារពាង្គកាយ។
- វាជាក្រពេញអង់ដ្រូត្រីន ព្រោះវាផលិត និងបញ្ចេញ អម្រូនតេស្តូស្តេរ៉ូនទៅក្នុងចរន្តឈាម។

109. ចូរប្រាប់អំពីតំណបត្រលប់អវិជ្ជមានរបស់ក្រពេញភេទមនុស្សប្រុស។

- អ៊ីប៉ូតាឡាមុសបញ្ចេញCRH (អម្រូនបញ្ចេញ)។ អម្រូននេះឆ្លាចអ៊ីប៉ូភីសមុខឱ្យបញ្ចេញអម្រូនកូណាដូស្ត្រីមុយលីន ដែលមានអម្រូនពីរគឺFSHនិងLH។ FSHឆ្លាចកោសិកាពូជក្នុងបំពង់សេមីនីផ្កាឱ្យផលិតកាម៉ែតឈ្មោល និងអម្រូនបង្កាក់។ LHឆ្លាចកោសិកាទាំងទីស្ទីស្ទែលក្នុងពងស្វាសឱ្យផលិតអម្រូនតេស្តូស្តេរ៉ូន។ នៅពេលកម្រិតអម្រូនតេស្តូស្តេរ៉ូនឡើងខ្ពស់ឆ្លាចអ៊ីប៉ូតាឡាមុសបន្ថយការផលិតCRH។ នៅពេលកម្រិតCRHថយចុះ នាំឱ្យមានការបញ្ចេញ FSHនិងLHថយចុះដែរ។ កាលណាFSHនិងLHថយចុះ ការផលិតកាម៉ែតឈ្មោល និងអម្រូនតេស្តូស្តេរ៉ូនក៏ថយចុះដែរ។ ដោយសារកម្រិតអម្រូននេះថយចុះ អ៊ីប៉ូតាឡាមុសក៏ចាប់ផ្តើមផលិតCRHជាថ្មីទៀត។ តំណបត្រលប់អវិជ្ជមានបែបនេះ រក្សានូវកម្រិតអម្រូនតេស្តូស្តេរ៉ូនឱ្យនៅថេរក្នុងឈាម។

110. តើក្រពេញទីមុសស្ថិតនៅឯណា? ផលិតអម្រូនអ្វី?

- ក្រពេញទីមុស ជាក្រពេញស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃទ្រូងក្បែរបេះដូង។ វាមានទំហំធំនៅវ័យកុមារ និងរួមតូចក្រោយពេលគ្រប់ការ។ វាផលិតអម្រូនទីម៉ូស៊ីន។





111. តើទីម៉ូស៊ីនជាអ្វី? មាននាទីអ្វី?

- ទីម៉ូស៊ីន ជាអម្រូនដែលផលិតដោយក្រពេញទីមុស។
- វាមាននាទីធ្វើឱ្យឡើងផ្លូវផ្សិតដែលឆ្លងកាត់ក្រពេញនេះក្លាយឡើងផ្លូវផ្សិត។
- អម្រូនទីម៉ូស៊ីនក៏ឆ្លាចឡើងផ្លូវផ្សិតនៅក្នុងក្រពេញទីករដែរ និងក្នុងសរីរាង្គក្នុងដទៃទៀតឱ្យផលិតឡើងផ្លូវផ្សិតថ្មីៗដែរ។

112. តើអម្រូនកាស្ត្រីនត្រូវបានផលិតដោយសរីរាង្គណាមួយ? មាននាទីអ្វី?

- អម្រូនកាស្ត្រីន ត្រូវបានផលិតដោយកោសិកាពិសេសក្នុងភ្នាសក្រពះ។
- អម្រូនកាស្ត្រីនមាននាទីឆ្លាចឱ្យមានលំហូរនៃរសក្រពះ។

113. តើអម្រូនសេក្រេទីនត្រូវបានផលិតដោយសរីរាង្គណាមួយ? មាននាទីអ្វី?

- ផលិតអម្រូនសេក្រេទីនត្រូវបានដោយផលិតកោសិកានៃភ្នាសពោះវៀនតូច។
- អម្រូននេះមាននាទីឆ្លាចឱ្យមានលំហូរនៃរសលំពែង។

114. តើសារពាង្គកាយត្រូវការអម្រូនក្នុងបរិមាណបែបណា? ប្រសិនបើបរិមាណអម្រូនខុសពីអត្រាកំណត់ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង?

- សារពាង្គកាយត្រូវការអម្រូនក្នុងបរិមាណតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ហើយបរិមាណនេះត្រូវតែថេរ។
- ប្រសិនបើបរិមាណអម្រូនខុសកើនឡើងច្រើន ឬថយចុះខុសពីបរិមាណកំណត់ នោះសារពាង្គកាយនឹងមានជំងឺរាករិនប្រក្រតី ដែលបណ្តាលឱ្យមានជំងឺ ហើយអាចនឹងឆ្លងឆ្លូវ។

115. តើអម្រូនអ្វីខ្លះដែលមានទំនាក់ទំនងក្នុងការត្រួតពិនិត្យមេតាបូលីសមួយកូស?

- អម្រូនដែលមានទំនាក់ទំនងក្នុងការត្រួតពិនិត្យមេតាបូលីសមួយកូសមានដូចជា៖
 - អម្រូនអាំងស៊ុយលីន
 - អម្រូនគ្គុយកាកុដ
 - អម្រូនអាទ្រៃណាលីន និង
 - អម្រូនករទីសូល។



116. តើអ្វីប៉ុណ្ណាមុស និងអ្វីប៉ុក្រីស មានទំនាក់ទំនងជាមួយផ្នែកទម្រង់ និងមុខងារដូចម្តេចខ្លះ?

- ទំនាក់ទំនងផ្នែកទម្រង់គឺ អ្វីប៉ុណ្ណាមុស ស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃអ្វីប៉ុក្រីសដែលភ្ជាប់គ្នាដោយប្រព័ន្ធសរសៃឈាម។
- ទំនាក់ទំនងផ្នែកមុខងារគឺ អ្វីប៉ុក្រីសមុខបញ្ចេញអម្រូនបានដោយសារការឆ្លាចដោយអម្រូនដែលបញ្ចេញដោយកោសិកាណឺរ៉ូនបញ្ចេញរបស់អ្វីប៉ុណ្ណាមុស។ ចំណែកឯ អ្វីប៉ុក្រីសក្រោយអាចបញ្ចេញអម្រូនអុកស៊ីតូស៊ីន និងADHដែលស្តុកទុកនៅក្នុងចុងអាក់ស្យូនក្នុងអ្វីប៉ុក្រីសក្រោយបានទាល់តែកោសិកាណឺរ៉ូនបញ្ចេញរបស់អ្វីប៉ុណ្ណាមុសត្រូវបានឆ្លាច (នៅពេលឈាមខាប់)។

117. ចូររកលក្ខណៈខុសគ្នារវាងអម្រូនអុកស៊ីតូស៊ីន និងអម្រូនប្រឡាក់ទីន។

លក្ខណៈខុសគ្នា

អម្រូនអុកស៊ីតូស៊ីន	អម្រូនប្រឡាក់ទីន
• ផលិតដោយកោសិកាណឺរ៉ូនបញ្ចេញនៅក្នុងអ្វីប៉ុណ្ណាមុស • បញ្ចេញដោយអ្វីប៉ុក្រីសក្រោយ • បញ្ចេញនៅពេលសម្រាលកូន • ឆ្លាចក្រពេញទឹកដោះឱ្យបញ្ចេញទឹកដោះពេលបំប្លែកកូន • ឆ្លាចការកម្រិតនៃសាច់ដុំរលីងនៅក្នុងស្បូនដែលជួយជម្រុញទារកពីក្នុងស្បូនម្តាយនៅពេលសម្រាលកូន	• ផលិតដោយកោសិកាក្រពេញអ្វីប៉ុក្រីសមុខ • បញ្ចេញដោយអ្វីប៉ុក្រីសមុខ • បញ្ចេញនៅក្រោយពេលសម្រាលកូន • ឆ្លាចឱ្យក្រពេញទឹកដោះឱ្យលូតលាស់ និងផលិតទឹកដោះ។ • មាននាទីក្នុងមេតាបូលីសខ្លាញ់ និងគ្រួសារស៊ីត។

118. តើកោសិកាណាជាកោសិកាគោលដៅនៃអម្រូនអុកស៊ីតូស៊ីន?

- កោសិកាគោលដៅរបស់អម្រូនអុកស៊ីតូស៊ីនគឺជា កោសិកាសាច់ដុំរលីងនៅក្នុងស្បូន និងកោសិកាសាច់ដុំដែលនៅជុំវិញកោសិកាក្រពេញទឹកដោះ។



119. តើផ្នែកណាដែលភ្ជាប់ប្រព័ន្ធប្រសាទ និងប្រព័ន្ធអង់ដ្យូត្រីន? ចូរពន្យល់។

- ប្រព័ន្ធប្រសាទ និងប្រព័ន្ធអង់ដ្យូត្រីនធ្វើការជាមួយគ្នា។ អ៊ីប៉ូតាឡាមុសដែលជាផ្នែកតូចមួយនៅក្នុងខួរក្បាល នៅចំពីក្រោមតាឡាមុស ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះ។ អាំងត្យូប្រសាទ ដែលទាក់ទងនឹងការស្រក ការឃ្លាន និងបំបៅផ្សេងៗទៀតនៃសារពាង្គកាយគឺចេញពីអ៊ីប៉ូតាឡាមុស។ ម្យ៉ាងទៀតអ៊ីប៉ូតាឡាមុសក៏ផលិតអរម៉ូនដែលត្រួតពិនិត្យក្រពេញអង់ដ្យូត្រីន និងសរីរាង្គផ្សេងៗទៀតដែរ។ ដូចនេះ អ៊ីប៉ូតាឡាមុសមានឆាប់យ៉ាងសំខាន់ក្នុងថេរលំនឹង ព្រោះអ៊ីប៉ូតាឡាមុសបង្កើតអាំងត្យូប្រសាទ និងផលិតអរម៉ូន។

120. តារាងឈ្មោះអរម៉ូន និងក្រពេញដែលផលិត និងបញ្ចេញ។

ឈ្មោះអរម៉ូន	ឈ្មោះក្រពេញ	ឈ្មោះអរម៉ូន	ឈ្មោះក្រពេញ
1.អរម៉ូនអង់ឌីអ៊ីយ៉ូរេទីច(ADH)	ផលិតនៅអ៊ីប៉ូតាឡាមុស	14.អរម៉ូនករទីសូល	ក្រពេញករតិចលើតម្រង
2.អរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីន	ស្តុកនៅអ៊ីប៉ូភីសក្រោយ	15.អរម៉ូនអាល់ដូស្តេរ៉ូន	នោម
3.អរម៉ូនលូតលាស់ (GH)	ផលិត និងបញ្ចេញដោយក្រពេញអ៊ីប៉ូភីសមុខ	16.អរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន	កោសិកាបេតារបស់លំពែង
4.អរម៉ូនប្រូឡាក់ទីន (PRH)		17.អរម៉ូនគុយកាកុង	កោសិកាអាល់ហ្វារបស់លំពែង
5.អរម៉ូនមេឡាណូស៊ីតស្ទីមុយឡង់(MSH)		18.អរម៉ូនអ៊ីស្ត្រូសែន	អូវ៉ែ (ភ្លោចដោយFSH)
6.អរម៉ូនទីរេអូស្ទីមុយលីន (TRH)		19.អរម៉ូនប្រូសេស្តេរ៉ូន	អូវ៉ែ (ភ្លោចដោយLH)
7.អរម៉ូនអាដ្រេណូកូរទីកូត្រូប(ACTH)		20.អរម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូន	ក្រពេញពងស្វាស (FSH&LH)
8.អរម៉ូនកូណាដូស្ទីមុយលីន(FSH&LH)		21.អរម៉ូនទីម៉ូស៊ីន	ក្រពេញទីមុស
9.អរម៉ូនទីរ៉ូកស៊ីន	ផលិតនិងបញ្ចេញដោយក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត	22.អរម៉ូនកាស្ត្រីន	កោសិកាក្នុងក្លាសក្រពះ
10.អរម៉ូនកាល់ស៊ីតូនីន	ក្រពេញប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត	23.អរម៉ូនសេក្រេទីន	កោសិកានៃក្លាសពោះវៀនតូច
11.អរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត (PTH)		24.អរម៉ូនCRH(អរម៉ូនបញ្ចេញ)ផលិតដោយអ៊ីប៉ូតាឡាមុសដើម្បីភ្លោចឱ្យក្រពេញអ៊ីប៉ូភីសបញ្ចេញអរម៉ូនដែលកោសិកាគោលដៅត្រូវការ ។	
12.អរម៉ូនអេពីណេត្រីន	ក្រពេញខួរលើតម្រង		
13.អរម៉ូនណូអេពីណេត្រីន	នោម		



ជំពូក៤ នាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីនក្នុងសារពាង្គកាយ

មេរៀនទី១ អាស៊ីតអាមីនេ

- តើអាស៊ីតអាមីនេ ឬអាមីណូអាស៊ីត (Amino acid) ជាអ្វី?
 - អាស៊ីតអាមីនេ ជាម៉ូណូមែរបស់ប្រូតេអ៊ីន។
- តើប៉ូលីមែរបស់អាស៊ីតអាមីនេជាអ្វី?
 - ប៉ូលីមែរបស់អាស៊ីតអាមីនេជាប្រូតេអ៊ីន។
- ហេតុអ្វីបានជាឯកត្តៈនីមួយៗមិនអាចរស់បាន បើគ្មានប្រូតេអ៊ីន?
 - ព្រោះប្រូតេអ៊ីនជាសមាសធាតុគ្រឹះនៃជីវិត។ គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់របស់កោសិកាសុទ្ធតែត្រូវការប្រូតេអ៊ីនជាចាំបាច់។ វាមាននៅក្នុងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់សារពាង្គកាយដែលមាននាទីដូចជា ប្រូតេអ៊ីនទម្រង់ ជាកាតាលីករ ជាអរម៉ូន ជាអ្នកការពារ និងជាអ្នកដឹកនាំជាដើម។
- តើធាតុបង្ករបស់អាស៊ីតអាមីនេមានអ្វីខ្លះ?
 - អាស៊ីតអាមីនេនីមួយៗកើតឡើងពីបណ្តុំកាបូកស៊ីល (-COOH) បណ្តុំអាមីន (-NH₂) និងរ៉ាឌីកាល់ (R)។
- ចូរសរសេររូបមន្តទូទៅរបស់អាស៊ីតអាមីនេ។
 - រូបមន្តទូទៅរបស់អាស៊ីតអាមីនេ៖

$$\begin{array}{c} \text{R} - \text{CH} - \text{COOH} \\ | \\ \text{NH}_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ | \quad || \\ \text{R} - \text{C} - \text{C} - \text{O} - \text{H} \\ | \\ \text{H} - \text{N} - \text{H} \end{array}$$

រូបមន្តស្ទើរលាត

រូបមន្តលាត
- តើនៅក្នុងកោសិកានៃសារពាង្គកាយមនុស្សមានអាស៊ីតអាមីនេប៉ុន្មានប្រភេទ?
 - នៅក្នុងកោសិកានៃសារពាង្គកាយមនុស្សមានអាស៊ីតអាមីនេប្រហែល 20 ប្រភេទ។
- តើអាស៊ីតអាមីនេទាំងអស់ខុសគ្នាពីមួយទៅមួយដោយសារអ្វី?
 - អាស៊ីតអាមីនេទាំងអស់ខុសគ្នាពីមួយទៅមួយដោយសាររ៉ាឌីកាល់(R)។



8. នៅកម្រិត $pH=7$ តើបណ្តុំកាបូកស៊ីលបំបែកទៅជាអ្វី?

- បណ្តុំកាបូកស៊ីលបំបែកទៅជាទម្រង់ប្រូតូន ($-COO^-$) ។


9. នៅកម្រិត $pH=7$ តើបណ្តុំអាមីនបំបែកទៅជាអ្វី?

- បណ្តុំអាមីនបំបែកទៅជាទម្រង់អាស៊ីត ($-NH_3^+$) ។

10. ហេតុអ្វីបានជាគេថាអាស៊ីតអាមីនមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតផង និងជាបាសផង?

- អាស៊ីតអាមីនមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតផង និងជាបាសផង ព្រោះក្នុងម៉ូលេគុលរបស់វាមានបណ្តុំអាស៊ីតផង និងបណ្តុំអាមីនផង។

11. ចូរសរសេររូបមន្តអាស៊ីតអាមីនក្នុងមជ្ឈដ្ឋានណឺត (កម្រិត $pH=7$) ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីត ($pH<7$) និងក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបាស ($pH>7$)។



12. ហេតុអ្វីបានជាគេថាអាស៊ីតអាមីនមាននាទីជាអ្នកនាំសារ? ចូររកឧទាហរណ៍។

- អាស៊ីតអាមីនមាននាទីជាអ្នកនាំសារ ព្រោះវាជាអ្នកបញ្ជូនព័ត៌មានប្រសាទ ហើយមានឥទ្ធិពលទៅលើនាទីរបស់កោសិកាគោលដៅ ឬកោសិកាសាច់ដុំ។

13. ក្រៅពីនាទីជាអ្នកនាំសារ តើអាស៊ីតអាមីនមាននាទីជាអ្វីទៀត? ចូររកឧទាហរណ៍។

- ក្រៅពីនាទីជាអ្នកនាំសារ អាស៊ីតអាមីនមាននាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងមេតាបូលីស និងសម្របសម្រួលនាទីកោសិកា។

14. ហេតុអ្វីបានជាគេថាតំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីនកំណត់ទម្រង់ និងនាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីន?

- តំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីនកំណត់ទម្រង់ និងនាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីន ព្រោះតំណលំដាប់តម្រៀបអាស៊ីតអាមីនក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន ធ្វើឱ្យម៉ូលេគុលនោះមានទម្រង់ខុសៗគ្នា ហើយទម្រង់នោះជាអ្នកកំណត់នាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីន។



15. តើគេធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថា ម៉ូឈូមែរបស់ប្រូតេស្តង់ជាអាស៊ីតអាមីនេ?

- ដើម្បីដឹងថា ម៉ូឈូមែរបស់ប្រូតេស្តង់ជាអាស៊ីតអាមីនេ គេធ្វើអ្វីជ្រួលីស។

16. តើអ្វីជ្រួលីសជាអ្វី?

- អ្វីជ្រួលីស ជាប្រតិកម្មគីមីដែលបំបែកម៉ូលេគុលធំមួយ ឱ្យទៅជាម៉ូលេគុលតូចៗដោយសារទឹក និង អង់ស៊ីម។

17. ហេតុអ្វីបានជាគេហៅប្រតិកម្មដែលកើតឡើងពីការភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីនេពីរថាជាប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្ម?

- ប្រតិកម្មនេះ ជាប្រតិកម្មដេអ៊ីដ្រាតកម្ម ព្រោះក្នុងប្រតិកម្មនេះវាបានបាត់បង់ម៉ូលេគុលទឹកនៅពេល មានអាស៊ីតអាមីនេពីរភ្ជាប់គ្នា។

18. ហេតុអ្វីបានជាគេថាអាស៊ីតអាមីនេជាសារធាតុចំណូលទឹក?

- អាស៊ីតអាមីនេ ជាសារធាតុចំណូលទឹក ព្រោះវាមានលាយក្នុងទឹក ហើយអាចជ្រាបតាមក្លាស កោសិកាបាន។

19. តើប៊ុបទីតជាអ្វី?

- ប៊ុបទីត ជាបណ្តុំរាងអាស៊ីតអាមីនេពីរ ឬ ច្រើន(២ ទៅ១០)។

20. តើចំណងប៊ុបទីតជាអ្វី?

- ចំណងប៊ុបទីត ជាសម្ព័ន្ធកូរ៉ាឡង់រវាងបណ្តុំកាបូកស៊ីលនៃអាស៊ីតអាមីនេមួយ និងបណ្តុំអាមីន នៃអាស៊ីតអាមីនេមួយទៀតដោយបាត់បង់មួយម៉ូលេគុលទឹក។

21. តើអាស៊ីតអាមីនេគ្មានស្តង់ដាជាអ្វី?

- អាស៊ីតអាមីនេគ្មានស្តង់ដា ជាអាស៊ីតអាមីនេទាំង២០ ប្រភេទ ដែលជាធាតុបង្ករបស់ប្រូតេស្តង់ ប៉ុន្តែ វាមិនមែនជាធាតុបង្ករបស់ប្រូតេស្តង់។

22. តើអាស៊ីតអាមីនេស្តង់ដាជាអ្វី?

- អាស៊ីតអាមីនេស្តង់ដា ជាអាស៊ីតអាមីនេទាំង២០ ប្រភេទ ដែលជាធាតុបង្ករបស់ប្រូតេស្តង់ គឺវា មានក្រុមសេនេទិចសម្រាប់កំណត់។

23. តើឱប៊ុបទីតជាអ្វី? តើមានចំណងប៊ុបទីតប៉ុន្មាន?

- ឱប៊ុបទីត គឺជាបណ្តុំរាងអាស៊ីតអាមីនេពីរភ្ជាប់គ្នាដោយផ្តាច់មួយម៉ូលេគុលទឹក និងមានចំណង



ប៊ីបទីតចំនួនមួយ។

24. តើទ្រីប៊ីបទីតជាអ្វី? តើមានចំណងប៊ីបទីតប៉ុន្មាន?

- ទ្រីប៊ីបទីត គឺជាបណ្តុំរវាងអាស៊ីតអាមីនេបីភ្ជាប់គ្នាដោយផ្តាច់ពីរម៉ូលេគុលទឹក និងមានចំណងប៊ីបទីតចំនួនពីរ។


25. តើអាស៊ីតអាមីនេទី២០ ខុសពីអាស៊ីតអាមីនេទី១៩ត្រង់ណា?

- អាស៊ីតអាមីនេទី២០ ខុសពីអាស៊ីតអាមីនេទី១៩ត្រង់ម៉ូលេគុលរបស់វា អាសូតត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងកាបូនដល់ទៅពីរ។


26. ចំពោះសត្វឆ្អឹងកង នៅពេលសំយោគអ៊ីយ៉ូន តើម៉ូលេគុលអាសូតត្រូវបញ្ចេញចោលទៅណា?

- នៅពេលសំយោគអ៊ីយ៉ូនក្នុងថ្លើម ហើយអាសូតរបស់អ៊ីយ៉ូនត្រូវបញ្ចេញចោលទៅក្នុងតម្រងនោម។

27. ចូរសរសេរសមីការឌីប៊ីបទីតដែលភ្ជាប់រវាងអាស៊ីតអាមីនេពីរ។



28. ចូរសរសេររូបមន្តឌីប៊ីបទីតដែលភ្ជាប់រវាងអាស៊ីតអាមីនេពីរដោយបញ្ជាក់ទីតាំងចំណងប៊ីបទីតឱ្យបានច្បាស់លាស់។





ជំពូក៤ នាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីនក្នុងសារពាង្គកាយ

មេរៀនទី២ ប្រូតេអ៊ីន

1. តើប្រូតេអ៊ីនជាអ្វី?
 - ប្រូតេអ៊ីន ជាប៉ូលីមែនៃ អាស៊ីតអាមីនេ ។
2. តើម៉ូណូមែររបស់ប្រូតេអ៊ីនជាអ្វី?
 - ម៉ូណូមែររបស់ប្រូតេអ៊ីន ជាអាស៊ីតអាមីនេ។
3. តើប្រូតេអ៊ីនមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចចំពោះសារពាង្គកាយ?
 - ជាសមាសធាតុគ្រឹះនៃជីវិតដែលបង្កើតនូវរាងសមាសភាពនៃសារពាង្គកាយ និងជាសម្ភារៈទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់រាងសារ។
4. តើប្រូតេអ៊ីនមានប៉ុន្មានទម្រង់? អ្វីខ្លះ?
 - ប្រូតេអ៊ីនមានបួនទម្រង់គឺ ទម្រង់ទី១ ទម្រង់ទី២ ទម្រង់ទី៣ និងទម្រង់ទី៤។
5. តើប្រូតេអ៊ីនទម្រង់ទី១មានលក្ខណៈដូចម្តេច?
 - ទម្រង់ទី១ របស់ប្រូតេអ៊ីនបង្កឡើងពីតំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេសុទ្ធ ។
6. ចូរពណ៌នាពីទម្រង់ទី២នៃប្រូតេអ៊ីន។
 - ប្រូតេអ៊ីនទម្រង់ទី២ កើតឡើងពីប្រូតេអ៊ីនទម្រង់ទី១ បត់បែនជាខ្សែខ្លោ ជាពីរប្រភេទគឺ៖ ផ្គត់ស្រប ឬ ផ្គត់រង្វេល និង ផ្គត់មិនស្រប ឬ ផ្គត់សន្លឹក ។
 - ចំណុចបង្វិលរបស់ច្រវាក់ប៉ូលីប៊ីបទីតគឺជាកាបូន(C)។
7. ចូរពណ៌នាអំពីប្រូតេអ៊ីនទម្រង់ទី៣។
 - ប្រូតេអ៊ីនទម្រង់ទី៣ កើតឡើងពីច្រវាក់ប្រូតេអ៊ីនដែលបត់បែនជាច្រើនផ្គត់ និងបង្កើតបានជាទម្រង់បីសណ្ឋាន(ទម្រង់ត្រីវិមាត្រ)។
 - ប៉ូលីប៊ីបទីតដែលមានអាស៊ីតអាមីនេនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នា ក្រោយពេលបត់បែនជាច្រើនផ្គត់ វាក៏នៅជាប់គ្នាវិញ។ បន្ទាប់មកវាក៏ក្លាយជាប្រូតេអ៊ីនគ្រាប់(មានគ្រាប់តូចៗ) ដែលមិនអាចឱ្យទឹកនៅជាប់គ្នាវិញ។ បន្ទាប់មកវាក៏ក្លាយជាប្រូតេអ៊ីនគ្រាប់(មានគ្រាប់តូចៗ) ដែលមិនអាចឱ្យទឹក



ជ្រាបចូលទៅក្នុងផ្នែកខាងក្នុងបាន។

- ប្រតិភូគ្រប់គ្រងមានទំហំធំ (លើសពី 200អាស៊ីតអាមីនេ) តែងតែផ្ទុកគ្រាប់តូចៗហៅថា ដូមេន។ (ដូមេន ជាអង្គតំណែងមានទម្រង់ជាក់លាក់ ហើយតែងតែមាននាទីយថាប្រភេទ)។

8. ចូរពណ៌នាអំពីប្រតិភូទម្រង់ទី៨។

- ប្រតិភូទម្រង់ទី៨ ជាច្រវាក់ប៉ូលីប៊ីបទីតដែលកើតឡើងពីច្រវាក់ប៉ូលីប៊ីបទីត៣ ឬ៨ម៉ូលេគុល ឡើងទៅ (ជាហេតុធ្វើឱ្យវាកាន់តែសំប្រាំង)។

9. ចូរប្រៀបធៀបផ្គត់ស្រប(ផ្គត់រង្វេល α) និងផ្គត់មិនស្រប (ផ្គត់សន្លឹក β)របស់ប្រតិភូ។

- លក្ខណៈដូចគ្នា៖
 - ជាទម្រង់ទី២នៃប្រតិភូ។
 - ជាច្រវាក់ប៉ូលីប៊ីបទីត
 - មានសភាពរឹងមាំដោយសារសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនដែលភ្ជាប់រវាងអាតូម អ៊ីដ្រូសែននៃបណ្តុំ អាមីន និងអុកស៊ីសែននៃបណ្តុំកាបូកស៊ីល។

លក្ខណៈខុសគ្នា

ផ្គត់ស្រប(ផ្គត់រង្វេល α)	ផ្គត់មិនស្រប (ផ្គត់សន្លឹក β)
• ជាច្រវាក់ប៉ូលីប៊ីបទីតដែលរុំជារង្វេល • ច្រវាក់អាស៊ីតអាមីនេតម្រៀបតាមទិសដៅតែមួយ • មានទម្រង់ងាយ • មានសភាពមិនសូវរឹងមាំ	• ជាច្រវាក់ប៉ូលីប៊ីបទីត ដែលបត់ចុះបត់ឡើងជាច្រើនផ្គត់ បង្កើតបានជាសន្លឹកតម្រៀបគ្នា • ច្រវាក់អាស៊ីតអាមីនេតម្រៀបតាមទិសដៅផ្ទុយគ្នា • មានទម្រង់សំប្រាំង • មានសភាពរឹងមាំជាង។

10. ហេតុអ្វីបានជាគេថាផ្គត់មិនស្រប រឹងមាំជាងផ្គត់ស្រប?

- ផ្គត់មិនស្រប មានភាពរឹងមាំជាងផ្គត់ស្រប ព្រោះច្រវាក់ប៉ូលីប៊ីបទីតតម្រៀបគ្នាទៅតាមទិសដៅផ្ទុយគ្នា។ ទិសដៅតម្រៀបរបស់ច្រវាក់ប៉ូលីប៊ីបទីត ធ្វើឱ្យទម្រង់នេះកាន់តែសំប្រាំង។



11. តើប្រូតេអ៊ីនមាននាទីអ្វីខ្លះ?

- ប្រូតេអ៊ីនមាននាទីជាច្រើនដូចជា កាតាលីករ ប្រូតេអ៊ីនទម្រង់ អ្នកធ្វើចលនា អ្នកការពារ អ្នកតម្រូវ និងអ្នកដឹកនាំ។

12. តើដូមេនជាអ្វី?

- ដូមេន គឺជាគ្រាប់តូចៗក្នុងប្រូតេអ៊ីនទម្រង់ទី៣ និងមាននាទីយថាប្រភេទ។

13. ហេតុអ្វីបានជាគេថាប្រូតេអ៊ីនជាកាតាលីករ?

- ប្រូតេអ៊ីនមាននាទីជាកាតាលីករ (អង់ស៊ីម) ព្រោះចូលរួមក្នុងលំនាំនៃការរំលាយអាហារ និងក្នុងប្រតិកម្មគីមីផ្សេងៗ ដោយបង្កើនល្បឿនប្រតិកម្មគីមីក្នុងសារពាង្គកាយ។ វាចាប់យក ថាមពល និងធ្វើជីវសំយោគ។

14. ហេតុអ្វីបានជាគេថាប្រូតេអ៊ីនជាអ្នកទ្រទ្រង់សារពាង្គកាយ?

- ព្រោះវាជាសមាសធាតុចម្បងក្នុងការភ្ជាប់ជាលិកានិងធ្វើឱ្យជាលិកាក្នុងសារពាង្គកាយមានភាពយឺត។
- ឧទាហរណ៍៖ កេរ៉ាទីន (Keratin) ជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនដែលជួយឱ្យសក់ និងក្រចកមានភាពស្វិត។
 - កូឡាសែន (Collagen) ជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនដែលជួយឱ្យជាលិកាសន្លានមានភាពស្វិត ។
 - អេឡាស្ទីន (Elastin) ជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនដែលជួយឱ្យសរសៃឈាមស្រួកមានភាពយឺត និងស្វិត ។

15. តើប្រូតេអ៊ីនក្នុងជាលិកាសន្លានមានឈ្មោះអ្វី?

- ប្រូតេអ៊ីនក្នុងជាលិកាសន្លាន មានឈ្មោះកូឡាសែន។

16. តើប្រូតេអ៊ីនដែលធ្វើឱ្យជាលិកានៃសារពាង្គកាយមានភាពយឺតមានឈ្មោះអ្វី?

- មានឈ្មោះអេឡាស្ទីន។

17. ហេតុអ្វីបានជាគេថាប្រូតេអ៊ីនជាអ្នកធ្វើចលនា?

- ប្រូតេអ៊ីនមាននាទីជា អ្នកធ្វើចលនា ព្រោះប្រូតេអ៊ីន អាក់ទីន ទុយប៊ុយលីន និងប្រូតេអ៊ីនផ្សេងទៀត ក្នុងស៊ីតូប្លាសបង្កើតជាគ្រោងឆ្អឹងកោសិកា ធ្វើសកម្មភាពក្នុងការធ្វើចំណែកកោសិកា។ វាដឹកនាំសារធាតុចូលនិងចេញពីកោសិកា រួមទាំងចលនារបស់គោលិកាផងដែរ។




18. ដូចម្តេចដែលហៅថាអិចសូស៊ីតូស?

- អិចសូស៊ីតូសជាការដឹកនាំសារធាតុចេញពីកោសិកា។

19. ដូចម្តេចដែលហៅថាអង់ដូស៊ីតូស?

- អង់ដូស៊ីតូស ជាការដឹកនាំសារធាតុចូលក្នុងកោសិកា។



20. ហេតុអ្វីបានជាគេថាប្រូតេអ៊ីនជាអ្នកការពារ? ចូរលើកឧទាហរណ៍។

- ប្រូតេអ៊ីនមាននាទីជាអ្នកការពារ(អង់ទីករ)ព្រោះវាអាចការពាររាងកាយប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតចូលនៃមេរោគនៅពេលមានរបួស ការពារការបាត់បង់ឈាមពេលដាច់សរសៃឈាមដោយធ្វើឱ្យឈាមកក ។
- ឧទាហរណ៍៖ កេរ៉ាទីន ជាប្រូតេអ៊ីនមាននៅក្នុងស្បែក និងក្រចក។
អង់ទីករ ជាប្រូតេអ៊ីនដែលផលិតដោយឡាផូស៊ីតូសម្រាប់សម្លាប់មេរោគ។
ត្រាំប៊ីន និងភីប្រីណូសែន ជាប្រូតេអ៊ីនដែលផលិតឡើងនៅពេលមានរបួស
ការពារកុំឱ្យមានការបាត់បង់ឈាម។

21. តើប្រូតេអ៊ីនដែលមាននាទីការពារការបាត់បង់ឈាមមានឈ្មោះអ្វី?

- ប្រូតេអ៊ីនដែលមាននាទីការពារការបាត់បង់ឈាមមានឈ្មោះ ភីប្រីណូសែន និង ត្រាំប៊ីន។

22. តើកេរ៉ាទីនជាអ្វី ?

- កេរ៉ាទីនជាប្រូតេអ៊ីនដែលមាននៅក្នុងជាលិកាអេពីតេល្យូមស្បែក។

23. តើកេរ៉ាទីនមាននាទីជាអ្វី?

- កេរ៉ាទីន មាននាទីការពារសារពាង្គកាយប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតចូលនៃមេរោគ។



24. ហេតុអ្វីបានជាគេថាប្រូតេអ៊ីនជាអ្នកតម្រូវ?

- ប្រូតេអ៊ីនមាននាទីជាអ្នកតម្រូវ (អរម៉ូន) ព្រោះវាជាប្រូតេអ៊ីនដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រពេញអង់ដូគ្រីន។ អរម៉ូនក្នុងកោសិកាយថាប្រភេទប្រែប្រួលទៅតាម នាទីរបស់ កោសិកា។
- ឧទាហរណ៍៖ អរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន អរម៉ូនលូតលាស់...។
- អរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន និងគ្រួសារក្រុមត្រូវបានផលិតដោយលំពែង។ វាមាននាទីតម្រូវគ្រួសារក្រុសក្នុងឈាម។ អរម៉ូនលូតលាស់មាននាទីឆ្លាចកោសិកាឱ្យលូតលាស់។

25. ហេតុអ្វីបានជាគេថាប្រូតេអ៊ីនជាអ្នកដឹកនាំ?

- ប្រូតេអ៊ីនមាននាទីជាអ្នកដឹកនាំ ព្រោះវាដឹកនាំម៉ូលេគុល ឬអ៊ីយ៉ុងនៃសារធាតុផ្សេងៗចូលក្នុងកោសិកា ។
- ឧទាហរណ៍៖ បើប៉ូប្រូតេអ៊ីនដឹកនាំលីពីត អេម៉ូក្លូប៊ីនដឹកនាំអុកស៊ីសែន។

26. តាមទម្រង់របស់ប្រូតេអ៊ីន តើគេចែកប្រូតេអ៊ីនជាប៉ុន្មានក្រុម? អ្វីខ្លះ?

- គេចែកប្រូតេអ៊ីនជាពីរក្រុមគឺ ប្រូតេអ៊ីនសរសៃ និងប្រូតេអ៊ីនគ្រាប់។

27. តើប្រូតេអ៊ីនសរសៃមាននាទី និងលក្ខណៈដូចម្តេច?

- មាននាទីជាអ្នកការពារ ជាអ្នកធ្វើចលនា និងជាប្រូតេអ៊ីនទម្រង់។
- ជាម៉ូលេគុលវែងៗ មិនរលាយក្នុងទឹក ហើយស្ងួត ។
- មាននៅក្នុង ស្បែក សក់ ក្រចក ។

28. តើប្រូតេអ៊ីនគ្រាប់មាននាទី និងលក្ខណៈដូចម្តេច?

- ប្រូតេអ៊ីនគ្រាប់ មាននាទីជាអង់ស៊ីម អង់ទីករ អេម៉ូក្លូប៊ីន និង អាត់ប៊ុយមីន។
- វាជាម៉ូលេគុលរាងមូលតូចៗ ហើយរលាយក្នុងទឹក។
(អង់ស៊ីមស្ទើរតែទាំងអស់មានទម្រង់ជាគ្រាប់) ។

29. តាមសមាសធាតុផ្សំរបស់ប្រូតេអ៊ីន តើគេចែកប្រូតេអ៊ីនជាប៉ុន្មានក្រុម? អ្វីខ្លះ?

- គេចែកប្រូតេអ៊ីនជាពីរក្រុមគឺ ប្រូតេអ៊ីនងាយ និងប្រូតេអ៊ីនសាំញ៉ាំ។

30. តើប្រូតេអ៊ីនងាយជាអ្វី?

- ប្រូតេអ៊ីនងាយ ជាប្រូតេអ៊ីនដែលផ្សំឡើងពីអាស៊ីតអាមីនេសុទ្ធ។



38. តើចលនាមេកានិចបែបណាដែលធ្វើឱ្យប្រូតេអ៊ីនត្រូវបានបាត់បង់គុណភាព? ហេតុអ្វី?

- ការកូរ ឬកិនធ្វើឱ្យប្រូតេអ៊ីនត្រូវបានបាត់បង់គុណភាព ព្រោះវាអាចបង្អាក់កម្លាំងបង្កើនទម្រង់ប្រូតេអ៊ីន។

39. ហេតុអ្វីបានជាអំបិលធ្វើឱ្យប្រូតេអ៊ីនត្រូវបានបាត់បង់គុណភាព?

- ព្រោះប្រូតេអ៊ីនសរសៃមិនរលាយក្នុងទឹក ប៉ុន្តែបើគេបន្ថែមអំបិលតែបន្តិច វានឹងធ្វើឱ្យមានកំនើននូវភាពរលាយក្នុងទឹក។

40. ហេតុអ្វីបានជាសាប៊ូធ្វើឱ្យប្រូតេអ៊ីនត្រូវបានបាត់បង់គុណភាព?

- ព្រោះសាប៊ូអាចបង្អាក់ភាពបត់បែនរបស់ប្រូតេអ៊ីនជាហេតុធ្វើឱ្យច្រវាក់ប៉ូលីប៊ីបទីតរលាយ។

41. ដើម្បីសំយោគប្រូតេអ៊ីន តើកោសិកាទទួលបានអាស៊ីតអាមីនេមកពីណា?

- កោសិកាទទួលបានមកពីការបំបែកប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងអាហារ។

42. ចំពោះប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីខាងក្រៅ(អាហារ) ក្រោយពេលចូលក្នុងសារពាង្គកាយ តើវានៅតែរក្សាយថាប្រភេទរបស់វាដែរឬទេ?

- ទេ វាត្រូវបានបាត់បង់យថាប្រភេទរបស់វា ព្រោះវាត្រូវបំបែកជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងប្រដាប់រំលាយអាហារ ក្រោមអំពើរបស់អង់ស៊ីមរហូតដល់ក្លាយជាអាស៊ីតអាមីនេ។ បន្ទាប់មកអាស៊ីតអាមីនេត្រូវប្រាប់ពីភ្នាសពោះវៀនតូចទៅកាន់ចរន្តឈាម និងដឹកនាំចូលទៅក្នុងកោសិកាដើម្បីសំយោគជាប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទថ្មីរបស់កោសិកានីមួយៗដោយផ្ទាល់សម្រាប់សារពាង្គកាយ។

43. ចូររៀបរាប់លក្ខណៈខុសគ្នារវាងប្រូតេអ៊ីនគ្រាប់ និងប្រូតេអ៊ីនសរសៃ។

- លក្ខណៈខុសគ្នារវាងប្រូតេអ៊ីនគ្រាប់ និងប្រូតេអ៊ីនសរសៃ៖

ប្រូតេអ៊ីនគ្រាប់	ប្រូតេអ៊ីនសរសៃ
• ជាម៉ូលេគុលរាងមូលតូចៗ • រលាយក្នុងទឹក • មាននាទីជាអង់ស៊ីម ជាអ្នកដឹកនាំ ជាអង់ទីករ	• ជាម៉ូលេគុលវែង • មិនរលាយក្នុងទឹក • មាននាទីអ្នកការពារ ជាអ្នកធ្វើចលនា ជាប្រូតេអ៊ីនទម្រង់



ជំពូក៤ នាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីនក្នុងសារពាង្គកាយ

មេរៀនទី៣ អង់ស៊ីម

1. តើអង់ស៊ីមជាអ្វី?

- អង់ស៊ីម គឺជាកាតាលីករជីវៈដែលជួយដល់ម្រុញល្បឿនប្រតិកម្មគីមីជីវៈផ្សេងៗ។

2. ក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ តើថាមពលអ្វីដែលដល់ម្រុញល្បឿនប្រតិកម្មគីមី?

- ថាមពលដែលដល់ម្រុញល្បឿនប្រតិកម្មគីមីក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ គឺកម្ដៅ។

3. ហេតុអ្វីបានជានៅពេលក្ដៅខ្លាំង ប្រតិកម្មគីមីប្រព្រឹត្តទៅបានលឿន?

- ព្រោះចលនានៃការប៉ះទង្គិចគ្នារបស់ម៉ូលេគុលកាន់តែកើនឡើង។

4. តើគេប្រើអាចប្រើវិធីអ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើនល្បឿនប្រតិកម្មគីមី?

- គេប្រើកំហាប់ប្រតិករ ឬកាតាលីករអសរីរាង្គ។

5. ក្នុងការពិសោធន៍ ប្រតិកម្មគីមីរបស់ប៉ូតាស្យូមក្លរ៉ាត តើអ្នកសង្កេតឃើញដូចម្តេច?

- ក្នុងប្រតិកម្មគីមីរបស់ប៉ូតាស្យូមក្លរ៉ាត៖ កាលណាគេដុតប៉ូតាស្យូមក្លរ៉ាតឱ្យក្ដៅខ្លាំង ដោយបន្ថែមម៉ង់កាណែសអុកស៊ីត គេបានប៉ូតាស្យូមក្លរ៉ាត និងអុកស៊ីសែនដែលរាយចេញ។ ប៉ុន្តែបើគេប្រើសីតុណ្ហភាពទាប វាគ្រាន់តែរលាយប៉ូតាស្យូម តែមិនបញ្ចេញអុកស៊ីសែនទេ។

6. តើម៉ង់កាណែសអុកស៊ីតជាអ្វី?

- ម៉ង់កាណែសអុកស៊ីតជាកាតាលីករអសរីរាង្គ។

7. ក្នុងការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនណា តើអ្នកសង្កេតឃើញដូចម្តេច?

- ទឹកអុកស៊ីសែនណា ជាសារធាតុពុល។ បើគេដាក់អង់ស៊ីមក្នុងទឹកអុកស៊ីសែនណា នោះវានឹងប្រែទៅជាសារធាតុមិនពុលវិញ។

8. នៅក្នុងរបបអាហាររបស់យើង ហេតុអ្វីបានជាត្រូវការអង់ស៊ីមទៅបំបែកម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន ខ្លាញ់ និងអាមីឌីង?

- ព្រោះម៉ូលេគុលទាំងនោះ ជាម៉ូលេគុលធំៗ មិនអាចជ្រាបតាមភ្លាសកោសិកាបានទេ។ ដូចនេះដើម្បីជ្រាបតាមភ្លាសកោសិកាបាន ត្រូវបំបែកជាសារធាតុងាយ តូចៗដែលអាចរលាយក្នុងទឹក



ដោយមានជំនួយពីអង្គស៊ីម។

9. តើគេហៅឈ្មោះអង្គស៊ីមបានត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើកត្តាអ្វីខ្លះ?

- ដោយផ្អែកលើកត្តាពីរបីយ៉ាងគឺ៖
 - យថាប្រភេទនៃកាតាលីករដែលជម្រុញល្បឿនប្រតិកម្ម
 - ផ្នែកលើស៊ីបស្រោតដែលបញ្ចប់ដោយពាក្យ **អាស**។

10. តើស៊ីបស្រោតជាអ្វី?

- ស៊ីបស្រោត ជាម៉ូលេគុលដែលអង្គស៊ីមមានអំពើទៅលើ។

11. ចូររកឧទាហរណ៍ឈ្មោះអង្គស៊ីម និងស៊ីបស្រោតឱ្យបាន១០។

អង្គស៊ីម	ស៊ីបស្រោត	អង្គស៊ីម	ស៊ីបស្រោត
• អាមីឌីង	➢ អាមីឡាស	• ម៉ាល់តូស	➢ ម៉ាល់តាស
• លីពីត	➢ លីប៉ាស	• ឡាក់តូស	➢ ឡាក់តាស
• ប្រូតេអ៊ីន	➢ ប្រូតេអាស	• សាករ៉ូស	➢ សាករ៉ាស
• ផូស្វាត	➢ ផូស្វាតាស	• អាស៊ីតរីបូសុយក្លេអ៊ីត	➢ អាស៊ីតរីបូសុយក្លេអាស
• ស្លេបុយឡូស	➢ ស្លេបុយឡាស	• ប៊ុបទីត	➢ ប៊ុបទីដាស
• អ៊ុយរេ	➢ អ៊ុយរេអាស		

12. ហេតុអ្វីបានជាគេថាអង្គស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទ ? ចូរលើកឧទាហរណ៍។

- បានជាគេថាអង្គស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទ ព្រោះអង្គស៊ីមនីមួយៗមានអំពើតែទៅលើ ស៊ីបស្រោតមួយប៉ុណ្ណោះ។
- ឧទាហរណ៍៖ អាមីឡាសបំបែកតែអាមីឌីងទេ គឺមិនអាចបំបែកលីពីតបានទេ។
លីប៉ាសបំបែកតែលីពីត មិនអាចបំបែកម៉ាល់តូសទេ។ ម៉ាល់តាស បំបែកតែម៉ាល់តូស។

13. ហេតុអ្វីបានជាគេថាសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងសារពាង្គកាយមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេ បើគ្មានអង្គស៊ីម?

- ព្រោះក្នុងសារពាង្គកាយមានប្រតិកម្មគីមីជីវៈជាច្រើន ហើយប្រតិកម្មគីមីទាំងនោះ ត្រូវការកម្ដៅ ឬកំហាប់ប្រតិករដើម្បីបង្កើនល្បឿនប្រតិកម្មគីមីទាំងនោះ។ ប៉ុន្តែ ក្នុងសារពាង្គកាយយើងមិន



អាចប្រើកម្ដៅ ឬកំហាប់ប្រតិករ ឬកាតាលីករអស់វិទ្យាដូច្នេះ ដូចនេះត្រូវការអង់ស៊ីមទើបដំណើរការអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន។

14. តើគេធ្វើចំណែកថ្នាក់អង់ស៊ីមជាប៉ុន្មានក្រុម? អ្វីខ្លះ?

- គេធ្វើចំណែកថ្នាក់អង់ស៊ីមជាប្រាំមួយក្រុមគឺ៖ អុកស៊ីដូរេដិកតាស ត្រង់ស្ទ្រីវ៉ាស អ៊ីដ្រូឡាស លីយ៉ាស លីហ្គាស និងអ៊ីសូមេរ៉ាស។

15. តើអុកស៊ីដូរេដិកតាសជាអ្វី? មានថ្នាក់អង់ស៊ីមខ្លះ?

- អុកស៊ីដូរេដិកតាស ជាអង់ស៊ីមដែលចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មរេដុ ឬ អុកស៊ីដូរេដិកម្ម។
- មានថ្នាក់អង់ស៊ីមដូចជា៖ អុកស៊ីដាស ដេអ៊ីដ្រូសែនណាស អុកស៊ីសែនណាស ពែអុកស៊ីដាស រេដិកតាស និងអ៊ីដ្រូកស៊ីឡាស។

16. តើត្រង់ស្ទ្រីវ៉ាសជាអ្វី?

- ត្រង់ស្ទ្រីវ៉ាស ជាអង់ស៊ីមដែលចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មគីមីយថាប្រភេទ ដោយផ្ទេរម៉ូលេគុលពីបណ្តុំមួយទៅបណ្តុំមួយទៀត ដូចជាបណ្តុំអាមីន បណ្តុំកាបូកស៊ីល បណ្តុំមេទីល បណ្តុំផូស្វ័រីល...។

17. តើបុព្វបទសម្គាល់អង់ស៊ីមក្រុមត្រង់ស្ទ្រីវ៉ាសមានឈ្មោះអ្វី? ចូររកឧទាហរណ៍។

- បុព្វបទសម្គាល់អង់ស៊ីមក្រុមត្រង់ស្ទ្រីវ៉ាសមានឈ្មោះថា ត្រង់ស៊ី។
- ឧទាហរណ៍៖ ត្រង់ស៊ីកាបូកស៊ីឡាស។

18. តើអ៊ីដ្រូឡាសជាអ្វី?

- អ៊ីដ្រូឡាស ជាអង់ស៊ីមដែលចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីស ដោយបំបែកម៉ូលេគុលធំមួយ ឱ្យទៅជាម៉ូលេគុលតូចៗដោយទឹក និងអង់ស៊ីម។

19. តើលីយ៉ាសជាអ្វី? មានថ្នាក់អង់ស៊ីមខ្លះ?

- លីយ៉ាស ជាអង់ស៊ីមដែលចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មបំបែកទឹក កាបូនឌីអុកស៊ីត និងអាម៉ូញ៉ាក់។
- មានថ្នាក់អង់ស៊ីមដូចជា ដេអ៊ីដ្រាតាស និងខ្សែមីណាលីយ៉ាស។

20. តើអ៊ីសូមេរ៉ាសជាអ្វី? មានថ្នាក់អង់ស៊ីមខ្លះ?

- អ៊ីសូមេរ៉ាស ជាអង់ស៊ីមដែលជម្រុញប្រតិកម្មក្នុងម៉ូលេគុលដើម្បីរៀបចំម៉ូលេគុលជាថ្មីឡើងវិញ។



- មានថ្នាក់រងដូចជា អេពីមេរ៉ាស និងមុយតាស។

21. តើអេពីមេរ៉ាសជាអ្វី?

- អេពីមេរ៉ាស ជាអង់ស៊ីមដែលជម្រុញប្រតិកម្មក្នុងការរៀបចំបញ្ហាសន្ទនាអាតូមកាបូន។

22. តើមុយតាសជាអ្វី?

- មុយតាស ជាអង់ស៊ីមដែលជម្រុញប្រតិកម្មក្នុងម៉ូលេគុលដោយធ្វើឱ្យប្រែប្រួលនូវនាទីនៃបណ្តុំផ្សេងៗ។

23. តើលីហ្គាសជាអ្វី? មានថ្នាក់រងអ្វីខ្លះ?

- លីហ្គាស ជាអង់ស៊ីមដែលចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មបង្កើតសម្ព័ន្ធគីមីរវាងម៉ូលេគុលស៊ីបស្ត្រាតពីរ។
- ថ្នាក់រងមានសាំងតេតាស និងកាបូកស៊ីឡាស។

24. ហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថា អង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លា?

- អង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លា ព្រោះអង់ស៊ីមមួយចំនួនតូចអាចបង្កើនប្រតិកម្មគីមីបានមួយចំនួនធំ (អាចបំបែកស៊ីបស្ត្រាតបានរាប់លានក្នុង១វិនាទី)។

25. ហេតុអ្វីបានជាគេថាម៉ូលេគុល ស៊ីបស្ត្រាតអាចប្លែងទៅជាសារធាតុថ្មីបាន?

- ព្រោះក្នុងសារធាតុកាយ កាលណាមានប្រតិកម្មគីមី ថាមពលកើនឡើងរហូតដល់ចំណុចកំពូលមួយ ដែលធ្វើឱ្យស៊ីបស្ត្រាតត្រូវប្លែងទៅជាសារធាតុថ្មីបាន។

26. តើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើអង់ស៊ីម? ចូររៀបរាប់។

- កត្តាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើអង់ស៊ីមមានដូចជា សីតុណ្ហភាព ឥទ្ធិពលpH (អាស៊ីតខ្លាំង ឬបាសខ្លាំង) កំហាប់ស៊ីបស្ត្រាត និងកំហាប់អង់ស៊ីម។
- អង់ស៊ីមមានដំណើរការល្អ និងច្រើនរយៈពេលខ្លីក្នុងការរំលាយសារធាតុអ្វីមួយ ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (នៅចន្លោះពី 40°C -45°C)។ បើនៅសីតុណ្ហភាពទាបពេក(0°C) ឬលើសពី 45°C អង់ស៊ីមនឹងត្រូវបាត់បង់គុណភាព។
- កាលណាសូលុយស្យុង អាស៊ីតឬបាសខ្លាំងក៏ធ្វើឱ្យអង់ស៊ីមបាត់បង់គុណភាពដែរ។ ល្បឿនប្រតិកម្មគីមីកាន់តែកើនឡើង ប្រសិនបើអង់ស៊ីមកាន់តែខាប់ ឬកំហាប់ស៊ីបស្ត្រាតកើនឡើង។
- អង់ស៊ីមមួយម៉ូលេគុលមានអំពើទៅលើស៊ីបស្ត្រាតច្រើនម៉ូលេគុលក្នុងរយៈពេលតែមួយវិនាទី។



- អង់ស៊ីមក៏ត្រូវការកូអង់ស៊ីមដើម្បីជួយក្នុងប្រតិកម្មគីមីផ្សេងៗផងដែរ។ ប្រតិកម្មស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងសារពាង្គកាយសត្វតែជាប្រតិកម្មបញ្ចូលស្នូលទៅវិញទៅមក។

27. តើអង់ស៊ីមប្រភេទណាដែលត្រូវការសូលុយស្យុងបាសខ្សោយ?

- អង់ស៊ីមក្នុងពោះវៀនត្រូវការសូលុយស្យុងបាសខ្សោយ។

28. ហេតុអ្វីបានជាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេក ឬទាបពេក អង់ស៊ីមប្រែជាបាត់បង់គុណភាព?

- សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេក ឬទាបពេក អង់ស៊ីមប្រែជាបាត់បង់គុណភាព ព្រោះអង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីន។ កាលណាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេក ឬទាបពេក ចំណងប៊ុបទីតត្រូវរលាយ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនត្រូវផ្តាច់ ជាហេតុធ្វើឱ្យទម្រង់របស់ប្រូតេអ៊ីនប្រែប្រួល គឺមិនអាចមានសកម្មភាពជាកាតាលីករបាន។

29. ដូចម្តេចដែលហៅថាកូអង់ស៊ីម? ចូររកឧទាហរណ៍។

- កូអង់ស៊ីម ជាម៉ូលេគុលមិនមែនជាប្រូតេអ៊ីន។ វាចូលរួមជាមួយអង់ស៊ីមដើម្បីជម្រុញល្បឿនប្រតិកម្មគីមី។
- ឧទាហរណ៍: វីតាមីន B₁₂ ផ្សេន។

30. ចូរពណ៌នាអំពីលក្ខណៈរបស់អង់ស៊ីម។

- អង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនមានអំពើយថាប្រភេទ ។
- អង់ស៊ីមមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លា គឺអង់ស៊ីមមួយចំនួនតូចអាចបង្កើនល្បឿនប្រតិកម្មគីមីបានមួយចំនួនធំ (អាចបំបែកស៊ីបស្ត្រាតបានរាប់លានក្នុង១វិនាទី)។
- អង់ស៊ីមប្រែប្រួលទម្រង់ និងនាទី(បាត់បង់គុណភាព) ទៅតាមសីតុណ្ហភាព ឥទ្ធិពលpH (មជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតឬបាសខ្លាំង) និងកំហាប់ស៊ីបស្ត្រាត ។
- អង់ស៊ីមមួយចំនួនជាកាតាលីករដែលមានប្រតិកម្មបញ្ចូលស្នូលទៅវិញទៅមក ។
- អង់ស៊ីមមួយចំនួនត្រូវការកូអង់ស៊ីម (Co-Enzyme)។


31. ហេតុអ្វីបានជានៅកម្រិតpHតូចជាង7ឬធំជាង7 សកម្មភាពអាមីឡាសត្រូវថយចុះ?

- ព្រោះអាមីឡាសជាប្រូតេអ៊ីន ដូចនេះ មជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីត ឬបាសខ្លាំងធ្វើឱ្យសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរបស់ប្រូតេអ៊ីនត្រូវបង្អាក់ឬកាត់ផ្តាច់ ដែលនាំឱ្យបាត់បង់គុណភាព។



32. ហេតុអ្វីបានជាគេថាអង់ស៊ីមជាកាតាលីកែរដែលមានប្រតិកម្មបញ្ជ្រាស់ទៅវិញទៅមក?

- ព្រោះវាអាចបំប្លែងទៅជាសារធាតុថ្មី ហើយសារធាតុថ្មីនោះក៏អាចប្រែប្រួលទៅជាសារធាតុដើមវិញ។



33. ការពិសោធន៍ពីអត្តសញ្ញាណអង់ស៊ីម៖

- ក. គេចាក់ទឹកអុកស៊ីសែនណៅក្នុងកែវជ័រ ដែលមានថ្លើមសត្វរួចជាស្រេច។
តើគេសង្កេតឃើញពណ៌អ្វីកើតឡើងនៅក្នុងកែវជ័រនោះ? ហេតុអ្វី?
- ខ. គេចាក់សូលុយស្យុងទឹកមាត់ទៅក្នុងកែវជ័រ ដែលមានដាក់សូលុយស្យុងអាមីឌីងនៅក្នុងការពិសោធន៍ពីអង់ស៊ីមយថាប្រភេទ។ តើសូលុយស្យុងទឹកមាត់ផ្ទុកសូលុយស្យុងឈ្មោះអ្វី? និងមាននាទីដូចម្តេចក្នុងការពិសោធនេះ?
- ក. គេសង្កេតឃើញមានពពុះកើតឡើងនៅក្នុងកែវជ័រនោះ ព្រោះទឹកអុកស៊ីសែនណៅ ត្រូវបានបំបែក ដោយអង់ស៊ីមកាតាឡាសដែលមាននៅក្នុងថ្លើម ទៅជា អុកស៊ីសែន និងទឹក។
 - ខ. សូលុយស្យុងទឹកមាត់ផ្ទុកសូលុយស្យុងឈ្មោះ អង់ស៊ីមអាមីឡាស ដែលមាននាទីបំបែកអាមីឌីង។

34. ការពិសោធន៍ពីអត្តសញ្ញាណប្រូតេអ៊ីន៖

- គេដាក់សូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត (NaOH) 10% និងសូលុយស្យុងទង់ដែងស៊ុលផាត (CuSO₄) 0.5% ចំណុះ 3ml ដូចគ្នាទៅក្នុងកែវជ័រដែលមានសូលុយស្យុងអាស់ប៊ុយមីនចំណុះ 3ml ដែរ រួចក្រឡុកឱ្យសព្វ។
- ក. តើគេសង្កេតឃើញពណ៌អ្វីកើតឡើងនៅក្នុងកែវជ័រនោះ?
- ខ. តើគេប្រើសូលុយស្យុង 10% នៃសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត (NaOH) និងសូលុយស្យុងទង់ដែង ស៊ុលផាត (CuSO₄) ដើម្បីអ្វី?
- ក. នៅក្នុងកែវជ័រនោះ យើងសង្កេតឃើញពណ៌ស្វាយ។



- ខ. គេប្រើសូលុយស្យុង NaOH 10% ដើម្បីផ្ដាច់សម្ព័ន្ធចីបទីត ឬចំណង់ចីបទីត។ ហើយប្រើសូលុយស្យុង ទង់ដែងស៊ុលផាត (CuSO_4) 0.5% ដើម្បីបញ្ជាក់ថាមានវត្ថុមានប្រូតេអ៊ីន។
- ***សិស្សអាចឆ្លើយបានថា៖ គេប្រើសូលុយស្យុង NaOH 10% និងសូលុយស្យុងទង់ដែងស៊ុលផាត (CuSO_4) 0.5% ដើម្បីបញ្ជាក់ថាមានវត្ថុមានប្រូតេអ៊ីន (អត្តសញ្ញាណប្រូតេអ៊ីន)។

35. តើកត្តាបីដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើសកម្មភាពរបស់អង់ស៊ីមមានអ្វីខ្លះ?

- មានដូចជាកត្តា សីតុណ្ហភាព កត្តា pH កត្តាកំហាប់ស៊ុបស្ត្រាត និងកំហាប់អង់ស៊ីម។

36. តើម៉ូលេគុលស៊ុបស្ត្រាតមួយអាចប្លែងជាសារធាតុថ្មីបានដោយសារអ្វី?

- ម៉ូលេគុលស៊ុបស្ត្រាតមួយអាចប្លែងជាសារធាតុថ្មីបានដោយសារថាមពលឡើងដល់ចំណុចកំពូល នៅពេលអង់ស៊ីមជម្រុញល្បឿនប្រតិកម្មគីមី។

37. ហេតុអ្វីបានជាគេថាអង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទនៃអំពើរបស់វា?

- អង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទនៃអំពើរបស់វា ព្រោះអង់ស៊ីមមួយប្រភេទ មានអំពើទៅលើសារធាតុមួយប្រភេទ និងក្នុងប្រតិកម្មតែមួយយ៉ាងប៉ុណ្ណោះ។

38. ហេតុអ្វីបានជាសកម្មភាពអង់ស៊ីមត្រូវថយចុះ កាលណាសីតុណ្ហភាពលើស 45°C ?

- ព្រោះអង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីន។ កាលណាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេក ឬទាបពេក ចំណង់ចីបទីតត្រូវ រលាស់សម្ព័ន្ធអ៊ីស្ត្រេសត្រូវផ្ដាច់ ជាហេតុធ្វើឱ្យទម្រង់របស់ប្រូតេអ៊ីនប្រែប្រួល គឺមិនអាច មានសកម្មភាពជាកាតាលីករបាន។

39. ហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងកោសិកានៃសារពាង្គកាយមានអង់ស៊ីមច្រើនប្រភេទ?

- នៅក្នុងកោសិកានៃសារពាង្គកាយមានអង់ស៊ីមច្រើនប្រភេទ ព្រោះក្នុងកោសិកាមានរាបពាន់ប្រតិកម្មគីមីខុសៗគ្នា ហើយអង់ស៊ីមមួយមានអំពើលើប្រតិកម្ម តែមួយប្រភេទ។



ជំពូក៥ ព័ត៌មានសេនេទិច និងការលម្អៀងនៃសែន


មេរៀនទី១ ADNជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានសេនេទិច

1. តើព័ត៌មានសេនេទិចជាអ្វី? ស្ថិតនៅឯណា?

- ព័ត៌មានសេនេទិច ជាប្លង់សាងសង់ប្រូតេអ៊ីន ឬលក្ខណៈរបស់សារពាង្គកាយ។
- ព័ត៌មានសេនេទិចស្ថិតនៅក្នុងដៃឈ្មួញនៃកោសិកា។


2. តើបាក់តេរីម៉ូកូកជាអ្វី? មានរូបរាងប៉ុន្មានបែប? អ្វីខ្លះ

- ជាបាក់តេរីដែលបង្កជំងឺរលាកសួតដល់មនុស្ស។
- មានរូបរាងពីរបែបគឺ៖
 - រូបរាង S មានស្រោមហៅថា បាក់តេរី S បង្កជំងឺ។
 - រូបរាង R គ្មានស្រោម ហៅថា បាក់តេរី R មិនបង្កជំងឺ។



3. ចូររៀបរាប់ពីដំណើរការពិសោធន៍របស់លោកគ្រីកីត។

- លោកគ្រីកីតពិសោធដោយប្រើបាក់តេរី បង្កជំងឺរលាកសួត ជាមួយសត្វកណ្តុរ។
- គាត់សម្លាប់បាក់តេរី S ដោយកម្ដៅហើយ យកទៅលាយជាមួយបាក់តេរី R។ បន្ទាប់មក
- យកល្បាយនោះទៅចាក់ចូលកណ្តុរ។ កណ្តុរនោះ ក៏ស្លាប់ដោយជំងឺរលាកសួត ហើយមានផ្ទុក បាក់តេរី S មានជីវិត។





- សន្និដ្ឋាន៖ បាក់តេរី S បញ្ជូនសារធាតុមួយទៅឱ្យបាក់តេរី R ធ្វើឱ្យបាក់តេរី R មានលក្ខណៈ ថ្មីមួយ គឺអាចសំយោគស្រោមគ្នាយស្មើបាន ហើយបញ្ជូនលក្ខណៈថ្មីនេះទៅសន្តានក្រោយ។

4. ចូររៀបរាប់ពីដំណើរការពិសោធបស់លោកអាវ៉ារី។

- អាវ៉ារីទាញយក ADN ពីបាក់តេរី S តាមបច្ចេកទេសគីមី ហើយយកទៅលាយជាមួយបាក់តេរី R។ បន្ទាប់មក យកល្បាយនោះទៅចាក់ឱ្យកណ្តុរ។ កណ្តុរនោះងាប់ដោយសារជំងឺរលាកសួត។ ហើយឈាមរបស់វាមានបាក់តេរី S។
- សន្និដ្ឋាន៖ ADN របស់បាក់តេរី S លាយជាមួយបាក់តេរី R ធ្វើឱ្យបាក់តេរី R មានលក្ខណៈថ្មីមួយ គឺ អាចសំយោគស្រោម បង្កើតបានបាក់តេរី S។
- សារធាតុបំបែករបស់បាក់តេរី S ជា ADN។ បាក់តេរី R អាចសំយោគស្រោមគ្នាយស្មើបាន ព្រោះ វាទទួលយក ADN ពីបាក់តេរី S។
- ADN របស់បាក់តេរី S ផ្ទុកព័ត៌មានសេនេទិចដែលជាប្លង់សាងសង់ស្រោមរបស់បាក់តេរី S។
- ADN ជាទម្រង់ព័ត៌មានសេនេទិច។

5. ចូររៀបរាប់ពីដំណើរការពិសោធបស់ហ៊ីស៊ី និងអាស។



- ហ៊ីស៊ី និងអាស រៀបចំវីរុសជាពីរក្រុមដោយភ្ជាប់ស្ពាន់ផ័រវីរុសកម្ម 35 ទៅនឹងវីរុសមួយក្រុម ហើយមួយក្រុមទៀត ភ្ជាប់ផ្លូវវីរុសកម្ម 32។ គាត់យកវីរុសទាំងពីរក្រុមដាក់លើបាក់តេរី ហើយរងចាំឱ្យវីរុសបន្តពូជលើបាក់តេរី។ បន្ទាប់មកគាត់សង្កេតឃើញថាស្ពាន់ផ័រវីរុសកម្ម 35 នៅសល់ ឯផ្លូវវីរុសកម្ម 32 គ្មាននៅសល់ក្នុងវីរុសទេ។ គាត់សន្និដ្ឋានថា វីរុសបញ្ចូល ADN ទៅ ក្នុងបាក់តេរី ដូចនេះ ADN ជាអ្នកផ្ទុកព័ត៌មានសេនេទិច។

6. ចូរបកស្រាយគំនូរ ADN របស់វ៉ាត់សុន និងត្រីក។

- តាមវ៉ាត់សុន និងត្រីក ម៉ូលេគុល ADN ជាប៉ូលីមែរនៃនុយក្លេអូទីត។ វាកើតឡើងពីច្រវាក់នុយក្លេអូទីតពីរខ្សែស្របគ្នា រុំជារង្វង់ជុំវិញអ័ក្សមួយដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 2nm។ ក្នុងច្រវាក់ម្ខាងៗ នុយក្លេអូទីតភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធកូរ៉ាឡង់រឹងមាំរវាងអាស៊ីតផូស្វ័រិច នៃនុយក្លេអូទីតមួយទៅនឹងស្ករដេអុកស៊ីរីបូសនៃនុយក្លេអូទីតមួយទៀតដែលនៅជាប់គ្នា។ ច្រវាក់ទាំងពីររបស់ម៉ូលេគុល ADN ភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនខ្សោយ



រវាងបាសពីរបំពេញគ្នា គឺ AបំពេញT ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនពីរ ($A=T$) និងរវាងCបំពេញG ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបី ($C \equiv G$)។



7. តើម៉ូលេគុលADN ជាអ្វី?

- ម៉ូលេគុលADN ជាប៉ូលីមែរនៃនុយក្លេអូទីត។

8. តើនុយក្លេអូទីតជាអ្វី?

- នុយក្លេអូទីត ជាម៉ូណូមែរបស់ADN។

9. តើធាតុបង្ករបស់នុយក្លេអូទីតមានអ្វីខ្លះ?

- ធាតុបង្ករបស់នុយក្លេអូទីតមានដូចជា៖
 - ស្ករដេអុកស៊ីរីបូស ($C_5H_{10}O_4$) មួយម៉ូលេគុល
 - អាស៊ីតផូស្វ័រិច (H_3PO_4) មួយម៉ូលេគុល
 - បាសអាសូតមួយម៉ូលេគុល (A,T,C,G)។

10. តើនុយក្លេអូទីតរបស់ADNមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ? ហេតុអ្វី?

- នុយក្លេអូទីតរបស់ADNមាន4ប្រភេទ ដោយសារបាសអាសូតមាន៤ប្រភេទ។
- នុយក្លេអូទីតរបស់ADNទាំង4ប្រភេទមានដូចជា៖ នុយក្លេអូទីតអាដេនីន នុយក្លេអូទីតទីមីន នុយក្លេអូទីតស៊ីតូស៊ីន និងនុយក្លេអូទីតកាណីន។



11. តើប្រាសាទសតមានប៉ុន្មានក្រុម? អ្វីខ្លះ?

- ប្រាសាទសតមានពីរក្រុមគឺ ក្រុមពូជ (GនិងA)និងក្រុមពីរីមីឌីន (C និងT)។

12. តើក្នុងច្រវាក់នីមួយៗរបស់ADNភ្ជាប់គ្នាដោយសារអ្វី?

- ច្រវាក់នីមួយៗរបស់ADNភ្ជាប់គ្នាដោយសារសម្ព័ន្ធកូរ៉ាឡង់(សម្ព័ន្ធគីមី) រវាងអាស៊ីតផូស្វ័រិច (H_3PO_4) នៃនុយក្លេអូទីតមួយទៅនឹងស្ករដេអុកស៊ីរីបូស ($C_5H_{10}O_4$) នៃនុយក្លេអូទីតមួយទៀត។

13. តើច្រវាក់ទាំងពីររបស់ម៉ូលេគុលADNភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារអ្វី?

- ច្រវាក់ទាំងពីររបស់ម៉ូលេគុលADNភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនខ្សោយ រវាងប្រូតុងបំពេញគ្នា គឺ AបំពេញT ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនពីរ ($A=T$) និងរវាងCបំពេញG ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបី ($C\equiv G$)។

14. តើសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនជាសម្ព័ន្ធដូចម្តេច?

- ជាសម្ព័ន្ធខ្សោយ ព្រោះងាយដាច់ នៅពេលADNស្វ័យជំឡឺងទ្វេ និងសំយោគARNm។

15. តើក្នុងម៉ូលេគុលADNមានសម្ព័ន្ធអ្វីខ្លះ? តើសម្ព័ន្ធនីមួយៗកើតឡើងនៅកន្លែងណា?

តើសម្ព័ន្ធណាដែលងាយដាច់ជាងគេ នៅពេលស្វ័យជំឡឺងទ្វេ?

- ក្នុងម៉ូលេគុលADNមានសម្ព័ន្ធពីរគឺ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន និងសម្ព័ន្ធគីមី ។
- សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនកើតត្រង់ប្រូតុងបំពេញគ្នា។ សម្ព័ន្ធកូរ៉ាឡង់កើតត្រង់អាស៊ីតផូស្វ័រិចនៃនុយក្លេអូទីតមួយ និងស្ករដេអុកស៊ីរីបូសនៃនុយក្លេអូទីតមួយទៀតក្នុងច្រវាក់ម្ខាង។
- នៅពេលស្វ័យជំឡឺងទ្វេ សម្ព័ន្ធដែលងាយដាច់ជាងគេគឺ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន។

16. តើក្នុងកោសិកា ម៉ូលេគុលADNជាជណ្តើរមានរាងដូចម្តេច? ចូរប្រាប់។

- ម៉ូលេគុលADNជាជណ្តើររំលិល ឬរង្វង់ដែល១រង្វង់ស្មើនឹង3.4nmហើយមាន10 គូនុយក្លេអូទីត។ ប្រវែងពីនុយក្លេអូទីតមួយទៅនុយក្លេអូទីតមួយគឺ 0.34nm។

17. តើគោលការណ៍បំពេញប្រូតុងនៅពេលណាខ្លះ? រវាងម៉ូលេគុលណានិងម៉ូលេគុលណា?

- នៅពេលស្វ័យជំឡឺងទ្វេADNដោយAភ្ជាប់T និង Cភ្ជាប់G។
- នៅពេលចម្លងក្រុមពីADNទៅARNmដោយភ្ជាប់AនិងU ហើយ CនិងG។

18. ហេតុអ្វីបានជាគេថាADNជាទម្រង់មានស្ថេរភាព មិនមែនជាព័ត៌មានស្ថេរភាព?




- ព្រោះម៉ូលេគុលADNកើតពីតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតជាក់លាក់ ហើយតំណលំដាប់នេះហើយជាប្លង់ក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីន ឬសម្រាប់ការសាងសង់លក្ខណៈតំណពូជរបស់ភ្នាក់ងារ។

19. តើលក្ខណៈពិសេសរបស់ADNមានអ្វីខ្លះ?

- លក្ខណៈពិសេសរបស់ADNមានដូចជា៖
 - ឯកត្តៈក្នុងប្រភេទមួយមាន ADNខុសៗគ្នា ដោយសារតំណលំដាប់ (ចំនួន ប្រភេទ និង ទីតាំង) នុយក្លេអូទីតរបស់វា។
 - ឯកត្តៈក្នុងប្រភេទតែមួយ បរិមាណADNថេរជានិច្ច (ព្រោះចំនួនក្រូម៉ូសូមថេរ)។
 - បរិមាណADNប្រែប្រួលពីប្រភេទមួយទៅប្រភេទមួយទៀត (ព្រោះចំនួនក្រូម៉ូសូមប្រែប្រួល)។

20. តើស្វ័យដំឡើងទ្វេADNជាអ្វី?

- ស្វ័យដំឡើងទ្វេADN ជាបាតុភូតមួយដែលម៉ូលេគុលADNមួយបង្កើតដោយខ្លួនឯងនូវម៉ូលេគុលADNកូនពីរដែលដូចគ្នាបេះបិទ ហើយដូចគ្នាទៅនឹងម៉ូលេគុលADNមេ។



21. តើអង់ស៊ីមADNប៉ូលីមេរ៉ាសមាននាទីអ្វី?

- អង់ស៊ីមADNប៉ូលីមេរ៉ាសមាននាទីបើកច្រវាក់ម៉ូលេគុលADN ។
- ភ្ជាប់នុយក្លេអូទីតសេរីទៅនឹងនុយក្លេអូទីតច្រវាក់ម្ខាងៗរបស់ADNមេ។


22. ហេតុអ្វីបានជាគេថាស្វ័យដំឡើងទ្វេADNប្រព្រឹត្តទៅតាមរបៀបពាក់កណ្តាលរក្សាទុក?

- ព្រោះការស្វ័យដំឡើងទ្វេម៉ូលេគុលADN ច្រវាក់ទ្វេដ៏មួយៗផ្សំឡើងពីច្រវាក់ដែលត្រូវបាន

សំយោគថ្មីមួយ និងច្រវាក់ម្ខាងទៀតបានមកពីច្រវាក់ADNមេ។

23. តើចលនការស្វ័យជំឡើងទ្វេADNប្រព្រឹត្តទៅដូចម្តេចខ្លះ? ចូរប្រាប់។

- ជំហ្មងច្រវាក់ទាំងពីររបស់ADNចាប់ផ្តើមរលា
- ច្រវាក់ទាំងពីររបស់ADNមេត្រូវបែកចេញពីគ្នាដោយសារការផ្តាច់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនខ្សោយដែលភ្ជាប់បានទាំងពីរ។ ការផ្តាច់កើតឡើងព្រមគ្នានៅគ្រប់ចំណុចទាំងអស់។
- នុយក្លេអូទីតសេរី ដែលនៅក្នុងឈ្មោះទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងនុយក្លេអូទីតនៃច្រវាក់នីមួយៗ នៃម៉ូលេគុលADNមេ តាមគោលការណ៍បំពេញបាន A-T, C-G ។ ច្រវាក់នីមួយៗនៃម៉ូលេគុល ADNមេធ្វើជាពុម្ពគំរូសម្រាប់សំយោគច្រវាក់ម្ខាងទៀតនៃម៉ូលេគុលADNកូន មានន័យថា ADNកូននីមួយៗមានច្រវាក់ម្ខាងជារបស់ADNចាស់ ច្រវាក់ម្ខាងទៀតជាច្រវាក់ថ្មី។
- ដូចនេះស្វ័យជំឡើងទ្វេនេះប្រព្រឹត្តទៅតាមរបៀបពាក់កណ្តាលរក្សាទុក។ សំណុំប្រតិកម្មទាំងអស់ (ការផ្តាច់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន និងការភ្ជាប់នុយក្លេអូទីតសេរី) ស្ថិតនៅក្រោមអំពើរបស់អង់ស៊ីមថាប្រភេទ ADNប៉ូលីមេរ៉ាស ។



24. តើជំពាមស្វ័យជំឡើងទ្វេជាអ្វី?

- ជំពាមស្វ័យជំឡើងទ្វេ ជាតំបន់ដែលច្រវាក់ទ្វេADNញែកចេញពីគ្នាដែលបង្កើតបានជាសណ្ឋានដូចសម ឬជំពាម។ នៅពេលស្វ័យជំឡើងទ្វេ ចាប់ផ្តើមនៅត្រង់ប្រភពស្វ័យជំឡើងទ្វេ ជំពាមស្វ័យជំឡើងទ្វេពីរប្រព្រឹត្តទៅតាមបណ្តោយច្រវាក់ទ្វេរាងស្មើក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នា។



25. ក្រោយពេលស្វ័យជំនឿងទ្វេ ហេតុអ្វីបានជាADNកូនទាំងពីរដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងម៉ូលេគុលADNមេ ?

- បានជាADNកូនទាំងពីរដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងម៉ូលេគុលADNមេ ព្រោះពេលស្វ័យជំនឿងទ្វេ ច្រវាក់ទាំងពីរនៃADNមាននាទីជាពុម្ពគំរូ។ នុយក្លេអូទីតសេរីរត់ទៅ បំពេញលើច្រវាក់នីមួយៗ របស់ម៉ូលេគុលADNមេ តាមគោលការណ៍បំពេញបាស A-T, C-G ឬ (A=T, C≡G)។ នាំឱ្យ គេបានADNកូនពីរដែលកូននីមួយៗមាន ច្រវាក់ម្ខាងជាច្រវាក់ADNមេ (ច្រវាក់ពុម្ព) ឯច្រវាក់ ម្ខាងទៀតជាច្រវាក់កើតថ្មី គឺដូចគ្នាបេះបិទ ហើយដូចADNមេទៀត។

26. ក្រោយស្វ័យជំនឿង តើADNកូនដូចADNមេត្រង់ណា?

- ក្រោយស្វ័យជំនឿងទ្វេ ADNកូនដូចADNមេត្រង់ តំណលំដាប់នុយក្លេអូទីត (ចំនួន ទីតាំង និងប្រភេទនុយក្លេអូទីត)។

27. ក្រោយស្វ័យជំនឿងទ្វេ តើADNកូនទាំងពីរដូចគ្នាត្រង់ណា?

- ក្រោយស្វ័យជំនឿងទ្វេ ADNកូនទាំងពីរដូចគ្នា ចំនួននុយក្លេអូទីតស្មើគ្នា ប្រវែងស្មើគ្នា ប្រភេទនុយក្លេអូទីត និងតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីត។

28. សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនជាសម្ព័ន្ធដែលខ្សោយ ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាសម្ព័ន្ធនេះអាចភ្ជាប់ច្រវាក់នុយក្លេអូទីតទាំងពីររបស់ម៉ូលេគុលADNបាន?


- ទោះបីជាសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនជាសម្ព័ន្ធខ្សោយ ប៉ុន្តែវាអាចភ្ជាប់ច្រវាក់នុយក្លេអូទីតរបស់ADNបានដោយសារម៉ូលេគុលADNនីមួយៗកើតឡើងពីនុយក្លេអូទីតរាប់ម៉ឺនទៅរាប់លានដែលជាហេតុធ្វើឱ្យសម្ព័ន្ធនេះមានកាន់តែច្រើន និងក្លាយជារឹងមាំអាចធានាភ្ជាប់ច្រវាក់ទាំងពីររបស់ADNបាន។

29. ហេតុអ្វីបានជាក្នុងកោសិកាបន្តពូជ បរិមាណADNមានតែពាក់កណ្តាលនៃបរិមាណADNក្នុងកោសិកាលូតលាស់?

- ក្នុងកោសិកាបន្តពូជ បរិមាណADNមានតែពាក់កណ្តាលនៃបរិមាណADNក្នុងកោសិកាលូតលាស់ ព្រោះកោសិកាបន្តពូជត្រូវឆ្លងកាត់ចំណែកមេយ៉ូសែដែលជាចលនការបន្ថយក្រុមសូមពី2nទៅn។

30. តើជំនឿងទ្វេADNក្នុងប្រការីយ៉ូតមានលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះ?

- ជំនឿងទ្វេADNក្នុងប្រការីយ៉ូតចាប់ផ្តើមចេញពីចំណុចតែមួយ រួចព្រែកចេញទៅតាមទិសដៅពីរផ្ទុយគ្នារហូតដល់ចំណុចដើមវិញ។




31. តើដំឡើងទ្វេADNក្នុងអីការីយ៉ូតមានលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះ?

- ដំឡើងទ្វេADNក្នុងអីការីយ៉ូតចាប់ផ្តើមចេញពីចំណុចជាច្រើន រួចញែកចេញទៅតាមទិសដៅពីរផ្ទុយគ្នារហូតជួបគ្នា។

32. តើស្វ័យដំឡើងទ្វេADNមាននាទីអ្វី?

- ស្វ័យដំឡើងទ្វេADNមាននាទី៖
 - វាបំប៉នការដំឡើងទ្វេក្រុមម៉ូសូម។
 - វាបំប៉នចំនួន និងរូបរាងក្រុមម៉ូសូមឱ្យនៅដដែលក្រោយចំណែកកោសិកា។
 - រក្សាព័ត៌មានសេនេទិចឱ្យនៅថេរដដែលឆ្លងកាត់ជំនាន់កោសិកា។



33. ចូរប្រៀបធៀបដំឡើងទ្វេADNក្នុងប្រូការីយ៉ូត និងដំឡើងទ្វេADNក្នុងអីការីយ៉ូត។

- ចំណុចដូចគ្នា៖ ម៉ូលេគុលADNមេមួយបង្កើតដោយខ្លួនឯងនូវម៉ូលេគុលADNកូនពីរដែលដូចគ្នា



បេះបិទ ហើយដូចគ្នាទៅនឹងម៉ូលេគុលADNមេ។

ចំណុចខុសគ្នា

ជំនឿងទ្វេADNក្នុងប្រការីយ៉ូត	ជំនឿងទ្វេADNក្នុងអ៊ីការីយ៉ូត
.ចាប់ផ្តើមចំណុចតែមួយរួចប្រែក្លាយទៅជាមូលដ្ឋាន .មានសភាពលឿន ក្នុងល្បឿនប្រហែល 10^6 គូបាសក្នុង1នាទី។ .ចំណាយពេលប្រហែល40នាទី។	.ចាប់ផ្តើមចំណុចជាច្រើនរួចប្រែក្លាយទៅជាមូលដ្ឋាន .មានសភាពយឺតក្នុងល្បឿនប្រហែល 500 ទៅ 5000 គូបាសក្នុង1នាទី។ .ចំណាយពេលច្រើនម៉ោង។

34. ហេតុអ្វីបានជានុយក្លេអូទីតតែ៨ប្រភេទអាចបង្កើតបានម៉ូលេគុលADNខុសគ្នាច្រើនរាប់ម៉ឺនអស់?

- ព្រោះម៉ូលេគុលADNនីមួយៗកើតពីនុយក្លេអូទីតរាប់ម៉ឺនដែលតម្រៀបគ្នាទៅតាមតំណលំដាប់ នុយក្លេអូទីតជាក់លាក់។ ម៉ូលេគុលADNនីមួយៗខុសគ្នាដោយសារចំនួននុយក្លេអូទីត ប្រភេទនុយក្លេអូទីត និងទីតាំងនុយក្លេអូទីត។

35. បរិមាណADNក្នុងកោសិកាលំពែងរបស់មនុស្សមាន $7.3 \times 10^{-12}g$ ។ តើក្នុងកោសិកាប្រសាទ កោសិកាស្បែក និងកាម៉ែតមានបរិមាណADNប៉ុន្មាន? ចូរបញ្ជាក់អំណះអំណាងរបស់អ្នក។


- កោសិកាប្រសាទនិងកោសិកាស្បែកមានបរិមាណADNចំនួន $7.3 \times 10^{-12}g$ ពីព្រោះវាកោសិកាឌីប្លូអ៊ីតកើតចេញពីស៊ីក្លូតឌីប្លូអ៊ីតដែលកើតចេញពីស៊ីក្លូតធ្វើមីតូស។
- កាម៉ែត មានបរិមាណADNចំនួន $3.65 \times 10^{-12}g$ ពីព្រោះវាកោសិកាអាប្លូអ៊ីត ដោយវាបានឆ្លងកាត់ចលនការមេយ៉ូសដែលបានបន្ថយចំនួនក្រូម៉ូសូមពី $2n$ ទៅ n ។ ដូចនេះADNដែលជាធាតុបង្កក្រូម៉ូសូមត្រូវកាត់បន្ថយពាក់កណ្តាលដែរ គឺសមាមាត្រទៅនឹងចំនួនក្រូម៉ូសូម។

ជំពូក៥ ព័ត៌មានសេនេទិច និងការសម្តែងនៃសែន

មេរៀនទី២ ការសម្តែងចេញនៃសែន

1. តើសែនជាអ្វី?

- សែន(Gene)ជាអង្គតំបន់មួយរបស់ADNស្ថិតនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការសម្តែងប្រូតេអ៊ីនដែលនៅក្នុងស៊ីតូប្លាស្ម។



2. តើរីបូនុយក្លេអូទីតជាអ្វី? មានធាតុបង្កអ្វីខ្លះ?

- រីបូនុយក្លេអូទីត ជាម៉ូណូមែ ឬធាតុបង្ករបស់អាស៊ីតរីបូនុយក្លេអ៊ីច (ARN)។
- វាមានធាតុបង្កបីគឺ៖
 - ស្កររីបូសមួយម៉ូលេគុល ($C_5H_{10}O_5$)
 - អាស៊ីតផូស្វ័រិចមួយម៉ូលេគុល និង
 - បាសអាសូតមួយម៉ូលេគុល (អាដេនីនA អ៊ុយរ៉ាស៊ីលU ស៊ីតូស៊ីនC និងកាសីនG)។

3. តើរីបូនុយក្លេអូទីតមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ? ហេតុអ្វី?

- រីបូនុយក្លេអូទីតមាន៤ប្រភេទគឺ៖ រីបូនុយក្លេអូទីតអាដេនីន(A) រីបូនុយក្លេអូទីតអ៊ុយរ៉ាស៊ីល(U) រីបូនុយក្លេអូទីតកាសីន (G) និង រីបូនុយក្លេអូទីតស៊ីតូស៊ីន(C)។



- វីបូនុយក្លេអូទីត (ឬនុយក្លេអូទីតរបស់ARN) មានបួនប្រភេទ ព្រោះARNមានបាសអាសូតចំនួន 4 ប្រភេទគឺ A U C និងG។

4. តើម៉ូលេគុលARNមានទម្រង់ដូចម្តេច?

- ម៉ូលេគុលARNមានទម្រង់ជាច្រវាក់វីបូនុយក្លេអូទីតមួយខ្សែ (ច្រវាក់ទោល) ដែលភ្ជាប់ដោយ សម្ព័ន្ធកូរ៉ាឡង់រវាងស្ករវីបូស និងអាស៊ីតផូស្វ័រិច។

5. តើម៉ូលេគុលARNមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?

- ម៉ូលេគុលARNមានបីប្រភេទគឺ៖
 - ARNនាំសារ (ARNm) ARNដឹកនាំ (ARNt) និង ARNរីបូសូម (ARNr) ។

6. តើគេចែកម៉ូលេគុលARNជាប្រភេទខុសគ្នាដោយផ្អែកលើអ្វី?


- ដោយផ្អែកទៅតាមមុខងាររបស់វា។

7. តើADNនិងARNមានធាតុអ្វីដែលដូចគ្នា?

- មានបាសអាសូត (A C និងG)
- មានអាស៊ីតផូស្វ័រិច។

8. តើADNនិងARNមានធាតុអ្វីដែលខុសគ្នា?

- ADNនិងARNមានស្ករ និងបាសអាសូតខុសគ្នា។
 - ADNមានស្ករដេអុកស៊ីរីបូស ($C_5H_{10}O_4$) រីឯARNមានស្កររីបូស ($C_5H_{10}O_5$)។
 - ADNមានបាសទីមីន (T) អត់បាសអ៊ុយរ៉ាស៊ីល (U) រីឯARNមានបាស (U) អត់បាស(T)។





9. ដូចម្តេចដែលហៅថាការចម្លងព័ត៌មានសេនេទិច?

- ការចម្លងព័ត៌មានសេនេទិច ជាការចម្លងតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតលើអង្កត់មួយរបស់ADN ទៅតំណលំដាប់រីបូនុយក្លេអូទីតរបស់ARN។

10. តើចលនការសំយោគម៉ូលេគុលARNប្រព្រឹត្តទៅនៅឯណា?

- ចលនការសំយោគម៉ូលេគុលARNប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូ។

11. ហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់មានការសំយោគម៉ូលេគុលARN?

- ព្រោះព័ត៌មានសេនេទិចស្ថិតនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូជានិច្ច ឯការសំយោគប្រូតេអ៊ីនប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងស៊ីតូប្លាស្មា។ ដូចនេះត្រូវមានម៉ូលេគុលមួយទៅចម្លងក្រុម គឺ ARN។

12. តើម៉ូលេគុលមួយណាដែលបង្កើតម៉ូលេគុលARN?

- ម៉ូលេគុលដែលបង្កើតម៉ូលេគុលARN គឺអង្កត់មួយរបស់ADNដែលហៅថា សែន។

13. តើADNមួយម៉ូលេគុលសំយោគបានARNប៉ុន្មាន?

- ADNមួយម៉ូលេគុលសំយោគបានARNបានច្រើនប្រភេទ។

14. តើការសំយោគម៉ូលេគុលARNធ្វើឡើងដោយមានអន្តរាគមន៍ពីអ្វី?

- ការសំយោគម៉ូលេគុលARNធ្វើឡើងដោយមានអន្តរាគមន៍ពីអង់ស៊ីមARNប៉ូលីមេរ៉ាស។

15. តើអង់ស៊ីមARNប៉ូលីមេរ៉ាសជាអ្វី?

- អង់ស៊ីមARNប៉ូលីមេរ៉ាស ជាអង់ស៊ីមដែលមានអន្តរាគមន៍លើការសំយោគម៉ូលេគុលARN។

16. តើអង់ស៊ីមARNប៉ូលីមេរ៉ាសមាននាទីអ្វី?

- ទទួលស្គាល់សញ្ញាសេនេទិចនៅលើម៉ូលេគុលADNដែលអាចចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់ការសំយោគម៉ូលេគុលARN ត្រង់កន្លែងមួយជាក់លាក់។
- បើកម៉ូលេគុលADNដោយការផ្តាច់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនខ្សោយ។
- ធ្វើឱ្យមានប៉ូលីមេរ៉ាសនៃរីបូនុយក្លេអូទីត។





17. តើការធ្វើឱ្យមានប៉ូលីមេរ៉ាសនៃរីបូនុយក្លេអូទីតប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេច?

- ការធ្វើឱ្យមានប៉ូលីមេរ៉ាសនៃរីបូនុយក្លេអូទីតប្រព្រឹត្តទៅដោយរីបូនុយក្លេអូទីតសេរីចូលទៅបំពេញជាមួយនុយក្លេអូទីតច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែនតាមគោលការណ៍បំពេញបាសគឺ Aបំពេញ U និង

Cបំពេញ G។

18. ចូររៀបរាប់អំពីចលនការចម្លងក្រុម។

- ចលនការចម្លងក្រុមប្រព្រឹត្តទៅនៅលើម៉ូលេគុលADNនៅចន្លោះវគ្គក្រោមអំពើរបស់អង់ស៊ីម ARNប៉ូលីមេរ៉ាស។ វាមាននាទី៖
- ទទួលស្គាល់សញ្ញាសេនេទិចដែលអាចចាប់ឱ្យចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់ការសំយោគម៉ូលេគុល ARNm ត្រង់កន្លែងមួយជាក់លាក់។
- បើកម៉ូលេគុលADNដោយការផ្តាច់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនដែលភ្ជាប់ច្រវាក់ទាំងពីររបស់ADN។
- ធ្វើឱ្យមានប៉ូលីមេរីសម្រាប់នីមួយៗនៃរីបូនុយក្លេអូទីត៖ រីបូនុយក្លេអូទីតសេរីចូលមកបំពេញជាមួយ ច្រវាក់ នុយក្លេអូទីតម្ខាងរបស់អង្គត់ADNតាមគោលការណ៍បំពេញបាសគឺA-U និង C-G។ សំយោគចប់ ហើយ ARNmក៏ផ្តាច់ចេញពីADNហើយចាកចេញពីណ្វៃយ៉ូទៅកាន់ស៊ីតូប្លាស្ម។





19. ចូររៀបរាប់ពីនាទីរបស់ម៉ូលេគុល ADN ARNm ARNt និង ARNr ក្នុងចលនការសំយោគប្រូតេអ៊ីន។

- ADN៖ មាននាទីផ្នែកព័ត៌មានសេនេទិចសម្រាប់កំណត់ការសំយោគម៉ូលេគុល ARNm។
- ARNm៖ មាននាទីចម្លងព័ត៌មានសេនេទិចពីម៉ូលេគុល ADN ទៅជាតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីត ហើយបញ្ជូនតំណលំដាប់នេះទៅកាន់រីបូសូមដើម្បីកំណត់ការសំយោគប្រូតេអ៊ីន។
- ARNt៖ មាននាទីដឹកនាំអាស៊ីតអាមីនេពីស៊ីតូប្លាស្ទទៅកាន់រីបូសូម និងតម្រូវអង់ទីកូដុងជាមួយនឹង កូដុងរបស់ ARNm ដើម្បីចូលរួមបកប្រែព័ត៌មានសេនេទិចឱ្យទៅជាប្រូតេអ៊ីន។
- ARNr៖ មាននាទីចូលរួមជាមួយប្រូតេអ៊ីនដើម្បីបង្កើតរីបូសូមដែលជាទេសដងក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីន។

20. តើក្រមសេនេទិចជាអ្វី?

- ក្រមសេនេទិច ជាប្រព័ន្ធនៃភាពត្រូវគ្នារវាងនុយក្លេអូទីតបីទៅនឹងអាស៊ីតអាមីនេមួយក្នុងប្រូតេអ៊ីន។

21. តើក្រមសេនេទិចមានលក្ខណៈដូចម្តេច? ហេតុអ្វី?

- ក្រមសេនេទិចមានលក្ខណៈជាសកល ព្រោះភាវៈរស់ទាំងអស់(បាក់តេរី មនុស្ស សត្វ និង រុក្ខជាតិ) ប្រើប្រាស់ក្រមនេះរួមគ្នាតែមួយ។

22. ហេតុអ្វីបានជាក្រមសេនេទិចត្រូវបានប្រើប្រាស់រួមគ្នា?

- ព្រោះភាវៈរស់ទាំងអស់មាននុយក្លេអូទីត 4 ប្រភេទ ដូចគ្នាបង្កើតបានជាត្រីធាតុ 64 សម្រាប់កំណត់អាស៊ីតអាមីនេ 20 ប្រភេទ ហើយត្រីធាតុ 1 កំណត់អាស៊ីតអាមីនេ 1។

23. តើគេប្រៀបប្រដូចក្រមសេនេទិចទៅនឹងអ្វី?

- ក្រមសេនេទិចប្រៀបដូចជានាក្រម សម្រាប់បកប្រែអក្សរ 4 តួរបស់ ADN ឱ្យទៅជាអក្សរ 20 តួនៃប្រូតេអ៊ីន។

24. តើត្រីធាតុជាអ្វី?

- ត្រីធាតុ ជាបន្សំនៃនុយក្លេអូទីតបីត្រូវគ្នារបស់ ADN។

25. តើ ARNm មានកូដុងប៉ុន្មានប្រភេទ? ហើយកំណត់អាស៊ីតអាមីនេប៉ុន្មានប្រភេទ?



- ARNm មានកូដុង 64 (4^3) ដែលកំណត់អាស៊ីតអាមីនេ 20 ប្រភេទ។

26. តើកូដុងជាអ្វី?

- កូដុង គឺជាវីបូនុយក្លេអូទីតបីតួនៅលើ ARNm។

27. ហេតុអ្វីបានជាកូដុងស្តុបមិនកំណត់អាស៊ីតអាមីនេ?

- កូដុងស្តុបមិនកំណត់អាស៊ីតអាមីនេ ព្រោះវាជាកូដុងសម្រាប់បញ្ឈប់ការសំយោគប្រូតេអ៊ីន។

28. តើអង់ទីកូដុងជាអ្វី?

- អង់ទីកូដុង ជានុយក្លេអូទីតបីតួលើ ARNt។

29. តើ ARNt មួយអាចដឹកនាំអាស៊ីតអាមីនេទាំង ២០ ប្រភេទបានឬទេ?

- ARNt មួយមិនអាចដឹកនាំអាស៊ីតអាមីនេទាំង ២០ ប្រភេទបានទេ គឺអាចដឹកនាំអាស៊ីតអាមីនេបានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ។
- ឧទាហរណ៍៖ ARNt ដែលមានអង់ទីកូដុង AAG បំពេញជាមួយ UUC ត្រូវនឹងអាស៊ីតអាមីនេផេនីលអាឡានីន។

30. ចូរពណ៌នាទម្រង់របស់ ARNt។

- ARNt កើតឡើងពីប្រភេទកូដុងបីតួនៅលើ ARNt ដែលមានចុងម្ខាងរុំព័ទ្ធលើខ្លួនឯងបង្កើតបានជាកំពក 3 ដែលនៅលើកំពកនីមួយៗមានបាសបីតួហៅថាអង់ទីកូដុងសម្រាប់បំពេញជាមួយកូដុង ឯម្ខាងទៀតជាកន្លែងភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីនេ។

31. តើកន្លែងពីរសំខាន់នៅលើ ARNt មានអ្វីខ្លះ?

- កន្លែងពីរសំខាន់នៅលើ ARNt គឺ៖
 - កន្លែងទទួលស្គាល់កូដុងដោយសារអង់ទីកូដុង
 - កន្លែងភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីនេមួយ។

32. តើការភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីនេមួយទៅនឹង ARNt យថាប្រភេទ ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេច?

- ការភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីនេមួយទៅនឹង ARNt យថាប្រភេទ ប្រព្រឹត្តឡើងដោយមានអន្តរាគមន៍ពីអង់ស៊ីមយថាប្រភេទមួយគឺ អង់ស៊ីមអាមីណូអាស៊ីល ARNt សាំងតេតាស (Aminoacyl ARNt synthetas) និងវត្ថុមានថាមពល ATP។ ATP ផ្តល់ថាមពលសម្រាប់ការភ្ជាប់។ ថាមពលនេះនឹង ត្រូវ



ប្រើសម្រាប់ការបង្កើតចំណងប៊ីបទីត។ ដូចនេះ ARNt ចូលរួមក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីន។

33. តើអ្វីជាអ្នកភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីនេជាមួយARNt?

- អ្នកភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីនេជាមួយARNtគឺ៖
 - អង់ស៊ីមអាមីណូអាស៊ីល ARNtសាំងតេតាស
 - ថាមពល (ATP)

34. តើវិបូសូមជាអ្វី? មានប៉ុន្មានផ្នែក? អ្វីខ្លះ?

- វិបូសូមជាធាតុកោសិកាដែលចូលរួមក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីន។
- វិបូសូមមានពីរផ្នែក គឺ ឯកតារងតូច និងឯកតារងធំ។

35. តើឯកតារងនីមួយៗរបស់វិបូសូមកើតឡើងពីអ្វី? តើធាតុនីមួយៗកើតឡើងនៅឯណា?

- ឯកតារងនីមួយៗរបស់វិបូសូមកើតឡើងពីARNrនិងប្រូតេអ៊ីន។
- ARNr(ARNវិបូសូម) កើតមាននៅក្នុងនុយក្លេអូលនៃណ្វៃយ៉ូ។
- ប្រូតេអ៊ីនវិបូសូមសំយោគឡើងនៅស៊ីតូប្លាស្ម។

36. ចូរពណ៌នាអំពីកំណើតរបស់វិបូសូម។

- ប្រូតេអ៊ីនវិបូសូមចូលរួមក្នុងណ្វៃយ៉ូជួបជាមួយARNrបង្កើតបានជាឯកតារងទាំងពីរ។ បន្ទាប់មក ឯកតារងទាំងពីរចាកចេញពីណ្វៃយ៉ូទៅស៊ីតូប្លាស្មដើម្បីប្រើប្រាស់ជារោងជាងសម្រាប់សាងសង់ប្រូតេអ៊ីន។

37. តើការសំយោគច្រវាក់ប៉ូលីប៊ីបទីតប្រព្រឹត្តទៅនៅឯណា?

- ការសំយោគច្រវាក់ប៉ូលីប៊ីបទីតប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងស៊ីតូប្លាស្មលើវិបូសូម។

38. តើការបកប្រែព័ត៌មានសេនេទិចជាអ្វី?

- ការបកប្រែព័ត៌មានសេនេទិច ជាចលនការបកប្រែតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតរបស់ARNm ឱ្យទៅជាតំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន។

39. តើការសំយោគច្រវាក់ប៉ូលីប៊ីបទីត ឬការសំយោគប្រូតេអ៊ីន មានប៉ុន្មានដំណាក់កាល? អ្វីខ្លះ?

- ចលនការបកប្រែក្រុម ឬសំយោគប៉ូលីប៊ីបទីត មានបីដំណាក់កាលខ្លះៗគឺ៖
 - ដំណាក់ដំបូង (ផ្ដើម)



- ដំណាក់កាលត្រីកោណ
- ដំណាក់កាលបញ្ចប់។

40. ចូររៀបរាប់ពីដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការបកប្រែក្រុមដោយសង្ខេប។

- រៀបរាប់ពីដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការបកប្រែក្រុមដោយសង្ខេប៖
 - ដំណាក់កាលផ្ដើម៖ ផ្ដើមដោយកូដុងផ្ដើម AUG ដែលត្រូវនឹងអាស៊ីតអាមីនេមេត្យូនីន នៅក្នុងថត P នៃរីបូសូម។
 - ដំណាក់កាលពង្រីក៖ រីបូសូមផ្លាស់ទីតាមបណ្តោយ ARNm។ ARNt ទម្លាក់អាស៊ីតអាមីនេជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងថត A នៃរីបូសូម។ អាស៊ីតអាមីនេទាំងនោះភ្ជាប់គ្នាពីមួយទៅមួយដោយចំណងប៊ីបទីត បង្កើតបានជាប្រវាក់ប៉ូលីប៊ីបទីត។
 - ដំណាក់កាលបញ្ចប់៖ នៅពេលដែលរីបូសូមលោតទៅដល់កូដុងស្តប (UUA UAG UGA) ធាតុសំបុកដូចជា ARNt ARNm រីបូសូម ប្រវាក់ប៉ូលីប៊ីបទីតត្រូវបំបែកចេញពីគ្នា ហើយ បន្ទាប់មកមេត្យូនីនត្រូវផ្តាច់ចេញពីចំណងប៊ីបទីត។

41. កាលណា រីបូសូមផ្លាស់ទីទៅដល់កូដុងស្តប តើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើង?

- ឯកតារងទាំងពីរបស់រីបូសូមបំបែកចេញពីគ្នា ARNt ARNm និងប្រវាក់ប៉ូលីប៊ីបទីត ក៏បំបែកចេញពីគ្នាដែរ។

42. ហេតុអ្វីពេលរីបូសូមផ្លាស់ទីទៅដល់កូដុងស្តប ធាតុចម្រុះទាំងនោះបំបែកចេញពីគ្នា?

- ពេលរីបូសូមផ្លាស់ទីទៅដល់កូដុងស្តប ធាតុចម្រុះទាំងនោះបំបែកចេញពីគ្នាព្រោះ កូដុងស្តប ជាកូដុងដែលបញ្ឈប់ការសំយោគប្រូតេអ៊ីន។

43. ពេលសំយោគប្រូតេអ៊ីនចប់ តើមានអ្វីកើតឡើង?

- ពេលសំយោគប្រូតេអ៊ីនចប់ មេត្យូនីនត្រូវផ្តាច់ចេញពីចំណងប៊ីបទីត បន្ទាប់មកប្រូតេអ៊ីន ត្រូវការយកទៅប្រើការតាមតម្រូវការ។

44. តើលទ្ធផលដែលទទួលបានពីបំណកប្រែក្រុមសេនេទិចជាអ្វី?

- លទ្ធផលដែលទទួលបានពីបំណកប្រែក្រុមសេនេទិចជាម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទមួយ។



45. ចូរប្រៀបធៀបចលនការតម្លើងទ្វេម៉ូលេគុលADNនិងការសំយោគម៉ូលេគុលARNm ។

➢ លក្ខណៈដូចគ្នា៖

- ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូនៃកោសិកានៅចន្លោះវគ្គ
- សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែននៃច្រវាក់ទាំងពីររបស់ADNផ្តាច់ចេញពីគ្នា
- ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអំពើអង់ស៊ីមប៉ូលីមេរ៉ាស

លក្ខណៈខុសគ្នា

ចលនការតម្លើងទ្វេម៉ូលេគុលADN	ការសំយោគម៉ូលេគុលARNm
.នុយក្លេអូទីតសេរីA,T,C,G .ក្រោមអំពើអង់ស៊ីមADNប៉ូលីមេរ៉ាស .សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនត្រូវផ្តាច់ពីដើមម៉ូលេគុលរហូតដល់ចុង .នុយក្លេអូទីតសេរីចូលទៅបំពេញច្រវាក់ទាំង២របស់ADNតាមគោលការណ៍បំពេញបាស A-T, C-G .គេបានម៉ូលេគុលADNកូនពីដូចគ្នាបេះបិទ ហើយស្ថិតនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូជានិច្ច។	.រីបូនុយក្លេអូទីតសេរីA,U,C,G .ក្រោមអំពើអង់ស៊ីមARNប៉ូលីមេរ៉ាស .សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនត្រូវផ្តាច់ត្រង់កន្លែងកំណត់មួយ .នុយក្លេអូទីតសេរីចូលទៅបំពេញច្រវាក់ម្ខាងរបស់អង្កត់ADNតាមគោលការណ៍ចម្លងក្រម A-U, C-G .គេបានម៉ូលេគុលARNm ១ម៉ូលេគុលហើយ ផ្តាច់ចេញពីច្រវាក់ADNរួចចេញពីណ្វៃយ៉ូទៅ ស៊ីតូប្លាស្ទ ឯច្រវាក់ទាំង២របស់ADNក៏ភ្ជាប់គ្នាវិញ។

46. ចូរប្រៀបធៀប(ចំណុចដូចគ្នានិងខុសគ្នា)រវាងADNនិងប្រូតេអ៊ីន។


➢ លក្ខណៈដូចគ្នារវាងADNនិងប្រូតេអ៊ីនគឺ៖

- ជាម៉ាក្រូម៉ូលេគុល
- ម៉ូលេគុលនីមួយៗមានច្រវាក់ម៉ូលេគុលដែលកើតពីឯកតានៃធាតុបង្ក(ម៉ូណូមែរ)។
- ម៉ូលេគុលនីមួយៗមានតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតឬអាស៊ីតអាមីនេជាក់លាក់។



ចំណុចខុសគ្នា

ADN.	ប្រូតេអ៊ីន
• ម៉ូណូមែរបស់ADN.(មាននុយក្លេអូទីត៤ប្រភេទគឺ A, T, C, G) • កើតពីច្រវាក់នុយក្លេអូទីតពីរបំពេញគ្នា • មាននុយក្លេអូទីតច្រើន ម៉ាសធំ ប្រវែងវែង • នុយក្លេអូទីត 3 កំណត់អាស៊ីតអាមីនេ1 • តំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតកំណត់នូវតំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេ	• ម៉ូណូមែរបស់ប្រូតេអ៊ីនគឺអាស៊ីតអាមីនេ(មានអាស៊ីតអាមីនេ20ប្រភេទ) • កើតពីច្រវាក់អាស៊ីតអាមីនេទោល • អាស៊ីតអាមីនេតិច ម៉ាសតូច ប្រវែងខ្លី • អាស៊ីតអាមីនេ១កំណត់ដោយនុយក្លេអូទីត៣ • តំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេកំណត់ដោយតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតរបស់ADN។



47. តើមានសែនប៉ុន្មានដែលចូលរួមក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីន? អ្វីខ្លះ?

- សែនដែលចូលរួមក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីនមានបីគឺ៖
 - សែនទម្រង់
 - សែនប្រតិបត្តិការ និង
 - សែនតម្រូវ។



48. តើសែនទាំងបីដែលចូលរួមក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីនមាននាទីដូចម្តេចខ្លះ? ចូរប្រាប់។

- សែនទម្រង់៖ ជាសែនដែលមានព័ត៌មានសេនេទិចសម្រាប់កំណត់ទម្រង់ប្រូតេអ៊ីន។
- សែនប្រតិបត្តិការ៖ ជាសែនដែលមាននាទីបញ្ជាបើសែនទម្រង់។
- សែនតម្រូវ ឬសែនត្រួតពិនិត្យ៖ ជាសែនដែលទទួលឥទ្ធិពលពីស៊ីតូប្លាស ហើយមាននាទីបញ្ជាបើសែនប្រតិបត្តិការ។

49. តើបម្រែបម្រួលតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតក្នុងអង្គត់នៃម៉ូលេគុលADNនាំឱ្យមានផលវិបាកដូចម្តេចខ្លះ?

- បម្រែបម្រួលតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតក្នុងអង្គត់នៃម៉ូលេគុលADNនាំឱ្យមានបម្រែបម្រួលតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតក្នុងម៉ូលេគុលARNm ហើយជាបន្តទៀតមានបម្រែបម្រួល តំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន។

50. តើចលនការបកប្រែក្រមសេនេទិចប្រព្រឹត្តទៅនៅកន្លែងណា? តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលចូលរួមក្នុងចលនការនេះ?

- ចលនការបកប្រែក្រមសេនេទិចប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងស៊ីតូប្លាស។
- កត្តាដែលចូលរួមក្នុងចលនការនេះមានដូចជា ARNm ARNt អាស៊ីតអាមីនេ រីបូសូម អង់ស៊ីមអាមីណូអាស៊ីលARNtសំរាប់តែតាស និង ATP ដែលជាប្រភពថាមពល។

51. តើបាសអាសូតជាអ្វី? មានប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះ?

- បាសអាសូត ជាបាសដែលមានផ្ទុកម៉ូលេគុលអាសូត ហើយជាធាតុបង្ករបស់នុយក្លេអូទីត។
- បាសអាសូតមាន5ប្រភេទគឺអាដេនីន(A)ទីមីន(T)អ៊ុយរ៉ាស៊ីល(U)ស៊ីតូស៊ីន(C)និងកាសីន(G)។

52. តើបាសអាសូតមានប៉ុន្មានក្រុម? អ្វីខ្លះ?

- បាសអាសូតមានពីរក្រុមគឺ៖
 - ក្រុមពួរីន (Purine)៖ អាដេនីន (A) កាសីន(G)
 - ក្រុមពីរីមីឌីន(Pyrimidine)៖ ទីមីន (T) ស៊ីតូស៊ីន(C) និងអ៊ុយរ៉ាស៊ីល (U)



ជំពូក៥ ព័ត៌មានសេនេទិច និងការលម្អៀងនៃសែន

មេរៀនទី៣ បច្ចេកវិទ្យាជីវៈ

1. តើជម្រើសដោយធម្មជាតិ (Natural Selection) ជាអ្វី?

- ជម្រើសដោយធម្មជាតិជាលំនាំមួយរបស់សារពាង្គកាយដែលអាចបន្ស៊ាំយ៉ាងល្អទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានធន់នឹងជំងឺ អាចរស់រានមានជីវិត និងអាចបន្តពូជបាន។

2. តើជម្រើសដោយមនុស្សជាអ្វី?

- ជម្រើសដោយមនុស្ស ជាអំពើរបស់មនុស្សក្នុងការកែប្រែពូជសត្វស្រុក និងរុក្ខជាតិដាំឱ្យកាន់តែប្រសើរដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់គេ។

3. តើមនុស្សបានប្រើវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីបង្កើនគុណភាពដំណាំនិងចិញ្ចឹមសត្វ ?

- មនុស្សបានបង្កើនគុណភាពដំណាំនិងចិញ្ចឹមសត្វ ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ ដូចជាការបង្កាត់ការធ្វើអ៊ីប្រីតកម្ម ប្តូរហ្វូស៊ីឌី កូន...។

4. តើអ៊ីប្រីត(Hybrid)ជាអ្វី?

- អ៊ីប្រីត ជាកូនកាត់ដែលបានពីមេបាមានលក្ខណៈខុសគ្នា។

5. តើអ៊ីប្រីតកម្ម (Hybridization) ជាអ្វី?

- អ៊ីប្រីតកម្ម ជាការបង្កាត់ពូជខុសគ្នានៃប្រភេទតែមួយ ឬប្រភេទខុសគ្នាដើម្បីបានកូនកាត់។

6. តើអេតេរ៉ូស៊ីស Heterosis or Hybrid Vigor ជាអ្វី?

- អេតេរ៉ូស៊ីស Heterosis or Hybrid Vigor ជាអ៊ីប្រីតល្អ ខ្លាំងមួយដែលទទួលបានបន្សំ សែនល្អពីមេបារបស់វា តាមរយៈការធ្វើអ៊ីប្រីតកម្ម។

7. តើការបង្កាត់ជិតជាអ្វី? តើគេធ្វើវិធីនេះទៅលើសត្វប្រភេទណា?

- ការបង្កាត់ជិត គឺជាការបង្កាត់សត្វដែលកើតចេញពីមេបាមួយគូ រវាងគ្នា ឬរវាងមេបា នឹងកូនរបស់វា។
- គេធ្វើវិធីនេះចំពោះសត្វចិញ្ចឹមដូចជាគោ ក្របី ស្រី ឆ្កែ.....។



8. តើសណ្តានក្រោយដែលបានពីការបង្កាត់ជិតមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

- សណ្តានក្រោយដែលបានពីការបង្កាត់ជិតមានលក្ខណៈដូចតទៅ៖
 - មានកម្លាំងជីវិតខ្សោយ លទ្ធភាពបន្តពូជថយចុះ និងបង្កើតភាពមិនប្រក្រតីនៃក្រុមសូមដែលនាំទៅរកភាពផុតពូជ។

9. តើការបង្កាត់ជិតមិនបានផ្តល់ផលអ្វីមែនទេ?

- ការបង្កាត់ជិតមិនបានផ្តល់ផលអាក្រក់ទាំងអស់នោះទេ គឺវាអាចឱ្យគេរក្សាទុកពូជមួយក្នុងភាពជាអូម៉ូស៊ីកូតលក្ខណៈអន់។

10. តើការបង្កាត់ឆ្ងាយជាអ្វី?

- ការបង្កាត់ឆ្ងាយ គឺជាការបង្កាត់រវាងពូជខុសគ្នា ឬរវាងប្រភេទខុសគ្នា ឬមានខ្សែស្រឡាយឆ្ងាយពីគ្នា។

11. តើសណ្តានក្រោយដែលបានពីការបង្កាត់ឆ្ងាយមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

- សណ្តានក្រោយដែលបានពីការបង្កាត់ឆ្ងាយ គឺផ្តល់អ៊ីប្រីតដែលមានលក្ខណៈល្អ កម្លាំងជីវិតខ្លាំង ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ លូតលាស់ឆាប់ ហើយធន់នឹងជំងឺ។

12. តើការបង្កាត់ឆ្ងាយផ្តល់ផលវិបាកអ្វីដែរឬទេ?

- ការបង្កាត់ឆ្ងាយផ្តល់ផលវិបាកដល់សន្តានក្រោយ គឺភាពអាន(Sterile)។

13. តើមុយលេ (Mule)ជាអ្វី?

- មុយលេ(Mule) ជាអេតេរូស៊ីស ដែលបានពីការបង្កាត់រវាងលាឈ្មោល និងសេះញី។

		
លាឈ្មោល $2n = 64$ $n = 32$	សេះញី $2n = 62$ $n = 31$	= មុយលេ (Mule) $2n = 63$ $n = n/a$



14. តើមួយលេមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីមេបារបស់វាត្រង់ណាខ្លះ?

- វាមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីមេបារបស់វាគឺ មានកម្លាំងខ្លាំង ធំធេងរហ័ស ហើយធន់នឹងលក្ខខណ្ឌជីវិតពិបាកៗ។

15. ចូររកភាពខុសគ្នានៃការបង្កាត់ជិត និងការបង្កាត់ឆ្ងាយ។

ភាពខុសគ្នា

ការបង្កាត់ជិត	ការបង្កាត់ឆ្ងាយ
• បង្កាត់រវាងកូនកើតចេញពីមេបាតែមួយ ឬរវាងកូននិងកូន • សន្តានក្រោយមានកម្លាំងជីវិតខ្សោយ លទ្ធភាពបន្តពូជថយចុះ បង្កើតភាពមិនប្រក្រតីនៃក្រុមសូមនាំទៅរកការវិនាសផុតពូជ។ • អាចបង្កើត និងរក្សានូវពូជសុទ្ធចំពោះលក្ខណៈអស់។	• បង្កាត់រវាងពូជខុសគ្នា ឬមានស្ថេរស្រឡាយ ឆ្ងាយពីគ្នា ឬប្រភេទខុសគ្នា • អ៊ីប៊ីតមានកម្លាំងជីវិតខ្លាំង ធន់នឹងជំងឺរាបាលូតលាស់ល្អ ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ • អារ មិនអាចបង្កកំណើតបាន ក្នុងករណីមេបា ប្រភេទខុសគ្នា។

16. តើកូន (Clone) ជាអ្វី?

- កូន (Clone) គឺជាគោសិកាលូតលាស់មួយក្រុម ឬសារពាង្គកាយមួយក្រុមដែលមានព័ត៌មានសេនេទិចដូចគ្នាបេះបិទ។


17. តើកូនដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិមានអ្វីខ្លះ?

- កូន កើតឡើងដោយឯកឯងក្នុងធម្មជាតិ ចំពោះសារពាង្គកាយបាក់តេរី អ៊ីត និងរុក្ខជាតិមួយចំនួន ។
- ចំពោះមនុស្ស កូនដោយធម្មជាតិគឺ ជាកូនឆ្ពោះពិត។

18. ចូររៀបរាប់អំពីដំណើរការកូនការត។

- ដំបូង គេយកពន្លកកាត់មួយទៅបណ្តុះក្នុងបំពង់កែវដែលមានមជ្ឈដ្ឋានបណ្តុះ។
- ខែក្រោយ គេទទួលបានមីក្រូកាត់ ជាម៉ាសគោសិកាមួយ រួចកាត់វាជាបំណែកតូចៗទៅបណ្តុះបន្តក្នុងបំពង់ផ្សេងទៀត។

- គេធ្វើបែបនេះដំណើរការកូនរុក្ខជាតិដល់ខែទី១០ គេទទួលបានកាល់រាវរយពាន់។
- នៅខែទី១០ គេយកកាល់ទាំងនោះទៅដាក់ក្នុងបំពង់កែវដែលមានមជ្ឈដ្ឋានចិញ្ចឹមសម្រាប់ឱ្យកាល់ទាំងនោះមានលទ្ធភាពបង្កជាបូស ដើម ស្លឹក។
- ទីបញ្ចប់ គេទទួលបានកូនរុក្ខជាតិដូចគ្នារាវរយពាន់ដើម។



19. ចូររៀបរាប់ដំណើរការកូនសត្វគោ។

- ដំណើរការនៃការកូនសត្វគោ៖
 - ដំបូងគេជ្រើសរើសពូជមេគោល្អមួយ (ផ្តល់សាច់ និងទឹកដោះច្រើន)។
 - បញ្ចូលស្តែមរបស់គោល្អមួយទៅក្នុងស្បូនរបស់មេគោនោះ ។
 - ក្រោយការបង្កកំណើត គេទុកឱ្យស៊ីកូតធ្វើមីតូសបន្តបន្ទាប់បានអំប្រើយ៉ុងដែលមានកោសិកា32។
 - តាមបច្ចេកវិទ្យា គេដកយកអំប្រើយ៉ុងនោះចេញពីមេគោ ហើយគេដកយកឆ្អែយ៉ូចេញពីកោសិកាទាំង10របស់វាទៅបញ្ចូលក្នុងអូសូល10(ពីមេគោផ្សេងៗគ្នា)ដែលបានដកយកឆ្អែយ៉ូចេញ។
 - គេទុកកោសិកាទាំង10នេះក្នុងកែវដើម្បីឱ្យធ្វើមីតូសក្លាយជាអំប្រើយ៉ុង។
 - បន្ទាប់មកដកយកអំប្រើយ៉ុងទាំង10ដាក់បញ្ចូលក្នុងស្បូននៃមេគោទាំង10ខាងលើ។




- ក្រោយមក មេគោទាំង10បានបង្កើតកូនគោ10ក្បាលដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាទាំងអស់។



20. តើប៉ូលីប្លូអ៊ីឌីជាអ្វី?

- ប៉ូលីប្លូអ៊ីឌី ជាបាតុភូតដែលធ្វើឱ្យចំនួនក្រូម៉ូសូមកើនឡើងតាមពហុគុណនៃ n ។
- ឧទាហរណ៍៖ $3n, 4n, 5n...$



21. ក្នុងការបង្កើតប៉ូលីប្លូអ៊ីឌី តើគេច្រើនប្រើសារធាតុគីមីអ្វីខ្លះ?

- ក្នុងការបង្កើតប៉ូលីប្លូអ៊ីឌី គេច្រើនប្រើសារធាតុគីមីដូចជា កុលស៊ីស៊ីន ណាប៉ាតាឡែន អេទីឡែន កាហ្វេអ៊ីន ដាក់ទៅលើរុក្ខជាតិ។ កុលស៊ីស៊ីន មានប្រសិទ្ធភាពជាងគេ។

22. តើសារធាតុគីមីកុលស៊ីស៊ីនមានឥទ្ធិពលឬ សកម្មភាពដូចម្តេចទៅលើរុក្ខជាតិ?

- កុលស៊ីស៊ីន បញ្ឈប់ត្រឡប់វិញនៃការក្រោមទឹកធ្វើឱ្យក្រមាទឹកមិនផ្តាច់ចេញពីគ្នាទៅកាន់ប៉ូលីប្លូអ៊ីឌី។ កោសិកាមិនចែកខ្លួន ដូចនេះ ចំនួនក្រូម៉ូសូមរបស់វានឹងកើនឡើងពីរដង ($4n$)។ រុក្ខជាតិនេះនឹងផ្តល់កាម៉ែតមានចំនួនក្រូម៉ូសូម $2n$ ហើយបង្កើតស៊ីកូត ($4n$)។



23. ក្រៅពីសារធាតុគីមី តើគេប្រើអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីធ្វើប៉ូលីប្រូអ៊ីឌី?

- ដើម្បីធ្វើប៉ូលីប្រូអ៊ីឌី គេអាចប្រើវិធីផ្សេងទៀតក្រៅពីសារធាតុគីមីដែលមានដូចជា៖
 - កាំរស្មីវិទ្យុសកម្ម សីតុណ្ហភាពកាំរស្មីស្វាយអ៊ុលត្រា (UV) ទៅលើរុក្ខជាតិ ។

24. តើរុក្ខជាតិប៉ូលីប្រូអ៊ីឌីខុសពីរុក្ខជាតិធម្មតាដូចម្តេចខ្លះ?

- រុក្ខជាតិប៉ូលីប្រូអ៊ីឌីខុសពីរុក្ខជាតិធម្មតា ដោយសារចំនួនក្រូម៉ូសូមកើន ដើម ផ្លែ ស្លឹកធំប្លែក គ្មានគ្រាប់ មានរសជាតិផ្អែម ផងនិងជំងឺ និងអាកាសធាតុ។

25. ហេតុអ្វីបានជាគេមិនអាចធ្វើប៉ូលីប្រូអ៊ីឌីទៅលើសត្វ?

- គេមិនអាចធ្វើប៉ូលីប្រូអ៊ីឌីទៅលើសត្វទេ ព្រោះវាអាចបណ្តាលឱ្យសត្វស្លាប់។

26. តើវិស្វកម្មសេនេទិចជាអ្វី?

- វិស្វកម្មសេនេទិច ជាសំណុំបច្ចេកទេសដែលធ្វើឱ្យមានបន្ថែមសែនចម្លែកមួយទៅក្នុងកោសិកា បណ្តុះមួយ (ជាលិកាសត្វ ឬរុក្ខជាតិ) ដើម្បីឱ្យកោសិកាធូលទទួលបាននូវលក្ខណៈថ្មីជាប់នឹងសែនបន្ថែមនោះ។


27. តើវិស្វកម្មសេនេទិចមានប៉ុន្មានជំហាន? អ្វីខ្លះ?

- វិស្វកម្មសេនេទិចមាន៤ជំហានគឺ៖
 - ការកាត់ម៉ូលេគុលADNជាអង្កត់តូចៗ
 - ការបញ្ចូលអង្កត់ADNបន្ថែមទៅក្នុងប្លាស្ទីតបាក់តេរី
 - ការបង្កើតកូន
 - ការសម្តែងនៃសែន

28. ចូររៀបរាប់ដំណាក់កាលនីមួយៗនៅក្នុងវិស្វកម្មសេនេទិច។

- ដំណាក់កាលទាំងបួននៅក្នុងវិស្វកម្មសេនេទិច៖
 1. ការកាត់ម៉ូលេគុលADNជាអង្កត់តូចៗ ៖ ការកាត់ម៉ូលេគុលADNជាអង្កត់តូចៗដោយប្រើអង់ស៊ីមប្រូម។ អង់ស៊ីមនេះទទួលស្គាល់តំណលំដាប់នៃបាស ហើយវាកាត់ម៉ូលេគុលADNត្រង់តំណលំដាប់ជាក់លាក់។
 2. ការបញ្ចូលអង្កត់ADNទៅក្នុងប្លាស្ទីតបាក់តេរី៖ ការបញ្ចូលអង្កត់ADNដែលមានសែនចង់បានទៅក្នុងកោសិកាធូល ដូចជា វីរុស បាក់តេរីជាដើម។

3. ការបង្កើតកូនបណ្តុះបណ្តាលបាក់តេរីដែលមានប្លាស្ទីតបន្សុំក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបណ្តុះដោយធ្វើឱ្យបាក់តេរីបំបែកខ្លួនដើម្បីទទួលបានក្រុមបាក់តេរីមួយ ឬកូនបាក់តេរី ដែលមានផ្ទុកអង្គត់ADNដូចគ្នា។
4. ការសម្រួលនៃសែន៖ ជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃវិស្វកម្មសែនទី២។ សែនដែលគេចង់បាន ចាប់ផ្តើមដំណើរការសម្រួលប្រព័ន្ធអ៊ីនស៊ីនេស៊ីសនិងអាចបញ្ជូនលក្ខណៈនេះទៅសណ្តានក្រោយ។



29. ចូររៀបរាប់ដោយសង្ខេបពីវិស្វកម្មសែនទី២។


- គេយកប្លាស្ទីតចេញពីបាក់តេរីមួយ។ បន្ទាប់មកគេកាត់អង្គត់របស់ប្លាស្ទីតចេញ ហើយយកសែនបន្តទៅភ្ជាប់នឹងប្លាស្ទីត។ នៅទីបញ្ចប់ គេបញ្ចូលប្លាស្ទីតដែលមានសែនបន្តនេះទៅក្នុងកោសិកាផ្ទុក។ កោសិកាផ្ទុកធ្វើចំណែកបានជាកូនដែលនៅក្នុងកូននីមួយៗមានសែនដែលគេចង់បាន។ សែននីមួយៗដឹកនាំការសម្រួលប្រព័ន្ធអ៊ីនស៊ីនេស៊ីសដែលគេចង់បាន។

30. តើប្លាស្ទីត (Plasmid) ជាអ្វី?

- ប្លាស្ទីត ជាADNរាងជារង្វង់របស់បាក់តេរី (ខ្លះ)។

31. ចូររៀបរាប់ពីដំណើរការផលិតអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន។

- កាត់អង្គត់ADNរបស់មនុស្សដែលជាសែនកំណត់
- ការសម្រួលអាំងស៊ុយលីនដោយអង្គត់មួយបង្កើត។
- ដឹកយកADNរបស់បាក់តេរី ហើយកាត់យកអង្គត់មួយចេញដោយអង្គត់មួយ។
- បញ្ចូលអង្គត់ADN (សែនសម្រួលអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន) របស់មនុស្សទៅក្នុងប្លាស្ទីតដែលមានបន្ទុកសែននេះទៅក្នុងបាក់តេរីវិញ។ ក្រោយមកបាក់តេរី នេះបង្កើនចំនួនដែលធ្វើឱ្យសែន





សំយោគអាំងស៊ុយលីនកើនចំនួន។ អាំងស៊ុយលីនក៏កើនចំនួនដែរ។

- សែននីមួយៗសំយោគបានអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន។

32. តើវិស្វកម្មសេនេទិចជួយដល់រុក្ខជាតិដូចម្តេចខ្លះ?

- វិស្វកម្មសេនេទិចធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិនោះធន់នឹងជំងឺ សត្វល្អិតចង្រៃ អាកាសធាតុ ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ ជួយឱ្យរុក្ខជាតិមានផ្លែផ្កាច្រើន និងជួយបង្កើនគុណភាពដីដាំដំណាំ។

33. ចូរបំពេញទិន្នន័យនៃរុក្ខជាតិបណ្តុះសែន។

- គេប្រើសូលុយស្យុងស្យាណាមីតខ្សោយដើម្បីសម្លាប់ស្មៅ។ ប៉ុន្តែវាធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិខ្លះដូចជា ដើមថ្នាំជក់រងការខូចខាត។
- ផ្សិតមេរុតេស្យូមអាចសំយោគអង់ស៊ីមស្យាណាមីត អ៊ីដ្រាតាស។ អង់ស៊ីមនេះបម្លែងស្យាណាមីតឱ្យទៅជាអ៊ុយរេ។ ហើយ អ៊ុយរេជួយធ្វើឱ្យដីមានជីជាតិ ធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិលូតលាស់។
- បើគេបញ្ចូលសែនដែលសំយោគអង់ស៊ីមស្យាណាមីតអ៊ីដ្រាតាស ទៅក្នុងដើមថ្នាំជក់ នោះដើមថ្នាំជក់នឹងធន់នឹងថ្នាំសម្លាប់ស្មៅធ្វើឱ្យកើតអ៊ុយរេ សម្រាប់ជួយការលូតលាស់ដល់ដើមថ្នាំជក់។

34. ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល តើសារធាតុគីមីអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានផលិតតាមវិស្វកម្មសេនេទិច?

- សារធាតុដែលបានផលិតក្នុងវិស័យសុខាភិបាលមានដូចជា៖ វ៉ាក់សាំង អង់ទីក អាំងទែផេរ៉ូន អាំងទែឡីគីន អង់ទីប្យូទិច អរម៉ូនលូតលាស់ និងអេរីត្រូប្រូតេអ៊ីន។

35. តើវ៉ាក់សាំង(Vaccine)ជាអ្វី?

- វ៉ាក់សាំង ជាសារធាតុដែលរៀបចំឡើងសម្រាប់បង្កើតឱ្យមានភាពស៊ាំនៅក្នុងសារពាង្គកាយមនុស្ស សត្វហើយធ្វើឱ្យសារពាង្គកាយទាំងនោះប្រឆាំងទល់នឹងការរាតត្បាតនៃមេរោគ(វីរុស)។

36. តើគេត្រូវការអ្វីដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំង? ហើយគេផលិតយ៉ាងដូចម្តេច?

- ដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងគេត្រូវការបាក់តេរី ឬ វីរុស។ ដំបូងគេត្រូវធ្វើឱ្យមីក្រូសារពាង្គកាយខ្សោយ ហើយចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសារពាង្គកាយមនុស្ស ឬ សត្វ។
- គេបញ្ចូលសែនរបស់វីរុសទៅក្នុងប្លាស្ទិករបស់បាក់តេរី ។ សែននេះអាចធ្វើឱ្យបាក់តេរីសំយោគ ព្រូមប្រូតេអ៊ីន បន្ទាប់មក គេយកប្រូតេអ៊ីននោះទៅប្រើប្រាស់ជាវ៉ាក់សាំង។

37. តើអង់ទីក (Antibody) ជាអ្វី? មាននាទីអ្វី?



- អង់ទីក្រ ជាប្រូតេអ៊ីនដែលផលិតចេញពីគោលិកាសណ្ឋានថា ឡាំផូស៊ីតB។
- អង់ទីក្រ មាននាទីប្រឆាំងនឹងអង់ទីសែនរបស់មេរោគដោយការភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយអង់ទីសែនរបស់មេរោគ។

38. ចូរប្រាប់ពីរបៀបផលិតអង់ទីក្រ។

- ដំណើរការផលិតអង់ទីក្រ៖ គេយកកោសិកាមេដែលបានមកពីការរលាយចូលគ្នារវាងឡាំផូស៊ីតជាមួយកោសិកាមហារីក។ កោសិកានេះបង្កើនចំនួនយ៉ាងរហ័ស ហើយផលិតអង់ទីក្រ។ កោសិកានីមួយៗដែលបង្កើតឡើងនេះមានអង់ទីក្រដូចគ្នានឹងអង់ទីក្ររបស់ឡាំផូស៊ីតB។

39. តើអាំងទែផេរ៉ូនជាអ្វី? តើវាមាននាទីដូចម្តេច? តើគេប្រើវាដើម្បីអ្វី?

- អាំងទែផេរ៉ូន ជាប្រូតេអ៊ីនមួយប្រភេទដែលផលិតចេញពីកោសិកាបង្ករោគដោយវីរុស។
- វាមាននាទីទប់ស្កាត់កុំឱ្យវីរុសរាតត្បាត និងបន្តពូជក្នុងកោសិកាផ្សេងៗទៀតដែលនៅក្បែរ។ (អាំងទែផេរ៉ូនសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមហារីក)។

40. តើអាំងទែឡីគីនជាអ្វី? សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺអ្វី?

- អាំងទែឡីគីន ជាប្រូតេអ៊ីនមួយប្រភេទដែលបញ្ចេញពីកោសិកាផ្សេងៗនៃប្រព័ន្ធសុំ។
- អាំងទែឡីគីន សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមហារីក។

41. តើអង់ទីប្យូទីច(Antibiotic)ជាអ្វី?

- អង់ទីប្យូទីច ជាសារធាតុមួយដែលផលិតដោយមីក្រូសារពាង្គកាយ(បាក់តេរី និងផ្សិត) សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដែលបង្កឡើងដោយបាក់តេរី។

42. តើអង់ទីប្យូទីចដែលគេស្គាល់ច្រើនជាងគេមានឈ្មោះអ្វីខ្លះ? ចូរប្រាប់ឈ្មោះអង់ទីប្យូទីចផ្សេងទៀត។

- អង់ទីប្យូទីចដែលគេស្គាល់ច្រើនជាងគេគឺ បេនីស៊ីលីន(Penicilline) ដែលផលិតចេញពីផ្សិតផ្លូវឈ្មោះបេនីសេលូម(Penicillium)។
- អង់ទីប្យូទីចផ្សេងទៀតមានដូចជា ស្ត្រីបតូមីស៊ីន (Streptomycine) តេត្រាស៊ីគ្លីន (Tetracycline) ផលិតចេញពីបាក់តេរីស្ត្រីបតូមីសេស។

43. តើវិស្វកម្មសេនេទីចផលិតអ្វីខ្លះក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតស្បៀង?

- អរម៉ូនលូតលាស់៖ ជាប្រូតេអ៊ីនម្យ៉ាងសម្រាប់ជួយដល់ការលូតលាស់របស់សត្វ និងរុក្ខជាតិ។



- ការផលិតទឹកដោះគោជូរ និងប្រូម៉ាស៖ រសជាតិជូរនៅក្នុងទឹកដោះគោជូរ បណ្តាលមកពីបាក់តេរី ឡាក់តូបាស៊ីលុស (*Lactobacillus*) ដែលបម្លែងស្ករទឹកដោះគោ(ឡាក់តូស) ឱ្យទៅជា អាស៊ីត ឡាក់ទិច ដែលមានរសជាតិជូរ។

44. តើគេប្រើអ្វីម៉្លងលូតលាស់ដើម្បីអ្វី?

- គេប្រើអ្វីម៉្លងលូតលាស់ដើម្បីជួយឱ្យគោឆាប់ធំធាត់ និងលូតលាស់បានល្អ សម្បូរទឹកដោះផ្តល់ បរិមាណខ្លាញ់តិច សាច់របស់វាមានគុណភាពល្អសម្រាប់សុខភាពមនុស្ស។ សត្វគោដែលចិញ្ចឹម ដោយអ្វីម៉្លងផ្តល់បរិមាណទឹកដោះ25%ច្រើនជាងសត្វធម្មតា ។ ចំពោះបន្លែ ក៏ឆាប់ធំដែរ។

45. តើគេប្រើបាក់តេរីណាខ្លះក្នុងការផលិតទឹកដោះគោជូរ?

- គេប្រើបាក់តេរី *Lactobacillus bulgaricus* និង *Streptococcus thermophilus* ដើម្បីផលិតទឹក ដោះគោជូរ។

46. តើគេធ្វើទឹកដោះគោជូរយ៉ាងដូចម្តេច?

- គេដាក់ទឹកដោះគោក្នុងកែវដែលមានបាក់តេរីទាំងនោះ។ បាក់តេរី *streptococcus* ធ្វើដំណក
- ដង្ហើមគ្មានខ្យល់(លើក) ហើយបំប្លែងឡាក់តូស(ស្ករទឹកដោះគោ) ឱ្យទៅជាអាស៊ីតឡាក់ទិច។
- អាស៊ីតឡាក់ទិចធ្វើឱ្យប្រូតេអ៊ីនទឹកដោះគោ (កាសេអ៊ីន) កកបង្កើតបានជាទឹកដោះគោជូរ។

47. តើគេផលិតប្រូម៉ាស (Cheese)យ៉ាងដូចម្តេច?

- ការផលិតប្រហាក់ប្រហែលនឹងការផលិតទឹកដោះគោជូរដែរ ដោយប្រើបាក់តេរី *Lactobacillus* ផ្សិត និងបីពិត ហើយធ្វើឱ្យវាកក។

48. តើគេធ្វើនំប៉័ងដោយរបៀបណា? ហេតុអ្វីបានជានំប៉័ងមានរន្ធតូចៗ?

- គេលាយម្សៅមី ទឹក និងមេដំបែ។ អង់ស៊ីមអាមីឡាសបំបែកអាមីឡុងឱ្យទៅជាស្ករ។ មេដំបែ ធ្វើដំណកដង្ហើមគ្មានខ្យល់ ដោយបំប្លែងស្ករទៅជាអាល់កុល និងកាបូនឌីអុកស៊ីត(CO₂)។ CO₂ ធ្វើ ឱ្យម្សៅនំប៉័ងឡើងមេ ដែលបង្កើតបានជារន្ធតូច ៗនៅក្នុងនំប៉័ង រីឯអាល់កុលដែលកើតឡើងត្រូវ បានភាយតាមរន្ធតូចៗនៅពេលគេដុតនំប៉័ង។

49. ចំពោះរុក្ខជាតិ តើការបង្កាត់ពូជខុសគ្នានៃប្រភេទតែមួយ ឬ ប្រភេទផ្សេងគ្នាមានប្រយោជន៍ដូចម្តេច ចំពោះវិស័យកសិកម្ម?



- ការបង្កាត់ពូជខុសគ្នានៃប្រភេទតែមួយ ឬ ប្រភេទផ្សេងគ្នា អាចធ្វើឱ្យគេទទួលបានអ៊ីប្រីតដែលមានបន្ទុកសេនណូព័រមេបា។ ឧទាហរណ៍ ការបង្កាត់ប្រភេទដើមដំណោះសម្បុរស្តុរទាបតែធន់នឹងជំងឺ ជាមួយប្រភេទអំពៅមានជាតិស្ករខ្ពស់តែងាយរងជំងឺ អាចទទួលបានអ៊ីប្រីតដែលជាអំពៅមានជាតិស្ករខ្ពស់ និងធន់នឹងជំងឺ។ ម្យ៉ាងទៀត ការបង្កាត់មេបាពូជសុទ្ធ មានលក្ខណៈខុសគ្នា នាំឱ្យបានអ៊ីប្រីតល្អៗមានកម្លាំង និងផ្គត់ផ្គង់ផលខ្ពស់។

50. តើវិស្វកម្មសេនេទិចផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់មនុស្សជាតិ?

- ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលៈ ផលិតអាំងស៊ុយលីន អាំងទែផេរ៉ូន អាំងទែឡីគីន អង់ទីប្យូទិច វ៉ាក់សាំង។ ក្នុងវិស័យកសិកម្មៈ ធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិមានផ្កា ផ្លែ ធន់នឹងជំងឺ ធន់នឹងអាកាសធាតុ និងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ។ ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មស្បៀងមានដូចជាការផលិតអាហារមានអរម៉ូន(អរម៉ូនលូតលាស់ប្រើជាអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមជ្រូក) ទឹកដោះគោជូរ និងផលិតស្រាបៀរ។

51. តើវិស្វកម្មសេនេទិចផ្តល់ផលអាក្រក់អ្វីខ្លះដល់មនុស្សជាតិ?

- គ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានៈ រុក្ខជាតិដែលមានកំណែប្រែសែន (GM= Genetically modified)សម្លាប់សត្វល្អិតដែលរស់នៅលើរុក្ខជាតិធ្វើឱ្យស្លាប់ដល់ជីវិតជីវចម្រុះ។ ធ្វើឱ្យសត្វល្អិតស៊ាំ និងធន់នឹងជាតិពុល។ បង្កើតភាពអានដល់រុក្ខជាតិ មិនឱ្យផលិតគ្រាប់លំអងសម្រាប់បង្កាត់ពូជ។
- គ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពៈ ផលិតសារធាតុគីមីប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាម(អាវុធជីវសាស្ត្រ) អង់ទីប្យូទិចមិនអាចព្យាបាលជំងឺដែលបណ្តាលមកពីសែនធន់នឹងអង់ទីប្យូទិច។
- ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចៈ ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រាប់រុក្ខជាតិG.M ការពារស្របច្បាប់មិនឱ្យក្រុមហ៊ុនដទៃផលិតគ្រាប់រុក្ខជាតិ G.Mនោះទេ។ កសិករមិនអាចយកគ្រាប់ពូជរុក្ខជាតិទៅទុកធ្វើពូជបានទេ គឺត្រូវទិញពូជពី ក្រុមហ៊ុន រៀងរាល់ឆ្នាំពេលត្រូវការដាំ។
- ប៉ះពាល់សិល្បធម៌និងសង្គមៈ ធ្វើឱ្យមានសែនមុយតាស្បៀងដែលមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សន្តានក្រោយ។
- ប៉ះពាល់ជាមួយសាសនា (មិនទទួលស្គាល់វិស្វកម្មសេនេទិច ឬការកែច្នៃសែន)
- បែងចែករំលួចៈ (មានតែអ្នកមានទើបធ្វើវិស្វកម្មសេនេទិចបាន)។



ជំពូកទី៦ ការវិវត្តនៃការរស់

មេរៀនទី១ ទ្រឹស្តីរបស់ដាវីន

1. តើឡាម៉ាកមានទស្សនៈដូចម្តេចចំពោះដើមកំណើតនៃជីវិត?


- ឡាម៉ាកបង្ហាញថា ភាវៈរស់ដំបូងដែលកកើតលើផែនដីជាសារពាង្គកាយងាយបំផុត។ បន្ទាប់មក ឆ្លងកាត់រយៈពេលដ៏យូរអង្វែង ភាវៈរស់ដំបូងដែលរស់នៅដំបូងនេះវិវត្តជាបន្តបន្ទាប់ ហើយបង្កើតបានជាភាវៈរស់ប្រភេទផ្សេងៗដែលអាចរស់នៅលើផែនដី សព្វថ្ងៃ។

2. ចូររៀបរាប់ពីការពន្យល់របស់ឡាម៉ាកអំពីចលនានៃការវិវត្តរបស់ភាវៈរស់។

- ការពន្យល់របស់ឡាម៉ាកអំពីចលនាការវិវត្តរបស់ភាវៈរស់តាមច្បាប់ពីរគឺ៖
 - ច្បាប់ទី១៖ (មុខងារបង្កើតសរីរាង្គ) សរីរាង្គដែលធ្វើការច្រើនកាន់តែធំធេង រីឯសរីរាង្គដែលមិនបានធ្វើការក្លាយជាអ្នកតូច ហើយក្រោយមកក៏វិនាសបាត់បង់។
 - ច្បាប់ទី២៖ លក្ខណៈដែលទទួលបាន និងលក្ខណៈដែលបាត់បង់ទៅវិញ អាចបញ្ជូនបន្តទៅជំនាន់កូនចៅបាន។

3. តើការវិវត្តនៃភាវៈរស់គឺជាអ្វី?

- ការវិវត្តនៃភាវៈរស់ គឺជាការផ្លាស់ប្តូរ ឬបម្រែបម្រួលជាបន្តបន្ទាប់នៃទម្រង់ ឬលក្ខណៈនៃភាវៈរស់ មួយប្រភេទ ឆ្លងកាត់ជំនាន់ជាច្រើនដែលនាំឱ្យកើតទម្រង់សត្វឬ រុក្ខជាតិថ្មី។





4. ចូរពន្យល់ដោយសង្ខេបពីការសង្កេតឃើញរបស់ដាវីននៅពេលធ្វើដំណើរតាមសំពៅប៊ីគីល។


- ខែធ្នូ ឆ្នាំ1831 លោកដាវីនមានអាយុ 22ឆ្នាំ បានធ្វើដំណើរផ្សេងព្រេងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំតាមសំពៅមួយឈ្មោះ ប៊ីគីល(The Beagle)។ ដាវីនបានសង្កេតឃើញភាវៈរស់ប្លែកៗ។ ផ្លូវស៊ីលសត្វខ្លះមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីសត្វសព្វថ្ងៃ ខ្លះទៀតមានលក្ខណៈដូចសត្វសព្វថ្ងៃដែរ។ នៅលើប្រជុំកោះកាឡាប៉ាកូស ភាវៈរស់មានលក្ខណៈប្លែកខុសៗគ្នាពីកោះមួយទៅកោះមួយទៀត។ លក្ខណៈនីមួយៗជាលក្ខណៈបន្សំនៃភាវៈរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមួយ។ ម្យ៉ាងទៀតភាវៈរស់នៅលើកោះកាឡាប៉ាកូសមានលក្ខណៈដូចគ្នាខ្លះជាមួយសត្វនៅលើទ្វីបអាមេរិចខាងត្បូង។ ដូចនេះដាវីនបានសន្និដ្ឋានថា សត្វនៅលើកោះកាឡាប៉ាកូស(Galapagos)មានដើមកំណើតពីសត្វនៅលើទ្វីប។

5. តើការធ្វើដំណើររបស់ដាវីនចាប់ផ្តើមពីកន្លែងណាទៅកន្លែងណា?

- ការធ្វើដំណើររបស់ដាវីនចាប់ផ្តើមពីប្រទេសអង់គ្លេស ទៅអាមេរិចខាងត្បូង ប្រជុំកោះកាឡាប៉ាកូស ទ្វីបអូស្ត្រាលី ហើយកាត់តាមទ្វីបអាហ្វ្រិច រួចវិលចូលប្រទេសអង់គ្លេសវិញ។

6. តើដាវីនសង្កេតឃើញថាផ្លូវស៊ីលដែលជាសំណល់របស់ភាវៈរស់ជំនាន់មុនមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

- ផ្លូវស៊ីលដែលជាសំណល់របស់ភាវៈរស់ជំនាន់មុនមានលក្ខណៈប្លែកអំពីភាវៈរស់សព្វថ្ងៃ។
- ឧទាហរណ៍ ផ្លូវស៊ីលសត្វស្លូត(Sloth) មានឆ្អឹងធំជាងឆ្អឹងសត្វស្លូតដែលរស់នៅក្នុងសម័យនោះ។



7. តើដាវីនទាញសម្មតិកម្មដូចម្តេចចំពោះលក្ខណៈខុសគ្នានៃក្រញ៉ាំរបស់បង្កុយ?

- សត្វឬ រុក្ខជាតិលើកោះមានដើមកំណើតចេញពីទ្វីបអាមេរិចខាងត្បូង តែឆ្លងកាត់រយៈពេលដ៏យូរ ទម្រង់សារពាង្គកាយ និងលក្ខណៈរបស់សត្វប្រែប្រួលទៅតាមលក្ខខណ្ឌជីវិតនៅលើកោះ។



8. តើបង្គុយនៅលើទីបរាមេរិចខាងត្បូង និងបង្គុយនៅលើកោះកាឡាប៉ាកុសខុសគ្នាដូចម្តេច?

➢ លក្ខណៈខុសគ្នានៃបង្គុយនៅអាមេរិចខាងត្បូង និងបង្គុយនៅកោះកាឡាប៉ាកុស

បង្គុយនៅអាមេរិចខាងត្បូង	បង្គុយនៅកោះកាឡាប៉ាកុស
- មានក្រញាំជើងតូចៗសម្រាប់តោងលើដើមឈើ - ស៊ីស្លឹករុក្ខជាតិ	- មានក្រញាំជើងធំៗ ដែលធ្វើឱ្យវាតោងថ្មរអិលតាមសមុទ្រ - ស៊ីសារាយសមុទ្រ



បង្គុយនៅអាមេរិចខាងត្បូង(បង្គុយធម្មតា)



បង្គុយនៅលើប្រជុំកោះកាឡាប៉ាកុស(បង្គុយយក្ស)

9. ហេតុអ្វីបានជាសត្វនៅលើកោះកាឡាប៉ាកុសមានលក្ខណៈខុសពីសត្វនៅលើទីបរាមេរិច?

➢ បានជាសត្វនៅលើកោះកាឡាប៉ាកុសមានលក្ខណៈខុសពីសត្វនៅលើទីបរាមេរិច ព្រោះ សត្វដែលបានអណ្តែតពីទីបរាមេរិច ហើយទើបលើកោះមានការផ្លាស់ប្តូរ ការប្រែប្រួលលក្ខណៈដើម្បីបន្ស៊ាំទៅនឹងលក្ខខណ្ឌជីវិតថ្មី។

10. តើបន្ទុំជាអ្វី?

➢ បន្ទុំ ជាលក្ខណៈមួយដែលធ្វើឱ្យភាវៈរស់ រស់រានមានជីវិត និងបន្តពូជបានសមស្របនឹងមជ្ឈដ្ឋានដែលវាស់នៅ។

11. ហេតុអ្វីបានជាភាវៈរស់ត្រូវការបន្ទុំ? ចូរពន្យល់ដោយលើកឧទាហរណ៍។

- ភាវៈរស់ត្រូវការបន្ទុំដើម្បីរស់រានមានជីវិត និងបន្តពូជបានសមស្របនឹងមជ្ឈដ្ឋានដែលវាស់នៅ។
- ឧទាហរណ៍៖ សត្វមានស្បែកនៅចន្លោះម្រាមជើង ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យវាបន្ទុំទៅនឹងជីវិតរស់នៅក្នុងទឹករស់។



- ឧទាហរណ៍៖ បក្សីហ្នឹងមានចំពុះខុសៗគ្នាដោយសារវាមាន របបអាហារខុសៗគ្នា។
 រុក្ខជាតិខ្លះមានជាតិពុល ឬមានក្លិនអាក្រក់។ ដង្កូវដែលរស់លើដើមឈើពណ៌ប្រផេះ ខ្លះវាក៏
 មានពណ៌ប្រផេះដែរ។ បើវាវាស់នៅលើស្លឹកឈើពណ៌បៃតង វាក៏មានពណ៌បៃតងដែរ។ រុក្ខជាតិ
 ខ្លះមានពណ៌ឆើតឆាយទាក់ទាញសត្វល្អិត ដើម្បីជួយដល់ដំណើរលម្អងរបស់វា។

12. តើបន្ទុកផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដូចម្តេចចំពោះភាវៈរស់?

- បន្ទុកផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាវៈរស់ដូចជា៖
 - ការគេចផុតពីសត្រូវដែលចង់ស៊ីវា
 - ជួយក្នុងការបន្តពូជ
 - ជួយក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិត

15. តើការវិវត្ត(Evolution)ជាអ្វី?

- ការវិវត្ត ជាការផ្លាស់ប្តូរ ឬបម្រែបម្រួលជាបន្តបន្ទាប់នៃទម្រង់ ឬ លក្ខណៈនៃភាវៈរស់មួយប្រភេទ
 ដោយឆ្លងកាត់ជំនាន់ជាច្រើនដែលនាំឱ្យកើតទម្រង់សត្វ ឬរុក្ខជាតិថ្មីៗ។

16. ក្នុងការសិក្សាពូជសត្វស្រុកឬរុក្ខជាតិជាតាមកសិដ្ឋាន តើជាវិនិច្ឆ័យឃើញដូចម្តេច?

- ពូជសត្វស្រុក ឬ រុក្ខជាតិជាតិមានច្រើនបែបខុសៗគ្នា ហើយពូជសត្វ ឬ រុក្ខជាតិនីមួយៗឆ្លើយតបនឹង
 តម្រូវការរបស់មនុស្ស។

17. ហេតុអ្វីបានជាលេចចេញនូវពូជសត្វ ឬពូជរុក្ខជាតិថ្មីៗ?

- ការលេចចេញនូវពូជសត្វឬពូជរុក្ខជាតិថ្មីៗ ព្រោះក្នុងហ្វូងសត្វ ឬចំការរុក្ខជាតិមានលេចឡើងនូវ
 ឯកត្តៈដែលមានលក្ខណៈប្លែក។ បើលក្ខណៈនេះសមស្របទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្ស ដូចនេះ
 មនុស្សជ្រើសរើសឯកត្តៈនោះទុកឱ្យបន្តពូជជាប់ដោយឡែក។

18. ដើម្បីរក្សាពូជសត្វ ឬរុក្ខជាតិដែលខ្លួនត្រូវការឱ្យកាន់តែល្អ តើមនុស្សធ្វើដូចម្តេច?

- មនុស្សត្រូវឱ្យសត្វ និងរុក្ខជាតិនោះបន្តពូជជាមួយគ្នាវាជាប់ដោយឡែក។

**19. តើការសិក្សាអំពីជម្រើសដោយមនុស្សផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះ ដល់ជានិសម្រាប់
 បកស្រាយអំពីការវិវត្ត?**

- ជានិស គិតថា ក្នុងធម្មជាតិមានដំណើរការជម្រើសសត្វនិងរុក្ខជាតិផងដែរ។



20. តើបម្រែបម្រួលក្នុងធម្មជាតិផ្តល់នូវផលចលនការជម្រើសដោយមនុស្ស?

- បម្រែបម្រួលក្នុងធម្មជាតិផ្តល់លក្ខណៈថ្មីៗ ហើយមនុស្សជ្រើសរើសតែលក្ខណៈណាដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួន។

21. តើជម្រើសដោយធម្មជាតិជាអ្វី?

- ជម្រើសដោយធម្មជាតិ ជាដំណើរដែលឯកត្តៈមានលក្ខណៈបន្ស៊ាំទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានបានប្រសើរជាងឯកត្តៈដទៃទៀតក្នុងប្រភេទតែមួយ។ វាអាចរស់រានមានជីវិត និងបន្តពូជបានច្រើនជាងគេ។

22. តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើជម្រើសដោយធម្មជាតិ?

- កត្តាដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើជម្រើសដោយធម្មជាតិមានដូចជា ការបង្កើតកូនចៅហ្មសប្រមាណ ការប្រជែងដើម្បីរស់ និងបម្រែបម្រួល។.....

23. ក្នុងការបន្តពូជ តើភាវៈរស់មានលក្ខណៈដូចម្តេច?

- ក្នុងការបន្តពូជ ភាវៈរស់មានលក្ខណៈបង្កើតកូនចៅហ្មសប្រមាណ។

24. ហេតុអ្វីបានជាភាវៈរស់បង្កើតកូនចៅហ្មសប្រមាណ ប៉ុន្តែមិនអាចមានជីវិតរស់ទាំងអស់?

- បានជាភាវៈរស់បង្កើតកូនចៅហ្មសប្រមាណ ប៉ុន្តែមិនអាចមានជីវិតរស់ទាំងអស់ ព្រោះខ្វះកន្លែងរស់នៅ និងចំណីអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់។

25. តើបម្រែបម្រួលជាអ្វី? ចូរលើកឧទាហរណ៍។

- បម្រែបម្រួល ជាកំណែប្រែដែលធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈខុសគ្នារវាងឯកត្តៈដែលនៅក្នុងប្រភេទតែមួយ។
ឧទាហរណ៍៖ កូនក្នុងមេតែមួយ មានរូបរាង និងពណ៌សម្បុរមិនដូចគ្នាទេ។ កូនកណ្តុរខ្លះមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេ ដូចជាគ្មានរោមជាដើម។

26. តើបម្រែបម្រួល និងជម្រើសដោយធម្មជាតិចូលរួមក្នុងការវិវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

- បម្រែបម្រួល និងជម្រើសដោយធម្មជាតិចូលរួមក្នុងការវិវត្តដូចជា៖ ឆ្លងកាត់រយៈពេលដ៏យូរ
- ជម្រើសដោយធម្មជាតិធ្វើឱ្យលក្ខណៈនៃប្រភេទមួយត្រូវផ្លាស់ប្តូរ។ បម្រែបម្រួលដោយធម្មជាតិអាចកើនឡើងបន្តិចម្តងៗ ក្នុងប្រភេទមួយនៃភាវៈរស់ ឯបម្រែបម្រួលគ្មានប្រយោជន៍ត្រូវរលាយបាត់។ ដូចនេះ បម្រែបម្រួល និងជម្រើសដោយធម្មជាតិធ្វើឱ្យមានបម្រែបម្រួល។



27. តើការប្រែប្រួលដើម្បីរស់ជាអ្វី? ចូររកឧទាហរណ៍នៃការប្រែប្រួលដើម្បីរស់។

- ការប្រែប្រួលដើម្បីរស់ ជាការប្រែប្រួលរាងកាយរបស់សត្វនៅជាមួយគ្នាដើម្បីរស់រានមានជីវិត។
- ឧទាហរណ៍៖ សត្វកញ្ឆ្ឆាបប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយសត្វចំណីដទៃ (ឧទាហរណ៍៖ សត្វឆ្កែព្រៃ) ដើម្បីជំនួញចំណីអាហារគ្នា។ ហើយវាត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយធាតុអាកាសត្រជាក់ថែមទៀត។

28. តើកត្តាអ្វីដែលបណ្តាលឱ្យមានការប្រែប្រួលដើម្បីរស់?

- កត្តាដែលបណ្តាលឱ្យមានការប្រែប្រួលដើម្បីរស់ គឺ ការបង្កើតកូនចៅហួសប្រមាណ។ កត្តានេះធ្វើឱ្យមានកង្វះកន្លែងរស់នៅ ហើយប្រភពអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់បើធៀបទៅនឹងចំនួនឯកត្តៈ។ ដូចនេះភាវៈរស់ទាំងនោះត្រូវធ្វើការប្រែប្រួលដើម្បីជំនួញចំណីអាហារ ទីកន្លែងរស់នៅ និងធ្វើការបន្តពូជ។

29. តើការប្រែប្រួលដើម្បីរស់បណ្តាលឱ្យមានជម្រើសដូចម្តេច? ចូរពន្យល់។

- ការប្រែប្រួលដើម្បីរស់បណ្តាលឱ្យមានជម្រើសដោយធម្មជាតិ។ ឯកត្តៈណាដែលមានលក្ខណៈបន្ទុកទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានបានល្អប្រសើរជាងឯកត្តៈដទៃទៀតក្នុងប្រភេទតែមួយ វាអាចរស់រានមានជីវិត និងបន្តពូជបានច្រើនជាងគេ។

30. តើការប្រែប្រួលដើម្បីរស់មានប៉ុន្មានបែប? អ្វីខ្លះ? ចូររៀបរាប់។

- ការប្រែប្រួលដើម្បីរស់មានបីបែប គឺ៖
 - ការប្រែប្រួលរាងកាយរបស់ក្នុងប្រភេទខុសគ្នា៖ រុក្ខជាតិដាំត្រូវប្រែប្រួលជាមួយស្មៅព្រៃ និងសត្វល្អិត....។
 - ការប្រែប្រួលរាងកាយរបស់ក្នុងប្រភេទតែមួយ៖ សត្វស្លាបប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីជំនួញចំណីកន្លែងធ្វើសំបុកជំនួញទឹកដើម្បីរកចំណី។ ថនិកសត្វខ្លះប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីជំនួញសត្វញី។
 - ការប្រយុទ្ធនឹងលក្ខខណ្ឌមិនប្រកបនៃមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅ៖ ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលភាវៈរស់មួយចំនួនរស់នៅ ដូចជា ក្តៅខ្លាំង ត្រជាក់ខ្លាំង ស្ងួតខ្លាំង ឬសើមខ្លាំង។ ដូចជានៅវាលខ្សាច់សាហារ៉ា ទោះបីមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំ តែក៏នៅមានពពួកមីក្រូសារពាង្គកាយជាច្រើនរស់នៅ។ នៅតំបន់អាកទិចខាងជើង ទោះជាសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះខ្លាំង -80°C ក្រោម 0°C ក៏ដោយ ក៏នៅមានប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិមួយចំនួនរស់នៅដែរ។ ប្រឈមនឹងលក្ខខណ្ឌដ៏លំបាកៗនេះ ភាវៈរស់ទាំងនេះមានលក្ខណៈបន្ទុកទៅនឹងលក្ខខណ្ឌជីវិត។



31. តើកត្តាអ្វីដែលបណ្តាលឱ្យមានដំណើរវិវត្ត?

- ការបង្កើតកូនចៅហ្មសប្រមាណ និងជម្រើស។

32. តើអណ្តើកប្រភេទណាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយធម្មជាតិ?

- អណ្តើកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយធម្មជាតិ ជាអណ្តើកមួយចំនួនក្នុងចំណោមកូនអណ្តើកជាច្រើន(បានពីការបង្កើតកូនចៅហ្មសប្រមាណ) ដែលហែលផ្លាស់ទីលឿន (មានបម្រែបម្រួល) និងអាចគេចផុតពីសត្រូវ (ជម្រើស) ដែលធ្វើឱ្យវាអាចរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបាន។

33. ចូរសង្ខេបគំនិតសំខាន់ៗនៃទ្រឹស្តីវិវត្តន៍របស់ដាវីន។

- គំនិតសំខាន់ៗនៃទ្រឹស្តីវិវត្តន៍របស់ដាវីនមានដូចជា៖
 - ភាវៈរស់មានបម្រែបម្រួល គឺមានលក្ខណៈថ្មីកើតឡើង។
 - ភាវៈរស់បង្កើតកូនចៅច្រើនលើសលុប បណ្តាលឱ្យភាវៈរស់មានការប្រជែងគ្នា ដើម្បីរស់និងបន្តពូជ។
 - ភាវៈរស់ដែលមានបម្រែបម្រួលមានប្រយោជន៍អាចបន្ស៊ាំទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅ និងបន្តពូជ ហើយបញ្ចូលលក្ខណៈរបស់ខ្លួនទៅសន្តានក្រោយ។ ឆ្លងកាត់រយៈពេលដ៏យូរ បម្រែបម្រួលមានប្រយោជន៍ ផ្តុំទុកក្នុងពូជ ឬប្រភេទភាវៈរស់ថ្មី។

34. នៅឆ្នាំ1940 DDTបានត្រូវប្រើជាលើកទី1ក្នុងការសម្លាប់សត្វមូសដើម្បីកំចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់។ ជាដំបូង វាមានប្រសិទ្ធិភាពណាស់ ប៉ុន្តែបន្ទាប់មក គេសង្កេតឃើញថា វាមិនសូវមានប្រសិទ្ធិភាពទៀតទេ។ គេពន្យល់ថាមូសមានភាពធន់នឹងDDT។ តើភាពធន់នេះកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?

- ភាពធន់នឹងថ្នាំDDTគឺមកពីមានបម្រែបម្រួលលេចឡើងនូវលក្ខណៈធន់នឹងDDT ដែលធ្វើឱ្យសត្វមូសអាចរស់រានមានជីវិត បន្តពូជ ហើយបញ្ចូលលក្ខណៈនេះទៅសន្តានក្រោយ។ ចំណែក ឯមូសមិនធន់នឹងDDTត្រូវងាប់ដោយDDT។ ដូច្នេះ កន្លងមកមានមូសធន់នឹងDDT កាន់តែច្រើន។

35. តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលមជ្ឈដ្ឋានផ្លាស់ប្តូរ?

- នៅពេលមជ្ឈដ្ឋានផ្លាស់ប្តូរ ភាវៈរស់ដែលមិនអាចបន្ស៊ាំនឹងមជ្ឈដ្ឋានថ្មីនឹងត្រូវវិនាស តែមានភាវៈរស់មួយចំនួនអាចមានបម្រែបម្រួលលេចឡើងនូវលក្ខណៈថ្មី។ ក្នុងចំណោមលក្ខណៈថ្មីទាំងនោះ អាចមានលក្ខណៈដែលធ្វើឱ្យភាវៈរស់បន្ស៊ាំនឹងលក្ខខណ្ឌជីវិតថ្មី។



36. តើមូលហេតុអ្វីដែលនាំឱ្យមានបម្រែបម្រួល?

- មូលហេតុដែលនាំឱ្យមានបម្រែបម្រួលគឺ៖
 - មុយតាស្យុង
 - បម្រែបម្រួលក្រុមស្នូម និងសែន
 - បន្សុំជាថ្មីនៃសែន។

37. តើមេរៀនប្រាសាទកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មនៃទីបំផុស?

- ពីមុន កាលមិនមានរោងចក្រ ទេសភាពនៅទីនោះមានពណ៌បៃតង មេរៀនមានពណ៌បៃតង លឿង អាចរស់នៅបន្តិចទៅនឹងផ្កា ឬ ស្លឹកឈើបាន ហើយបក្សីមិនសូវមើលឃើញទេ។ តែ ក្រោយមកដោយសារផ្សែងចេញពីរោងចក្រ ដើមឈើនិងស្លឹកឈើគ្របដណ្តប់ដោយធូលីពណ៌ ខ្មៅ។ មេរៀនពណ៌បៃតង ឬលឿងក៏ក្លាយជាចំណីបក្សី ព្រោះបក្សីងាយនឹងមើលឃើញ។ ពេល នោះ មានមុយតាស្យុងកើតឡើង ហើយបង្កើតមេរៀនប្រាសាទ។ មេរៀនប្រាសាទ អាច បន្សុំនឹងការរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានពណ៌បៃតង ដោយបក្សីមិនមើលឃើញ ដូច្នេះ មេរៀនប្រាសាទ រស់រានមានជីវិត ហើយមានជីវិត ហើយបន្តពូជ។ យូរឆ្នាំកន្លងមក គេឃើញភាគច្រើននៃមេរៀន មានពណ៌បៃតង។

38. ចូរប្រៀបធៀបជម្រើសដោយធម្មជាតិ និងជម្រើសដោយមនុស្ស។

- លក្ខណៈដូចគ្នា៖ បម្រែបម្រួលជាកត្តាដែលផ្តល់នូវលក្ខណៈថ្មីដល់ជម្រើសដោយធម្មជាតិ និង ជម្រើសដោយមនុស្ស។

លក្ខណៈខុសគ្នា

ជម្រើសដោយធម្មជាតិ	ជម្រើសដោយមនុស្ស
• ភាវៈរស់ណាមានបន្ទុកលើនិងលក្ខខណ្ឌជីវិតរស់ នៅក្នុងធម្មជាតិ វាអាចរស់រានមានជីវិត និងបន្ត ពូជបាន ហើយបញ្ចូលលក្ខណៈរបស់វាទៅសន្តាន ក្រោយ។	• មនុស្សជ្រើសរើសតែលក្ខណៈណាដែលតម្រូវទៅ នឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួន។



ជំពូកទី៦ ការវិវត្តនៃការរស់

មេរៀនទី២ ភស្តុតាងនៃការវិវត្ត


1. តើភស្តុតាងអ្វីខ្លះដែលបញ្ជាក់ថាភាវៈរស់មានការវិវត្ត?

➢ ភស្តុតាងនៃការវិវត្តរបស់ភាវៈរស់មាន៖

- ផ្លូស៊ីល
- អំប្រឹយ៉ុងនៃសត្វប្រភេទផ្សេងៗគ្នា និង
- ភាពដូចគ្នានៃរូបផ្តុំសារពាង្គកាយ។

2. តើការសង្កេតពីការលូតលាស់អំប្រឹយ៉ុងនៃសត្វឆ្កិឯកដងផ្សេងៗនៅដំណាក់ដំបូងនាំឱ្យយើងសន្និដ្ឋាន ដូចម្តេច?

➢ យើងសង្កេតឃើញថា នៅដំណាក់កាលលូតលាស់ដំបូងនៃអំប្រឹយ៉ុងរបស់សត្វឆ្កិឯកដងទាំងប្រាំថ្នាក់ មានលក្ខណៈដូចគ្នាគឺមានកន្ទុយ ពង្រាងអន់យវៈ រង្វះស្រកីនៅសងខាងដើមក។ ដូចនេះយើងសន្និដ្ឋានថាគ្រប់ប្រភេទនៃសត្វឆ្កិឯកដងមានបុព្វន្ឋមតែមួយ។



3. តើមានភស្តុតាងអ្វីខ្លះដែលបញ្ជាក់ថាភាវៈរស់មានការវិវត្តចេញពីបុព្វន្ឋមតែមួយ?

➢ ភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាភាវៈរស់មានការវិវត្តចេញពីបុព្វន្ឋមតែមួយគឺ៖

- ផ្លូស៊ីល (ផ្លូស៊ីលបង្ហាញថាភាវៈរស់សម័យដើមមានលក្ខណៈខុសពីភាវៈរស់សព្វថ្ងៃ)



- ការលូតលាស់នៃអំប្រើយ៉ុងប្រភេទសត្វផ្សេងៗគ្នា (អំប្រើយ៉ុងសត្វឆ្កែកងទាំងប្រាំថ្នាក់ មានកន្ទុយ ពង្រាងអវយវៈ រង្វះស្រកី ខ្នងឆ្អឹងខ្នងជាដើម)
- ភាពដូចគ្នានៃរូបផ្គុំសារពាង្គកាយ។ សារពាង្គកាយទាំងអស់សុទ្ធតែកើតពីកោសិកា និង មានស៊ីមេន្តរីបខាង ឆ្អឹងខ្នង លលាដឹក្សាល ខ្នងក្បាល ខ្នងឆ្អឹងខ្នង និងអវយវៈ។

4. ដូចម្តេចដែលហៅថាសរីរាង្គអម្ពិទ្ធភ័យ? ចូររកឧទាហរណ៍។

- សរីរាង្គអម្ពិទ្ធភ័យ គឺជាសរីរាង្គដែលមាននាទីខុសគ្នា ប៉ុន្តែមានរូបផ្គុំដូចគ្នានៅក្នុងប្លង់តែមួយ ហើយមានប្រភពតែមួយនៅក្នុងដំណាក់កាលអំប្រើយ៉ុង។
- ឧទាហរណ៍៖ អវយវៈមុខ អវយវៈក្រោយ សំណុំខ្នងក្បាលសត្វឆ្កែកង។



5. ដូចម្តេចដែលហៅថាសរីរាង្គអាណាទ័យ? ចូររកឧទាហរណ៍។

- សរីរាង្គអម្ពិទ្ធភ័យគឺជាសរីរាង្គដែលមាននាទីដូចគ្នា ប៉ុន្តែមានរូបផ្គុំនិងទម្រង់ខាងក្នុងខុសគ្នា។
- ឧទាហរណ៍៖ ស្លាបប្រជៀវ និងស្លាបមេអំបៀ។

6. ហេតុអ្វីបានជាគេថាអវយវៈមុខរបស់សត្វឆ្កែកងទាំង៥ថ្នាក់ជាសរីរាង្គអម្ពិទ្ធភ័យ?

- ព្រោះអវយវៈទាំងនោះផ្គុំឡើងដោយផ្នែកឆ្អឹងដូចគ្នា ហើយស្ថិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយ។ នៅដំណាក់ កាលអំប្រើយ៉ុង ឆ្អឹងទាំងនោះមានដើមកំណើតពីពង្រាងដូចគ្នា។

7. ហេតុអ្វីបានជាគេអាចសន្និដ្ឋានថា ថ្នាក់ត្រី ថ្នាក់កង្កែប (អំពីបីយាង) ថ្នាក់ល្អិត ថ្នាក់បក្សី ថ្នាក់ថនិកសត្វ មានទំនាក់ទំនងស្របគ្នាជាមួយគ្នា ឬមានបុព្វនុម?

- អំប្រើយ៉ុងនៃសត្វទាំងប្រាំថ្នាក់នៅដំណាក់កាលដំបូងមានរូបរាងដូចគ្នា គឺមានកន្ទុយ រង្វះស្រកី



ពួកវាខ្លាំង...។ ការសិក្សាពីរូបផ្គុំនៃសារពាង្គកាយទាំង៥ថ្នាក់ បង្ហាញពីសរីរាង្គអ្នកម៉ូឡូក ដូចជាអវយវៈ មុខ អវយវៈក្រោយ និងប្រព័ន្ធប្រសាទជាដើម។ ដើម្បីរកទំនាក់ទំនងស្របឡាយរវាងប្រភេទផ្សេងៗ នៃភាវៈរស់ គេសិក្សាប្រៀបធៀបម៉ូលេគុលADN និងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនរបស់ភាវៈរស់ទាំងអស់។ ភាវៈ រស់ដែលមានទំនាក់ទំនងស្របឡាយជិត តែងតែមានតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតក្នុងម៉ូលេគុលADN និង តំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេដូចគ្នាច្រើន។

8. ដើម្បីកំណត់រកទំនាក់ទំនងស្របឡាយរវាងប្រភេទភាវៈរស់ផ្សេងៗ តើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រើ វិធីសាស្ត្រអ្វី?

- ធ្វើការប្រៀបធៀបម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន និងម៉ូលេគុលADNនៃប្រភេទភាវៈរស់ផ្សេងៗ។

9. ទម្រង់អាំងស៊ុយលីនក្នុងថ្នាក់ថេនិកសត្វខុសគ្នាដូចម្តេច?

- ទម្រង់អាំងស៊ុយលីនក្នុងថ្នាក់ថេនិកសត្វមានតំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេដូចគ្នា ពីប្រភេទមួយទៅ ប្រភេទមួយទៀតខុសគ្នាតែអាស៊ីតអាមីនេទី៨ ទី៩ និងទី១០។

10. ហេតុអ្វីបានជាគេថាអាំងស៊ុយលីននៃប្រភេទផ្សេងៗក្នុងថ្នាក់ថេនិកសត្វជាម៉ូលេគុលអ្នកម៉ូឡូក?

- បានជាគេថាអាំងស៊ុយលីននៃប្រភេទផ្សេងៗក្នុងថ្នាក់ថេនិកសត្វជាម៉ូលេគុលអ្នកម៉ូឡូក ព្រោះវាមាន ទម្រង់ និងនាទីដូចគ្នា។

11. តើកត្តាអ្វីខ្លះ ដែលធ្វើឱ្យកើតមានប្រភេទថ្មីៗ?

- កត្តាដែលធ្វើឱ្យកើតមានប្រភេទថ្មីៗគឺ៖
 - កត្តារបាំងភូមិសាស្ត្រ (ទឹកកក ភ្នំភ្លើង ដៃសមុទ្រ)
 - កត្តារបាំងជីវសាស្ត្រ

12. ប្រសិនបើឯកត្តៈពីរក្រុមក្នុងពួកតែមួយដាច់ចេញពីគ្នាដោយកត្តាភូមិសាស្ត្រ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង?

- ប្រសិនបើឯកត្តៈពីរក្រុមក្នុងពួកតែមួយដាច់ចេញពីគ្នាដោយកត្តាភូមិសាស្ត្រ នោះនឹងមានជម្រើស ដោយធម្មជាតិកើតឡើងទៅលើក្រុមនីមួយៗក្នុងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗ។ ក្រុមនីមួយៗមានបម្រែបម្រួល មជ្ឈដ្ឋានរៀងៗខ្លួន។ ឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏យូរមក ក្រុមទាំងនេះមានលក្ខណៈខុសៗគ្នា កាន់តែច្រើន ឡើង។ ក្រុមទាំងនោះមិនអាចមានទំនាក់ទំនង ហើយធ្វើការបន្តពូជជាមួយគ្នាបាន វាក្លាយជាប្រភេទថ្មី ផ្សេងពីគ្នា។



13. ហេតុអ្វីបានជាបំពង់ភូមិសាស្ត្រអាចធ្វើឱ្យកើតមានពពួកថ្មីៗ?

- កាលណាមានបំពង់ភូមិសាស្ត្រ ពពួកផ្សេងៗត្រូវបែកចេញពីគ្នា ហើយមិនអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា។ ក្រោមឥទ្ធិពលនៃជម្រើសដោយធម្មជាតិ ពពួកមានលក្ខណៈបន្ទុំទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានរៀងៗ ខ្លួន។ ឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏យូរមក ពពួកទាំងនេះមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងៗ ហើយធ្វើការបន្តពូជជាមួយគ្នាបាន វាក្លាយជាប្រភេទថ្មីផ្សេងពីគ្នា។

14. តើរបាំងជីវសាស្ត្រជាអ្វី?

- របាំងជីវសាស្ត្រ ជាបំពង់បន្តពូជរវាងឯកត្តៈពីរក្រុម ដែលបណ្តាលឱ្យកើតមាននូវប្រភេទថ្មីៗ។

15. តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យមានរបាំងជីវសាស្ត្រ?

- កត្តាដែលធ្វើឱ្យមានរបាំងជីវសាស្ត្រមានដូចជា៖
 - ឯកត្តៈមានរូបរាង និងទំហំប្រដាប់បន្តពូជខុសគ្នា
 - ឯកត្តៈធ្វើការបន្តពូជនៅរដូវ និងខែខុសគ្នា
 - ការទាក់ទាញរវាងសត្វញី និងសត្វឈ្មោល ដើម្បីធ្វើការបន្តពូជមានរបៀបខុសគ្នា។
 - ការម៉ែតញី និងការម៉ែតឈ្មោលនៃប្រភេទខុសគ្នាមិនអាចរលាយចូលគ្នាបានទេ។

16. តើសរីរាង្គមិនលូតលាស់នៃភាវៈរស់អាចបញ្ជាក់ថាមានទំនាក់ទំនងនឹងការវិវត្តក្នុងចំណោមសារពាង្គកាយដូចម្តេច? ចូរពន្យល់។

- ក្រៅពីសរីរាង្គរួមម៉ូឡូក សរីរាង្គមិនលូតលាស់ក៏ជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាភាវៈរស់មានការវិវត្តផងដែរ។
- សរីរាង្គមិនលូតលាស់ ជាសរីរាង្គដែលរុញក្រិន និងគ្មាននាទីអ្វីឡើយ។ ចំពោះបុព្វសត្វឆ្ងាយ សរីរាង្គទាំងនោះលូតលាស់ ហើយបំពេញនាទីមួយក្នុងការរស់នៅ។ ឆ្លងកាត់ការវិវត្ត ដើម្បីបន្តនឹងមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅ សរីរាង្គដែលមិនប្រើប្រាស់ក្លាយជារូញខ្លី ហើយក្រិន និងគ្មាននាទីអ្វីឡើយ។
- ឧទាហរណ៍៖ សរីរាង្គមិនលូតលាស់របស់មនុស្ស មានឆ្អឹងកញ្ចក់ និងខ្លែងពោះរៀន។




ជំពូកទី៦ ការវិវត្តនៃការរស់

មេរៀនទី៣ កំណត់ត្រាផូស៊ីល

1. តើផូស៊ីលជាអ្វី?

- ផូស៊ីល ជាស្លាកស្នាមឬ សំណល់ភាវៈរស់ជំនាន់ដើម ដែលបានបន្សល់ទុកក្នុងស្រទាប់សិលា។



2. តើភាវៈរស់អាចបន្សល់ទុកអ្វីខ្លះជាផូស៊ីល?

- ភាវៈរស់អាចបន្សល់ទុកផូស៊ីលក្រោមទម្រង់ជា៖
 - ឆ្អឹង
 - គម្របសារពោធិកាយ(សំបកសិប្បីសត្វ) ឬ
 - រាងកាយទាំងមូល(ក្នុងករណីជាប់ក្នុងទឹកកក)។




3. តើកម្ទេចកំណ(Sedimentary)ជាអ្វី?

- កម្ទេចកំណ ជាភាគល្អិតនៃដីឬ សិលាដែលទឹកស្ទឹងឬ ទឹកទន្លេហូរនាំទៅចាក់នៅបាតបឹង ឬបាតសមុទ្រ។



4. តើសារពាង្គកាយមួយក្លាយជាថ្ម ឬផ្លុស៊ីលតាមរបៀបដូចម្តេច?

- សារពាង្គកាយមួយក្លាយជាថ្ម ឬផ្លុស៊ីលដោយសារមានសារធាតុខនិជដែលរលាយក្នុងទឹកស្រួបចូលក្នុងសំណល់នៃសារពាង្គកាយនោះបន្តិចម្តងៗ។ សារធាតុខនិជទាំងនោះ នឹងជំនួសសំណល់នៃសារពាង្គកាយ បន្តិចម្តងៗ ហើយប្លែងទៅជាថ្មហើយក្លាយទៅជាផ្លុស៊ីល។



5. តើពុម្ពក្រៅកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច? ឬ ចូរពណ៌នាពីការកើតពុម្ពក្រៅ។

- ពុម្ពក្រៅកើតឡើងនៅពេលដែលភាវៈរស់មួយងាប់ ហើយធ្លាក់ចូលទៅបាតបឹង ឬបាតសមុទ្រហើយវាកប់ជាប់ នៅក្នុងកំទេចកំណា។ បន្ទាប់មកសារពាង្គកាយនោះរលួយ ហើយបន្សល់ទុកតែពុម្ពដែលបង្ហាញពីរូបរាងនៃភាវៈរស់ទាំងនោះ។ ពុម្ពទេវនេះជាពុម្ពក្រៅ។



6. តើពុម្ពក្នុងកកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច? ឬ ចូរពណ៌នាពីការកកើតពុម្ពក្នុង។

- ពុម្ពក្នុងកកើតឡើងដោយមានកំទេចកំណាត់មកបំពេញពុម្ពក្រៅ ហើយស្ទួនបានជារូបរាងសារពាង្គកាយនៃរាង្សៈរស់។



7. ជាទូទៅ តើផ្លុស៊ីលមានកំណើតនៅឯណា?

- ផ្លុស៊ីលកកើតឡើងនៅក្នុងសិលាកម្ទេចកំណា។

8. ហេតុអ្វីបានជាផ្លុស៊ីលខ្លះត្រូវបានគេអាចរកឃើញនៅលើភ្នំដែរ?

- ផ្លុស៊ីលខ្លះអាចរកឃើញនៅលើភ្នំដោយសារចលនានៃសំបកផែនដី ដែលនាំឱ្យកកើតភ្នំ។

9. តើក្នុងករណីណាដែលផ្លុស៊ីលអាចត្រូវបានរក្សាទុកជាសារពាង្គកាយទាំងមូល?

ករណីដែលផ្លុស៊ីលអាចត្រូវបានរក្សាទុកជាសារពាង្គកាយទាំងមូលគឺដោយសារ វាជាប់នៅក្នុងជ័រឥដ្ឋជាតិ ឬកប់នៅក្នុងទឹកកក។ ឧទាហរណ៍៖ កង្កែប និងសត្វល្អិតដែលមានរាងដូចក្តៅបង្កប់ជាប់ក្នុងជ័រឥដ្ឋជាតិ។ សាកសពជំនីរម៉ាម៉ុត (Mammoth) បានកប់នៅក្នុងទឹកកកដោយរក្សាសាច់នៅស្រស់ដដែល។





10. តើគេត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឱ្យដឹងថា ភាវៈរស់ណាមួយកើតមុន ហើយភាវៈរស់ណាកើតក្រោយ?


- ដើម្បីឱ្យដឹងថា ភាវៈរស់ណាមួយកើតមុន ហើយភាវៈរស់ណាកើតក្រោយ គឺយើងត្រូវកំណត់អាយុរបស់ផ្លុស៊ីល។

11. តើគេអាចកំណត់អាយុរបស់ផ្លុស៊ីលតាមរបៀបដូចម្តេច?

- គេអាចកំណត់អាយុរបស់ផ្លុស៊ីលតាមស្រទាប់សិលា និងតាមសារធាតុវិទ្យុសកម្ម។

12. ដោយផ្អែកលើស្រទាប់របស់សិលា តើគេអាចកំណត់អាយុរបស់ផ្លុស៊ីលយ៉ាងដូចម្តេច?

- ផ្អែកលើស្រទាប់របស់សិលា ស្រទាប់ក្រោមជាស្រទាប់ដែលចាស់ជាងគេ។



13. តើការកំណត់អាយុតាមស្រទាប់សិលាអាចឱ្យយើងដឹងពីអាយុជាក់លាក់មួយបានឬទេ?

- មិនបានទេ វិធីនេះអាចត្រឹមតែឱ្យយើងប្រៀបធៀបអាយុផ្លុស៊ីលប៉ុណ្ណោះ។

14. តើសារធាតុវិទ្យុសកម្ម(radioactive substances)ជាអ្វី?

- សារធាតុវិទ្យុសកម្ម ជាសារធាតុដែលគ្មានស្ថេរភាព វាអាចបំបែកនិងបំប្លែងជាសារធាតុមួយផ្សេងទៀត។
- ឧទាហរណ៍៖ រាដ្យូមជាសារធាតុវិទ្យុសកម្ម វាអាចបំបែកហើយបំប្លែងជាសំណា។

15. ចូរពណ៌នាពីរបៀបកំណត់អាយុផ្លុស៊ីលតាមសារធាតុវិទ្យុសកម្ម(Radiometric Dating)។

- សារធាតុវិទ្យុសកម្មអាចបំបែកហើយបំប្លែងជាសារធាតុមួយទៀត ហើយល្បឿននៃការបំបែកនេះថេរដោយមិនទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌនៃមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅទេ។ ក្នុងការកំណត់អាយុសិលា ឬផ្លុស៊ីល គេអាចគណនា រយៈពេលនៃការបំបែកសារធាតុវិទ្យុសកម្មដែលមាននៅក្នុងផ្លុស៊ីល ឬសិលានោះ។ ឧទាហរណ៍៖ ផ្លុស៊ីល គេអាចគណនារយៈពេលនៃការបំបែក C^{14} ។ គេប្រៀបធៀបផលធៀប C^{14}/C^{12}



នៅក្នុងផ្លូវស៊ីល និងក្នុងបរិយាកាស។ បើផលធៀបនៅក្នុងផ្លូវស៊ីលស្ទើរនឹងពាក់កណ្តាលនៃផលធៀប
ក្នុងបរិយាកាស នោះផ្លូវស៊ីលមានអាយុ៥៧៣៥ឆ្នាំ។

16. តើការកំណត់អាយុផ្លូវស៊ីលតាមស្រទាប់សិលា និងតាមសារធាតុវិទ្យុសកម្មខុសគ្នាដូចម្តេច?

- ការសិក្សាតាមស្រទាប់សិលាអាចឱ្យគេធ្វើការប្រៀបធៀបអាយុផ្លូវស៊ីលដែលគេរកឃើញក្នុង
ស្រទាប់ផ្សេងៗនៃសិលាកម្ទេចកំណា។ វិធីកំណត់អាយុផ្លូវស៊ីលតាមសារធាតុវិទ្យុសកម្មអាចឱ្យគេ
កំណត់អាយុផ្លូវស៊ីលនីមួយៗបានដោយគណនារយៈពេលនៃការបំបែកសារធាតុវិទ្យុសកម្ម។ វិធីនេះ
មានលក្ខណៈជាក់លាក់ជាងការកំណត់តាមស្រទាប់សិលា។

17. តើផ្លូវស៊ីលមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះ?

- ផ្លូវស៊ីលមានប្រយោជន៍ដូចតទៅ៖
 - ផ្លូវស៊ីលអាចឱ្យយើងស្គាល់ប្រវត្តិនៃការវិវត្តរបស់រាវៈរស់គឺ ការកកើត ការរីកចម្រើន និង
ការវិនាសបាត់បង់ទៅវិញនៃប្រភេទរាវៈរស់នីមួយៗ។
 - ផ្លូវស៊ីលធ្វើឱ្យយើងស្គាល់ប្រវត្តិរបស់ផែនដី ដែលបង្ហាញនូវលក្ខណៈអាកាសធាតុនាសម័យ
កាលនីមួយៗ។

18. តើកំណត់ត្រាផ្លូវស៊ីលជាអ្វី? (Fossil record)?

- កំណត់ត្រាផ្លូវស៊ីល គឺជាចំនួនផ្លូវស៊ីលរាប់លានដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រមូលបាន។

19. តើគេអាចស្គាល់ប្រវត្តិផែនដីបានដោយសារអ្វី?

- គេអាចស្គាល់ប្រវត្តិផែនដីបានដោយសារផ្លូវស៊ីល ដោយសំអាងទៅលើលក្ខខណ្ឌជីវិតនៃ
ភេទផ្លូវស៊ីលកាលវាមានជីវិត។ ឧទាហរណ៍៖ គេដឹងថា កាលសម័យដើមតំបន់គោកសព្វថ្ងៃនេះ ជាតំបន់
គ្របដណ្តប់ដោយសមុទ្រ ព្រោះគេរកឃើញផ្លូវស៊ីលនៅក្នុងតំបន់នោះដែលជាសត្វរស់នៅក្នុងទឹក
ប្រែ។
- សព្វថ្ងៃគេអាចរកឃើញធូលីផ្លូវស៊ីលនៅតំបន់អាកាសធាតុត្រជាក់ គេឃើញផ្លូវស៊ីលរុក្ខជាតិជាច្រើនជា
ពិសេសរុក្ខជាតិដូចជាប្រក់ជិតជាប់នឹងធូលីផ្លូវស៊ីល។ ត្រង់នេះបញ្ជាក់ថា នៅតំបន់នេះកាលពីដើមមាន
អាកាសធាតុក្តៅ ហើយសើម ពីព្រោះរុក្ខជាតិដុះលូតលាស់ល្អក្នុងអាកាសធាតុក្តៅហើយសើម។



ជំពូកទី៧ ពពួក និងសហគមន៍

មេរៀនទី១ ពពួក

1. តើសារពាង្គកាយនីមួយៗលើផែនដីនេះអាចរស់នៅក្នុងទីស្ថានរបស់ខ្លួនដោយឯកឯងបានទេ?

- សារពាង្គកាយនីមួយៗលើផែនដីនេះមិនអាចរស់នៅក្នុងទីស្ថានរបស់ខ្លួនដោយឯកឯងបានទេ។ ពួកវាត្រូវរស់នៅជាក្រុម ហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាជានិច្ច។

2. តើពពួកជាអ្វី? ចូររកឧទាហរណ៍។

- ពពួក គឺជាសារពាង្គកាយមួយក្រុមដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទតែមួយ និងរស់នៅក្នុងតំបន់មួយទៅតាមពេលវេលាកំណត់។
- ឧទាហរណ៍៖ សត្វព្រាបនៅទីក្រុងជាពពួកមួយ។ សត្វពស់ថ្លាន់មួយហ្វូងរស់នៅក្នុងរូងដីជាពពួកមួយ។

3. តើប្រភេទជាអ្វី? ចូររកឧទាហរណ៍។

- ប្រភេទ ជាសារពាង្គកាយដែលមានរូបរាងស្រដៀងគ្នា ហើយអាចបង្កាត់ពូជ បង្កើតកូនចៅជំនាន់ក្រោយ ហើយកូនចៅនោះក៏អាចបន្តពូជទៅទៀតបាន។
- ឧទាហរណ៍៖ សត្វព្រាបជាប្រភេទមួយ។ មនុស្សជាប្រភេទមួយ។

4. តើក្នុងព្រៃមួយ អាចមានពពួកតែមួយរស់នៅដែរឬទេ? ហេតុអ្វី?

- ក្នុងព្រៃមួយ មិនមានពពួកតែមួយរស់នៅទេ ព្រោះដើមឈើទាំងអស់មានច្រើនប្រភេទ។

5. តើក្នុងត្រពាំងមួយអាចមានពពួកតែមួយរស់នៅដែរឬទេ? ហេតុអ្វី?

- ក្នុងត្រពាំងមួយ មិនមានពពួកតែមួយរស់នៅទេ ព្រោះនៅក្នុងត្រពាំងមានសត្វ និងរុក្ខជាតិរស់នៅជាច្រើនប្រភេទ ដូចជាត្រី ពស់ កង្កែប ព្រលិត រំចង់ សាឡាយជាដើម។

6. ឧបមាថា បើក្នុងបឹងមួយមានសត្វត្រីអណ្តែង តើវាស្ថិតនៅក្នុងពពួកមួយឬទេ?

(ករណី គេចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែង)

- បើក្នុងបឹងមួយមានសត្វត្រីអណ្តែង វាគឺជាពពួកមួយ ព្រោះវាមានរូបរាងដូចគ្នា ហើយអាចបង្កាត់ជាមួយគ្នាបានកូនដែលអាចបន្តពូជបង្កើតកូនចៅជាមួយគ្នាបន្តទៀតបាន។

7. បើនៅក្នុងទំហំដីដាំដំណាំមួយ មានសត្វត្រីអណ្តែង តើវាជាពពួកមួយឬទេ?

- វាជាពពួកមួយ (ពពួកត្រីអណ្តែង) ព្រោះគ្មានប្រភេទផ្សេងរស់នៅជាមួយទេ។



8. បើសត្វ និងរុក្ខជាតិផ្សេងៗនៅក្នុងបឹងមួយបង្កើតបានជាអ្វី?

- សត្វ និងរុក្ខជាតិផ្សេងៗនៅក្នុងបឹងមួយ បង្កើតបានជាសហគមន៍មួយ។

9. តើសហគមន៍ជាអ្វី? ចូររកឧទាហរណ៍។

- សហគមន៍ ជាពួកផ្សេងៗដែលរស់នៅក្នុងតំបន់មួយ ហើយមានអំពើទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមក។
- ឧទាហរណ៍: ប្រជាជនក្នុងភូមិមួយ សិស្សក្នុងសាលារៀនមួយ។

10. ក្នុងសហគមន៍មួយ តើពួកមានអំពើទៅលើគ្នាដើម្បីអ្វី?

- ដើម្បីជំនួញមកប្រយោជន៍រួម ដូចជាអាហារ ជម្រក និងការបន្តពូជជាដើម។

11. តើការប្រកួតប្រជែងក្នុងសហគមន៍ធ្វើឱ្យមានអ្វីកើតឡើង?

- ការប្រកួតប្រជែងក្នុងសហគមន៍ ធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទំហំពួក។

12. ក្រៅពីការប្រកួតប្រជែង តើទំហំនៃពួកអាចផ្លាស់ប្តូរទៅតាមកត្តាអ្វីទៀត?

- អាចផ្លាស់ប្តូរទៅតាមសម័យកាល និងការវិវត្តរបស់ភាវវត្ថុជាដើម។

13. ដើម្បីកំណត់ទំហំនៃពួក តើអ្នកអេកូឡូស៊ីបានប្រើប្រាស់វិធីអ្វីខ្លះ?

- ដើម្បីកំណត់ទំហំនៃពួក គេអាចប្រើវិធីជាច្រើនដូចជា៖
 - ការសង្កេតផ្ទាល់ ឬមិនផ្ទាល់
 - ការប៉ាន់ស្មាន និង
 - ការដោទុកហើយចាប់មកវិញ ជាដើម។

14. តើការសង្កេតផ្ទាល់ (ដើម្បីកំណត់ទំហំនៃពួក)ជាអ្វី? ចូររកឧទាហរណ៍។

- ការសង្កេតផ្ទាល់ គឺជាការរាប់ចំនួនសមាជិកទាំងអស់ក្នុងពួកមួយ។
- ឧទាហរណ៍: ការរាប់ចំនួនក្តាមក្នុងស្រះដើម្បីកំណត់ទំហំពួកនៃក្តាម គឺត្រូវសង្កេតដោយផ្ទាល់។

15. ដើម្បីកំណត់ទំហំនៃពួកមួយក្នុងតំបន់ធំ តើគេប្រើវិធីអ្វី?

- គេប្រើប្រាស់ការសង្កេតមិនផ្ទាល់ ដែលងាយស្រួលជាងការរាប់ចំនួនក្នុងការសង្កេតផ្ទាល់។

16. ចូរពន្យល់ពីការសង្កេតមិនផ្ទាល់ទៅលើការរាប់ សំបុកត្រចៀកកាំដែលមាននៅដើមឈើមួយ និងនៅក្នុងព្រៃមួយ។

- គេពិនិត្យសំបុកត្រចៀកកាំ ដែលសង់ឡើងដោយសត្វត្រចៀកកាំ។ ក្នុងសំបុកមួយមានរន្ធមួយ។



ឧបមាថា ក្នុងសំបុកមួយមានសត្វ4គឺ មេបាមួយគូ និងកូនពីរ។ បើសិន ជាមានសំបុក120ក្នុងដើម ឈើមួយ នោះនាំឱ្យចំនួនសត្វត្រចៀកកាំទាំងអស់គឺ $120 \times 4 = 480$ ក្បាល។

➢ បើក្នុងព្រៃមានដើមឈើ100ដើម នោះគេបានចំនួនសត្វត្រចៀកកាំគឺ $480 \times 110 = 48000$ ក្បាល។

17. តើគេប្រើមធ្យោបាយអ្វី ដើម្បីកំណត់ទំហំពពួកក្នុងតំបន់មួយដែលលាតសន្ធឹងលើដីឈើ?

➢ ដើម្បីកំណត់ទំហំពពួកក្នុងតំបន់មួយដែលលាតសន្ធឹងលើដីឈើ គេត្រូវប៉ាន់ស្មាន។

18. ដើម្បីរាប់ចំនួនដើមឈើក្នុងព្រៃធំ តើគេប៉ាន់ស្មានយ៉ាងដូចម្តេច?

➢ ដើម្បីរាប់ចំនួនដើមឈើក្នុងព្រៃធំ ដំបូងគេត្រូវប៉ាន់ស្មានចំនួនដើមឈើក្នុងផ្ទៃដីមួយហិចតា រួច ហើយគុណនឹងក្រឡាផ្ទៃទាំងអស់។

➢ ឧទាហរណ៍៖ មួយហិចតាមានដើមកៅស៊ូ 300ដើម ដូចនេះចំនួនដើមកៅស៊ូ 1000មាន $300 \times 1000 = 300\ 000$ ដើម។

19. តើការប៉ាន់ស្មានជាអ្វី?

➢ ការប៉ាន់ស្មាន គឺជាការរាប់សមាជិកក្នុងតំបន់តូច ហើយគណនារកសមាជិកក្នុងតំបន់ធំ។

20. តើពេលណាគេប្រើវិធីប៉ាន់ស្មាន?

➢ នៅពេលដែលគេរាប់សមាជិកក្នុងតំបន់តូច ហើយគណនារកចំនួនសមាជិកក្នុងតំបន់ធំ។

21. ចូរពណ៌នាពីការដោទុកហើយចាប់មកវិញចំពោះសត្វអណ្តើក។

➢ របៀបចាប់អណ្តើក ដោទុកហើយចាប់មកវិញគឺ៖ គេចាប់អណ្តើកក្នុងសមុទ្រ បន្ទាប់មកគេលាប ថ្នាំពណ៌នៅលើស្បែករបស់វាមុននឹងលែងវាទៅក្នុងសមុទ្រវិញ។ ប៉ុន្មានអាទិត្យក្រោយមក គេត្រលប់ មកចាប់អណ្តើកឡើងវិញ ហើយរាប់ចំនួនអណ្តើកដែលបានដោទុកហើយ និងសត្វដែលមិនបាន ដោទុក។ ដោយប្រើរូបមន្តគណិតវិទ្យា គេអាចរាប់ប៉ាន់ស្មានអណ្តើកដែលមាននៅក្នុងសមុទ្រ។

22. តើមានកត្តាអ្វីដែលនាំឱ្យមានការប្រែប្រួលទំហំពពួក?

- កត្តាដែលនាំឱ្យមានការប្រែប្រួលទំហំពពួកមានដូចជា៖
 - ការកើត និងការស្លាប់
 - ចំណាកស្រុក និងចំណូលស្រុក។

23. តើទំហំនៃពពួកកើនឡើងនៅពេលណា?

➢ ទំហំនៃពពួកកើនឡើងនៅពេលដែលមានការចាប់កំណើត។



24. តើល្បឿនកំណើតនៃពពួកជាអ្វី?

- ល្បឿនកំណើតនៃពពួក ជាចំនួននៃការកើតក្នុងមួយម៉ែត្រមួយ។

25. ចូរពន្យល់ពីល្បឿនកំណើតនៃពពួកទន្សាយ។

- បើពពួកទន្សាយ 100ក្បាល បង្កើតបានកូន600ក្នុង1ឆ្នាំ នោះល្បឿនកំណើតគឺ600 ក្នុង1ឆ្នាំ។

26. តើការបន្ថយទំហំនៃពពួកបណ្តាលមកពីអ្វី?

- ការបន្ថយទំហំនៃពពួកគឺ បណ្តាលមកពីការស្លាប់។

27. តើល្បឿនការស្លាប់នៃពពួកជាអ្វី?

- ល្បឿនការស្លាប់នៃពពួក គឺជាចំនួនស្លាប់នៃភាវៈរស់នៅក្នុងពពួក ក្នុងមួយម៉ែត្រមួយ។

28. ចូរពន្យល់ពីល្បឿនការស្លាប់នៃពពួកទន្សាយ។

- បើពពួកទន្សាយ400ក្បាលស្លាប់ក្នុង1ឆ្នាំនៅក្នុងពពួករបស់វា នោះល្បឿននៃការស្លាប់គឺ400 ក្នុង1ឆ្នាំ។

29. កាលណាល្បឿននៃកំណើតធំជាងល្បឿននៃការស្លាប់ តើមានអ្វីកើតឡើង?

- កាលណាល្បឿននៃកំណើតធំជាងល្បឿននៃការស្លាប់ នាំឱ្យពពួកកើនឡើង។

30. កាលណាល្បឿននៃការស្លាប់ធំជាងល្បឿននៃការចាប់កំណើត តើមានអ្វីកើតឡើង?

- កាលណាល្បឿននៃការស្លាប់ធំជាងល្បឿននៃការចាប់កំណើត នាំឱ្យពពួកថយចុះ។

31. តើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្តាលឱ្យមានការចំណាកស្រុក?

- ការចំណាកស្រុកបណ្តាលមកពីកង្វះម្ហូបអាហារ។ ឧទាហរណ៍៖ បើសិនជាវាសស្លៀកមួយប្រែជាអស់ស្លៀក ដូចវាលមុន សមាជិកសត្វល្អិតត្រូវចាកចេញពីពពួកទៅរកវាលស្លៀកថ្មីទៀត។

32. ក្នុងខ្សែក្រាបបំលាស់ប្តូរទំហំនៃពពួកទន្សាយក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំ តើពីឆ្នាំទី4 ពពួកទន្សាយប្រែប្រួលដូចម្តេច?

- ពពួកទន្សាយកើនឡើង ព្រោះគ្មានទន្សាយដែលចាកចេញពីពពួក។

33. ក្នុងខ្សែក្រាបបំលាស់ប្តូរទំហំនៃពពួកទន្សាយក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំ តើពីឆ្នាំទី4ដល់ឆ្នាំទី10 ពពួកទន្សាយប្រែប្រួលដូចម្តេច?

- ពពួកទន្សាយថយចុះ ព្រោះមានទន្សាយភាគច្រើនដែលចាកចេញពីពពួក។



34. តើយើងអាចសន្និដ្ឋានដូចម្តេចទៅលើខ្សែក្រាបនេះ?

- គឺចំណាកស្រុក និងចំណូលស្រុកធ្វើឱ្យទំហំនៃពពួកប្រែប្រួល។

35. តើជង់ស៊ីតេនៃពពួកជាអ្វី?

- ជង់ស៊ីតេនៃពពួក ជាចំនួនឯកត្តៈដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ពិសេសមួយ។

36. តើគេអាចគណនាជង់ស៊ីតេនៃពពួកតាមរយៈអ្វី?

- តាមរយៈសមីការជង់ស៊ីតេពពួក។
- រូបមន្តជង់ស៊ីតេពពួក = $\frac{\text{ចំនួនឯកត្តៈ}}{\text{ផ្ទៃក្រឡាតំបន់}}$

37. ចូររកជង់ស៊ីតេពពួកសត្វក្រសារ បើក្នុងបឹងមួយមានដែលមានផ្ទៃ 8m^2 មានសត្វក្រសារចំនួន 20 ក្បាលរស់នៅ។

- ជង់ស៊ីតេពពួក = $20/8\text{m}^2$
ដូចនេះជង់ស៊ីតេពពួក = 2.50 សត្វក្រសារ / 1m^2

38. តើកត្តាកំណត់សម្រាប់ពពួកមួយមានអ្វីខ្លះ?

- កត្តាកំណត់សម្រាប់ពពួកមួយ មានដូចជា អាហារ ទឹក បរិយាកាស និងសីតុណ្ហភាព។

39. តើកត្តាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់ភ្នំរស់?

- កត្តាដែលសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់ភ្នំរស់ គឺអាហារ និងទឹក។

40. បើគ្មានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ទេ តើពពួកកើនឡើងដែរឬទេ?

- បើគ្មានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ទេ ពពួកមិនកើនឡើងទេ។

41. ក្នុងព្រៃមួយ តើដើមឈើទាំងអស់ដុះលូតលាស់ស្មើគ្នាដែរឬទេ? ហេតុអ្វី?

- ដើមឈើទាំងអស់ដុះលូតលាស់មិនស្មើគ្នាទេព្រោះដើមឈើធំៗអាចទទួលបានពន្លឺបានគ្រប់គ្រាន់។
ដើមឈើតូចៗដែលដុះនៅក្រោមដើមឈើធំៗទទួលបានពន្លឺមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេ។

42. តើកត្តាអាកាសធាតុអ្វីខ្លះដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើទំហំនៃពពួក?

- កត្តាអាកាសធាតុដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើទំហំនៃពពួកមានដូចជាសីតុណ្ហភាព និងទឹកភ្លៀង
ការចុះត្រជាក់ភ្លាមៗ ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង ឬ ទឹកជំនន់ដែលអាចសម្លាប់សារពាង្គកាយជាច្រើន
និងបំផ្លាញសំបុក ឬរន្ធក្នុងដីជាដើម។



ជំពូកទី៧ ពពួក និងសហគមន៍

មេរៀនទី២ អន្តរអំពើក្នុងចំណោមភាវសាស្ត្រ

1. តើបន្ទុំជាអ្វី?

- បន្ទុំ ជាការសម្របសម្រួលរបស់ភាវសាស្ត្រទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានដើម្បីរស់រានមានជីវិត និងបង្កើតកូនចៅជំនាន់ក្រោយ។

2. ហេតុអ្វីបានជាខ្លាឃ្មុំនៅប៉ូលមានរោមពណ៌ស ហើយក្រាស់?

- ខ្លាឃ្មុំនៅតំបន់ប៉ូលមានរោមពណ៌ស ក្រាស់សម្រាប់ទប់ទល់នឹងភាពត្រជាក់ និងអាចបាំងពីភ្នែករបស់សត្រូវ ឬសត្វដែលជាចំណីរបស់វា។

3. ហេតុអ្វីបានជាខ្លាឃ្មុំនៅអេក្វាទ័រមានរោមពណ៌ប្រផេះ ឬត្នោតនិងស្លឹក?

- នៅតំបន់អេក្វាទ័រ ខ្លាឃ្មុំប្រភេទដូចគ្នាមានរោមប្រផេះ ឬពណ៌ត្នោត និងមិនសូវក្រាស់ដែលស៊ាំទៅនឹងអាកាសក្ដៅ។

4. ហេតុអ្វីបានជាជង្គុវដែលស៊ីស្លឹកបន្លែ ភាគច្រើនមានពណ៌បៃតង?

- ជង្គុវដែលស៊ីស្លឹកបន្លែ ភាគច្រើនមានពណ៌បៃតង ព្រោះវាអាចការពារជង្គុវបំបាំងពីភ្នែកបក្សីដែលស៊ីវា។ ដូចនេះវាអាចរស់នៅបានយូរ និងធ្វើឱ្យសន្តានក្រោយសម្បុរ។

5. ក្រៅពីមានពណ៌ដូចស្លឹកឈើ តើជង្គុវអាចបន្លំខ្លួនតាមវិធីណាទៀត?

- ជង្គុវខ្លះអាចបន្លំខ្លួនជាមួយដើមឈើ ដោយធ្វើខ្លួនដូចជាកំណាត់ឈើកាលណាវាទំលើមែកឈើមួយ។

6. តើរុក្ខជាតិមានលក្ខណៈបន្ទុំអ្វីខ្លះដើម្បីទាក់ទាញសត្វល្អិត? តើមានប្រយោជន៍អ្វី?

- ដើម្បីទាក់ទាញសត្វល្អិត រុក្ខជាតិមានលក្ខណៈបន្ទុំជាច្រើនដូចជា៖
 - មានពណ៌ស្រស់ ភ្លឺផ្អែកៗ ក្លិនក្រអូប និងមានទឹកដមផ្អែម និងមានគ្រាប់លម្អ្អងធំៗស្អិតសម្រាប់ទាក់ទាញសត្វល្អិត។
 - វាមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើឱ្យមានដំណើររំលែកប្រព្រឹត្តទៅបានល្អ។



7. តើទំនាក់ទំនងរវាងភាវសម្ភារៈមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?

- ទំនាក់ទំនងរវាងភាវសម្ភារៈមានបីប្រភេទគឺ៖
 - ការប្រកួតប្រជែង
 - ការចាប់រំពា និង
 - សហប្រាណ។

8. តើការប្រកួតប្រជែងជាអ្វី?

- ការប្រកួតប្រជែង ជាការប្រយុទ្ធនៃរវាងសារពាង្គកាយដើម្បីប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់ ប្រភពរួមដូចគ្នាក្នុងការរស់នៅ។ វាជាការប្រយុទ្ធនៃរវាងសារពាង្គកាយដើម្បីប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់ ប្រភពរួមដូចគ្នាក្នុងការរស់នៅ។

9. តើការប្រកួតប្រជែងមានប៉ុន្មានបែប? អ្វីខ្លះ?

- ការប្រកួតប្រជែងមានពីរបែបគឺ៖
 - ការប្រកួតប្រជែងក្នុងប្រភេទ និង
 - ការប្រកួតប្រជែងក្នុងអន្តរប្រភេទ។

10. ចំពោះភាវៈរស់ក្នុងប្រភេទតែមួយ តើមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្តើមអ្វីខ្លះ?

- ការប្រកួតប្រជែងគ្នាចំពោះភាវៈរស់ក្នុងប្រភេទតែមួយ គឺដើម្បីដណ្តើមចំណី ជម្រក កន្លែងធ្វើសំបុក ដណ្តើមញីដើម្បីធ្វើការបន្តពូជ....។

11. ហេតុអ្វីបានជាភាវសម្ភារៈក្នុងប្រភេទដូចគ្នា ត្រូវការការប្រកួតប្រជែង?

- ភាវសម្ភារៈក្នុងប្រភេទដូចគ្នា ត្រូវការការប្រកួតប្រជែង ព្រោះពួកគេមានតម្រូវការដូចគ្នា។

12. តើការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំង កើតមាននៅពេលណា? ហេតុអ្វី?

- នៅពេលឯកត្តៈកាន់តែច្រើននោះតម្រូវការអាហារ ទឹក កាន់តែច្រើន...។

13. តើលោកហ្វូសបានធ្វើការពិសោធដូចម្តេចអំពីការប្រកួតប្រជែង?

- គាត់បានយកប៉ារ៉ាមេស៊ីពីរប្រភេទ គឺប៉ារ៉ាមេស៊ីអូរ៉េឡា និងប៉ារ៉ាមេស៊ីកូដាទុម ទៅដាក់នៅក្នុងបំពង់សាកមួយដែលមានបាក់តេរីដើម្បីឱ្យប៉ារ៉ាមេស៊ីទាំងពីរយកធ្វើជាអាហារ។ ប៉ុន្តែមានតែប៉ារ៉ាមេស៊ី អូរ៉េឡាទេដែលលូតលាស់ រីឯប៉ារ៉ាមេស៊ីកូដាទុមមិនអាចរស់បាន ត្រូវស្លាប់ ហើយពពួករស់



វាថយចុះ។

- នេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលបង្ហាញអំពីការប្រកួតប្រជែងដ៏ណ្ហើមអាហាររវាងប៉ារ៉ាមេស៊ីពីនប្រភេទ។

14. តើការប្រកួតប្រជែងអន្តរប្រភេទជាអ្វី? ចូរពន្យល់ ដោយលើកឧទាហរណ៍។

- ការប្រកួតប្រជែងអន្តរប្រភេទ ជាការប្រកួតប្រជែងដ៏ណ្ហើមលំអាំឋាន និងអាហាររវាងប្រភេទផ្សេងគ្នា។
- ឧទាហរណ៍៖ រុក្ខជាតិដំណាំដុះប្រកួតប្រជែងជាមួយស្លៅព្រៃ។ ខ្លា និងឆ្កែប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្តើមរំពា (ទន្សាយ..)

15. តើការចាប់រំពាជាអ្វី?

- ការចាប់រំពា ជាដំណើរដែលសារពាង្គកាយមួយស៊ីសារពាង្គកាយមួយទៀតជាអាហារ។

16. តើសត្វរំពាជាអ្វី?

- សត្វរំពា ជាសត្វដែលស៊ីសត្វមួយទៀតជាអាហារ។
- ឧទាហរណ៍៖ សត្វខ្លាជាសត្វរំពា (ស៊ីទន្សាយ)។

17. តើរំពាជាអ្វី?

- រំពា ជាសត្វដែលត្រូវគេស៊ីជាអាហារ។
- ឧទាហរណ៍៖ ទន្សាយជារំពា។

18. ហេតុអ្វីបានជាពពួកទន្សាយកើនឡើង ពពួកខ្លាខិនក៏កើនឡើងដែរ?

- ពពួកទន្សាយកើនឡើង ធ្វើឱ្យពពួកខ្លាខិនក៏កើនឡើងដែរ ព្រោះវាផ្តល់អាហារយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ខ្លាខិន។

19. ហេតុអ្វីបានជាពពួកទន្សាយថយចុះ?

- ពពួកទន្សាយថយចុះ ព្រោះខ្លាខិនស៊ីទន្សាយកាន់តែច្រើនធ្វើឱ្យអត្រានៃការស្លាប់របស់ទន្សាយខ្ពស់ជាងអត្រានៃការកើត ដូចនេះពពួកទន្សាយថយចុះ។



20. ហេតុអ្វីបានជាទន្ទឹមនឹងការថយចុះនៃពពួកទន្សាយ ពពួកខ្លាខិនក៏ថយចុះដែរ?

- កាលណាពពួកទន្សាយ ពពួកខ្លាខិនក៏ថយចុះដែរ ព្រោះពេលដែលពពួកទន្សាយថយចុះ ខ្លាខិនខ្វះអាហារ សត្វខ្លះចាកចេញពីពពួកដែលធ្វើឱ្យទំហំនៃពពួកខ្លាខិនថយចុះ។

21. នៅពេលដែលពពួកខ្លាខិនថយចុះ តើពពួកទន្សាយប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?

- ពពួកទន្សាយកើនឡើង។

22. តើលក្ខណៈបន្ស៊ាំរបស់សត្វរំពាមានអ្វីខ្លះ?

- លក្ខណៈបន្ស៊ាំរបស់សត្វរំពាមានដូចជា៖
 - ល្បឿនរត់បានលឿនរបស់ខ្លាខិន។
 - ប្រមោយផ្អែកសារធាតុពុលនៃត្រីសមុទ្រដែលអាចសម្លាប់រំពា។
 - ចំពុះមាំកោង ហើយស្រួចនិងក្រញាំស្រួចនៃបក្សីម៉ែសាសី។
 - បក្សីរកស៊ីពេលយប់អាចមើលឃើញក្នុងទីងងឹត។
 - បន្លាស្អិតនៅលើមែក ស្លឹក សម្រាប់ចាប់សត្វល្អិតតូចៗនៃរុក្ខជាតិខ្លះ។

23. តើលក្ខណៈបន្ស៊ាំរបស់រំពាមានអ្វីខ្លះ?

- លក្ខណៈបន្ស៊ាំរបស់រំពាមានដូចជា៖
 - ស្បែកក្រាស់
 - មានបន្លាវុំព័ទ្ធសារពាង្គកាយ (ស្លូក)សម្រាប់ការពារខ្លួន។
 - អាចបញ្ចេញសារធាតុគីមីដើម្បីការពារខ្លួន។
 - មានពណ៌សម្បុរលាក់បំបាំង។ ធ្វើអាកប្បកិរិយា ឬសម្លេងត្រាប់។
 - ជង្គុវមានរូបរាងដូចសត្វពស់។
 - កណ្តុបមានពណ៌ស្រស់។
 - មេអំបៅមានស្លាបដូចភ្នែកថនិកសត្វ..។

24. តើរំពា និងសត្វរំពាមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

- រំពា និងសត្វរំពាមានទំនាក់ទំនងគ្នា កាលណាសម្បុររំពា ពពួកសត្វរំពាកើនឡើង។ នៅពេល



ដែល សត្វរំពាតើនឡើង ពពួករំពាតយចុះ។ កាលណាពពួករំពាតយចុះ នាំឱ្យពពួកនៃសត្វរំពាតីយចុះដែរ។

25. តើសត្វរំពា និងបរាសិតខុសគ្នាដូចម្តេច?

ភាពខុសគ្នានៃសត្វរំពា និងបរាសិត

សត្វរំពា	បរាសិត
➢ សារពាង្គកាយធំ ➢ មានសរីរាង្គសម្រាប់ចាប់រំពាច្បាស់លាស់ ➢ ធ្វើឱ្យរំពាអាចស្លាប់ភ្លាម	➢ ជាសារពាង្គកាយតូច ➢ គ្មានសរីរាង្គសម្រាប់ចាប់រំពាច្បាស់លាស់ ➢ ធ្វើឱ្យផ្តល់វិនាសបន្តិចម្តងៗ

26. តើសហប្រាណជាអ្វី?

- សហប្រាណ ជាទំនាក់ទំនងរវាងប្រភេទពីរដែលរស់នៅយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នា។

27. តើសហប្រាណមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?

- សហប្រាណមានបីប្រភេទ គឺ៖
 - ភាពប្រជួយ
 - ភាពបន្ថែម និង
 - បរាសិត។

28. តើភាពប្រជួយជាអ្វី?

- ភាពប្រជួយ ជាទំនាក់ទំនងរវាងប្រភេទពីរដែលទទួលផលស្មើគ្នា។

29. តើភាពបន្ថែមជាអ្វី? ចូររកឧទាហរណ៍នៃភាពបន្ថែម។

- ភាពបន្ថែម ជាទំនាក់ទំនងសហប្រាណរវាងសារពាង្គកាយពីរប្រភេទ ដែលសារពាង្គកាយមួយបានទទួលផល ហើយសារពាង្គកាយមួយទៀតមិនបានទទួលផល តែក៏មិនខាតផលដែរ។
- ឧទាហរណ៍៖ សត្វស្វាដកក្បាលខ្សែធ្វើសំបុកលើដើមឈើ ដោយមិនប៉ះពាល់ ឬមានឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើដើមឈើនោះទេ។



- អរគីដេ ដុះលូតលាស់នៅលើមែករុក្ខជាតិមួយទៀត ដែលអាចឱ្យវាទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ រុក្ខជាតិនេះមិនស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមពីរុក្ខជាតិធំទេ គឺវាសារធាតុចិញ្ចឹមពីខ្យល់ និងខ្យល់។

30. តើបរាសិទ្ធភាពជាអ្វី?

- បរាសិទ្ធភាព ជាទំនាក់ទំនងរវាងសារពាង្គកាយពីរដែលសារពាង្គកាយមួយរស់នៅលើ ឬក្នុងសារពាង្គកាយមួយទៀតហើយធ្វើឱ្យវិនាស ឬអន្តរាយដល់សារពាង្គកាយមួយនោះ។

31. តើបរាសិតជាអ្វី?

- បរាសិត ជាសារពាង្គកាយដែលទទួលផលពីបរាសិទ្ធភាព។

32. តើដើមបញ្ញើក្អែកអាចបំផ្លាញសារពាង្គកាយធូល បានយ៉ាងដូចម្តេច?

- ដើមបញ្ញើក្អែកចាក់បូសរបស់វាចាក់ចូលទៅក្នុងមែករុក្ខជាតិធូល រួចហើយស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមមួយផ្នែកពីរុក្ខជាតិធូល។ បន្ទាប់មករុក្ខជាតិធូលមិនអាចលូតលាស់ហើយក៏ងាប់។

33. តើថែ និងឈើដុះមានលក្ខណៈបន្ទុកដូចម្តេច?

- លក្ខណៈបន្ទុករបស់ថែ និងឈើដុះគឺ ភ្ជាប់ខ្លួនវាទៅនឹងធូលដោយបីតយកឈាមរបស់ធូលជាអាហារ។

34. តើមានបរាសិតណាខ្លះដែលរស់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស?

- បរាសិតដែលរស់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមានដូចជា វីរុស បាក់តេរី ផ្សិត ដង្កូវ ព្រូន តេព្យ៉ាជាដើម។

35. តើបរាសិតរាងសត្វល្អិត និងដង្កូវមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

- នៅលើខ្លួនដង្កូវមានសំបុកកូនញាស់របស់សត្វល្អិត។

36. តើមានអ្វីដែលបំផ្លាញដើមឈើអែមនៅសហរដ្ឋអាមេរិក? តើគេមានដំណោះស្រាយដូចម្តេច?

- នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដើមឈើអែមត្រូវបំផ្លាញដោយផ្សិត។
- គេព្យាបាលជំងឺនេះដោយចាក់បញ្ចូលបាក់តេរីដែលអាចបញ្ចេញសារធាតុសម្លាប់ផ្សិតទៅក្នុងដើមឈើនោះ។



កម្រងសំណួរប្រៀបធៀប មុខវិជ្ជាជីវិតវិទ្យា

1. ចូរប្រៀបធៀបកោនញី និងកោនឈ្មោលរបស់ស្រល់។

- លក្ខណៈដូចគ្នា៖ កោនគ្របដណ្តប់ដោយស្រកា និងមានជាតិស្ព័ត្ររបស់អ្នកដែលការពារ កុំឱ្យគ្រាប់លំអងជ្រុះ។

លក្ខណៈខុសគ្នា

កោនញី	កោនឈ្មោល
- មានទំហំធំ - ផលិតបានអ្នកដែលពីរ ឬយ៉ាងតិច១ - នៅលើដើមរហូតគ្រាប់ជ្រុះ	- មានទំហំតូច - ផលិតបានគ្រាប់លំអងបានច្រើន - ជ្រុះក្រោយពេលជ្រុះគ្រាប់លំអង

2. ចូរប្រៀបធៀបរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋន និងរុក្ខជាតិឌីកូទីលេដ្ឋន។

- លក្ខណៈដូចគ្នា៖
- ជារុក្ខជាតិអង់ស្បូស្តែម
 - មានផ្កាជាសរីរាង្គភេទ
 - មានគ្រាប់ការពារដោយសំបក
 - មានកូទីលេដ្ឋន និងមានបាច់សរសៃនាំ។

លក្ខណៈខុសគ្នា

រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដ្ឋន	រុក្ខជាតិឌីកូទីលេដ្ឋន
- គ្រាប់មានកូទីលេដ្ឋន១ - ស្លឹកវែងមានទ្រនុងស្រប - ផ្កាមានបីស្រទាប់ - បូសជាបូសស្មើ - បាច់សរសៃនាំស្ថិតនៅរាងប៉ាយ	- គ្រាប់មានកូទីលេដ្ឋន២ - ស្លឹកមានទ្រនុងបែកខ្លែង - ផ្កាមានបួន ឬ ប្រាំស្រទាប់ - បូសជាបូសកែវ - បាច់សរសៃនាំស្ថិតនៅជាន់រង្វង់



3. ចូរប្រៀបធៀបដំណើរលំអង្វង់ (ស្វ័យដំណើរលំអង្វង់) និងដំណើរលំអង្វង់កាត់។

- លក្ខណៈដូចគ្នា៖ ជាការផ្ទេរគ្រាប់លំអង្វង់ទៅលើស្ទិចម៉ាត។

លក្ខណៈខុសគ្នា

ដំណើរលំអង្វង់	ដំណើរលំអង្វង់កាត់
ជាការផ្ទេរគ្រាប់លំអង្វង់ពីផ្លែកលំអង្វង់ទៅកាន់ស្ទិចម៉ាតក្នុងផ្កាតែមួយ។	ជាការផ្ទេរគ្រាប់លំអង្វង់ពីប្លោកលំអង្វង់ទៅលើស្ទិចម៉ាតនៃផ្កាមួយទៀតដោយខ្យល់ ទឹក មនុស្ស ឬសត្វល្អិត។

4. តើគ្រាប់លំអង្វង់ និងមីក្រូស្ប៍មានលក្ខណៈដូចគ្នា និងខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ?

- លក្ខណៈដូចគ្នា៖

- មានទម្រង់តូចៗល្អិតៗ
- ជាគោលការណ៍អាហារូត៌។

លក្ខណៈខុសគ្នា

គ្រាប់លំអង្វង់	មីក្រូស្ប៍
- កើតពីមីក្រូស្ប៍ធ្វើមីតូសម្តង - មានណ្វៃយ៉ូណូអ៊ីតពីរ (ណ្វៃយ៉ូលូតលាស់មួយ និងណ្វៃយ៉ូបន្តពូជមួយ) - ជាអ្នកបង្កើតកាម៉ែត (កាម៉ែតូភីត)	- ធ្វើមីតូសបង្កើតបានជាគ្រាប់លំអង្វង់ - មានណ្វៃយ៉ូណូអ៊ីតមួយ - ជាអ្នកបង្កើតគ្រាប់លំអង្វង់ (មិនមែនជាកាម៉ែតូភីតទេ)

5. តើខ្សែក្បាលសត្វឆ្អឹងកងទាំងប្រាំថ្នាក់មានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ?

- លក្ខណៈខុសគ្នានៃខ្សែក្បាលសត្វឆ្អឹងកងទាំងប្រាំថ្នាក់មានដូចជា៖

- ចំពោះសត្វឆ្អឹងកង ខ្សែក្បាល(អង្គគោលខ្នង និងខ្នងតូច)មានការលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំង



និងមានសវិរាងវិញ្ញាណយ៉ាងច្រើនៗទំហំ និងលក្ខណៈស្មុគស្មាញរបស់អង្គគោលខ្នង និងខ្នងតូច រីកចម្រើនពីថ្នាក់ត្រីជល់ ថនិកសត្វ។ ចំពោះសត្វថ្នាក់ខ្ពស់ អង្គគោលខ្នងជាកន្លែងទទួលបកស្រាយ និងកំណត់នូវការឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានរបស់សវិរាងវិញ្ញាណ។

- ចំពោះត្រី កង្កែប និងល្អិត អង្គគោលខ្នងនិងខ្នងតូចមានទំហំតូចៗ ចំណែកបក្សី និង ថនិកសត្វ វាមានទំហំធំល្មមព្រមទាំងមានផ្គត់ច្រើនដែលបង្កើនទំហំផ្ទៃខ្នងក្បាល។

6. តើខ្នងក្បាលរបស់មនុស្សមានលក្ខណៈដូចម្តេច បើធៀបជាមួយសត្វឆ្អឹងកងផ្សេងទៀត?

➢ ខ្នងក្បាលរបស់មនុស្ស ធៀបជាមួយសត្វឆ្អឹងកងផ្សេងទៀតគឺ៖

- ចំពោះមនុស្ស ខ្នងក្បាលអភិវឌ្ឍប្រសើរបំផុតបើប្រៀបធៀបនៅក្នុងចំណោមសត្វទាំងអស់។
- គេតែង គិតថាមានតែមនុស្សទេ ទើបអាចមើលឃើញ ស្តាប់លឺ ឬដឹងពីអ្វីៗដែលកើតមានក្នុងពិភពលោកជាងសត្វដទៃទៀត។ ប៉ុន្តែនេះផ្ទុយពីការពិតទាំងស្រុង ព្រោះត្រី អណ្តើក មួយចំនួន និងបក្សីភាគច្រើនអាចមើលឃើញពណ៌ច្បាស់ជាងមនុស្ស។
- សត្វឆ្អែ ប្រចៀវ និងផ្សាតមានភាពរួសនឹងសម្លេងខ្ពស់ជាងមនុស្សទៅទៀត ទោះបីជាសម្លេងស្រាលក៏ដោយ។ សវិរាងឃានវិញ្ញាណរបស់មនុស្សមានអានុភាពទាបជាងគេ បើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្អែ ឆ្មា...។

7. តើប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឥតឆ្អឹងកង និងប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកងខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ?

ភាពខុសគ្នានៃប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឥតឆ្អឹងកង និងប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកង	
ប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឥតឆ្អឹងកង	ប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកង
• មានសវិរាងវិញ្ញាណតិច (កណ្តុប) • ខ្នងក្បាលមានទំហំតូច និងមានលក្ខណៈសាមញ្ញ (មិនស្មុគស្មាញ) • គ្មានអង្គគោលខ្នង និងខ្នងតូចទេ	• មានសវិរាងវិញ្ញាណច្រើន • ខ្នងក្បាលមានទំហំធំ និងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ • មានអង្គគោលខ្នង ខ្នងតូច និងខ្នងធំ



8. ចូរប្រៀបធៀបមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ និងបរិមណ្ឌលប្រសាទ។

➢ លក្ខណៈដូចគ្នា៖

- ជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធប្រសាទ
- មានណឺរ៉ូនដូចគ្នា។

លក្ខណៈខុសគ្នា

មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ	បរិមណ្ឌលប្រសាទ
• បង្កឡើងពីខួរក្បាល និងខួរឆ្អឹងខ្នង • មាននាទីទទួលព័ត៌មាន បកស្រាយ និងបញ្ចេញទៅបរិមណ្ឌលប្រសាទ	• បង្កឡើងពីសរសៃប្រសាទលលាដ៏ក្បាល និងសរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្នង • មាននាទីដឹកនាំព័ត៌មានចូល និងចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ

9. ចូរប្រៀបធៀបណឺរ៉ូនវិញ្ញាណនាំ និងណឺរ៉ូនចលករ។

➢ លក្ខណៈដូចគ្នា៖

- ជាគោសិកាឯកទេសដែលមាននាទីដឹកនាំព័ត៌មានទៅពាសពេញសារពាង្គកាយ។
- វាមានដង់ទ្រីត តួគោសិកា និងអាក់សូន។

លក្ខណៈខុសគ្នា

ណឺរ៉ូនវិញ្ញាណនាំ	ណឺរ៉ូនចលករ
• ដឹកនាំព័ត៌មានពីផ្ទៃវិញ្ញាណទៅកាន់ខួរក្បាល • ជាណឺរ៉ូនឯកប៉ូល	• ដឹកនាំព័ត៌មានពីខួរក្បាលទៅសរីរាង្គចលករ • ជាណឺរ៉ូនពហុប៉ូល



10. ចូរបង្ហាញភាពខុសគ្នានៃប្រព័ន្ធប្រសាទសាំប៉ាទីច និងប្រព័ន្ធប្រសាទប៉ារ៉ាសាំប៉ាទីច។

ភាពខុសគ្នា

ប្រព័ន្ធប្រសាទសាំប៉ាទីច (ពេលមានភាពតានតឹង) (Fight or Flight)	ប្រព័ន្ធប្រសាទសាំប៉ាទីច (Rest and Digest) (ធ្វើឱ្យសារពាង្គកាយត្រលប់មកធម្មតាវិញ)
-ពង្រីកប្រស្រីភ្នែក -ពង្រីកទងសួត - បន្ថយការបញ្ចេញទឹកមាត់ -បង្កើនល្បឿនចង្វាក់បេះដូង -បន្ថយសកម្មភាពរំលាយអាហារ -ឆ្ងាចបំបែកឆ្អឹងក្នុងស្បូនទៅជាគ្រាប់កូស -បញ្ចេញអេពីណេព្រីន និងឈូអេពីណេព្រីនពីក្រពេញលើតម្រងនោម -បន្ថយប៊េរីស្តាល់ស៊ីស -ប្លោកនោមរលា	-បង្រួមប្រស្រីភ្នែក -បង្រួមទងសួត -បង្កើនការបញ្ចេញទឹកមាត់ -បន្ថយល្បឿនចង្វាក់បេះដូង -ឆ្ងាចសកម្មភាពរំលាយអាហារ -ឆ្ងាចបំបែកគ្រាប់កូសទៅជាឆ្អឹងក្នុងស្បូន -បន្ថយការបញ្ចេញអេពីណេព្រីន និង ឈូអេពីណេព្រីនពីក្រពេញលើតម្រងនោម -បង្កើនប៊េរីស្តាល់ស៊ីស-បង្រួមប្លោកនោម

11. ចូរប្រៀបធៀបមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ និងបរិមណ្ឌលប្រសាទ។

- លក្ខណៈដូចគ្នា៖ ជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធប្រសាទ និងមានណឺរ៉ូនដូចគ្នា។

លក្ខណៈខុសគ្នា

មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ	បរិមណ្ឌលប្រសាទ
• បង្កឡើងពីខួរក្បាល និងខួរឆ្អឹងខ្នង • មាននាទីទទួលព័ត៌មាន បកស្រាយ និងបញ្ចេញទៅបរិមណ្ឌលប្រសាទ	• បង្កឡើងពីសរសៃប្រសាទលលាដ៏ក្បាល និងសរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្នង • មាននាទីដឹកនាំព័ត៌មានចូល និងចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ



12. ចូរប្រៀបធៀបកោសិកាកោន និងកោសិកាដំបង។

➢ លក្ខណៈដូចគ្នា៖

- ជាណឺរ៉ូនដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់រន្ធទីន ។
- វាជាណឺរ៉ូនតភ្ជាប់ដោយកោសិកាទ្វេប៉ូល និងជាកោសិកាអ្នកទៅនឹងពន្លឺ។

លក្ខណៈខុសគ្នា

កោសិកាកោន	កោសិកាដំបង
• ឯងខ្ចីតមានទម្រង់ជាកោន • ជាកោសិកាអ្នកទៅនឹងពន្លឺខ្លាំងដែលអាចមើលឃើញពណ៌ខុសគ្នា។ • ទទួលខុសត្រូវក្នុងគំហើញពណ៌ • ក្នុងផ្សេងៗ មានសុទ្ធតែកោសិកាកោន • ក្រៅតំបន់ផ្សេងៗ មានកោសិកាកោនតិចជាងកោសិកាដំបង	• ឯងខ្ចីតមានទម្រង់ជាដំបង • ជាកោសិកាអ្នកទៅនឹងពន្លឺខ្សោយដែលមិនអាចមើលឃើញពណ៌ខុសគ្នា។ • ទទួលខុសត្រូវក្នុងគំហើញពណ៌ ខ្លះៗ • ក្នុងផ្សេងៗ គ្មានកោសិកាដំបងទេ • ក្រៅតំបន់ផ្សេងៗ មានកោសិកាកោនច្រើនជាងកោសិកាដំបង

13. ចូរប្រៀបធៀបស្វ័យជំនឿងទ្វេក្នុងប្រការីយ៉ូត និងស្វ័យជំនឿងទ្វេក្នុងអ៊ីការីយ៉ូត។

- ចំណុចដូចគ្នា៖ ម៉ូលេគុលADNមេមួយបង្កើតដោយខ្លួនឯងនូវម៉ូលេគុលADNកូនពីរដែលដូចគ្នាបេះបិទ ហើយដូចគ្នាទៅនឹងម៉ូលេគុលADNមេ។

ចំណុចខុសគ្នា

ជំនឿងទ្វេADNក្នុងប្រការីយ៉ូត	ជំនឿងទ្វេADNក្នុងអ៊ីការីយ៉ូត
• ចាប់ផ្តើមចំណុចតែមួយរួចព្រែកតាមទិសដៅផ្ទុយគ្នារហូតវាជួបគ្នា • មានសភាពលឿន ក្នុងល្បឿនប្រហែល 106គូបាសក្នុង1នាទី។ • ចំណាយពេលប្រហែល40នាទី	• ចាប់ផ្តើមចំណុចជាច្រើនរួចព្រែកតាមទិសដៅផ្ទុយគ្នារហូតវាជួបគ្នា • មានសភាពយឺតក្នុងល្បឿនប្រហែល 500 ទៅ 5000 គូបាសក្នុង1នាទី។ • ចំណាយពេលច្រើនម៉ោង



14. ចូរប្រៀបធៀបប្រូតេអ៊ីនដាយ និងប្រូតេអ៊ីនសាំញ៉ាំ។

- លក្ខណៈដូចគ្នា៖ កើតឡើងពីអាស៊ីតអាមីនេ។

លក្ខណៈខុសគ្នា

ប្រូតេអ៊ីនដាយ	ប្រូតេអ៊ីនសាំញ៉ាំ
កើតឡើងពីអាស៊ីតអាមីនេសុទ្ធ	កើតឡើងពីអាស៊ីតអាមីនេ រួមជាមួយសមាសធាតុដែលមិនមែនជាប្រូតេអ៊ីន។

15. ចូរប្រៀបធៀបផ្គត់ស្រប និងផ្គត់មិនស្របរបស់ប្រូតេអ៊ីន។

- លក្ខណៈដូចគ្នា៖ ជាប្រូតេអ៊ីនទម្រង់ទី2

លក្ខណៈខុសគ្នា

ផ្គត់ស្រប(ផ្គត់រង្វង)	ផ្គត់មិនស្រប(ផ្គត់សន្លឹក)
- ច្រវាក់ប៊ុបទីតតម្រៀបទៅតាមទិសដៅតែ1 - ជាទម្រង់ដាយ - មិនសូវរឹងមាំ	- ច្រវាក់ប៊ុបទីតតម្រៀបទៅតាមទិសដៅផ្ទុយគ្នា - ជាទម្រង់សាំញ៉ាំ - រឹងមាំ

16. ចូររកលក្ខណៈខុសគ្នារវាងប្រូតេអ៊ីនសរសៃ និងប្រូតេអ៊ីនគ្រាប់ ។

លក្ខណៈខុសគ្នា

ប្រូតេអ៊ីនសរសៃ	ប្រូតេអ៊ីនគ្រាប់
- ជាម៉ូលេគុលវែង ។ - មិនរលាយក្នុងទឹក ហើយស្ងួត។ - មាននៅក្នុងស្បែក សក់ និងក្រចក។ - មាននាទីជាអ្នកការពារ ជាអ្នកធ្វើចលនា និងជា ប្រូតេអ៊ីនទម្រង់។	- ជាម៉ូលេគុលតូចៗ ។ - រលាយក្នុងទឹក។ - អង់ស៊ីមស្ទើរទាំងអស់ជាប្រូតេអ៊ីនគ្រាប់។ - មាននាទីជាអង់ស៊ីម អង់ទីករ អេម៉ូក្លូប៊ីន និង អាចបំប្លែងមីន។



17. ចូរប្រៀបធៀបចលនាការតម្លើងទ្វេម៉ូលេគុលADN និងការសំយោគម៉ូលេគុលARNm។

➤ លក្ខណៈដូចគ្នា៖

- ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូនៃកោសិកានៅចន្លោះវគ្គ ។
- សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែននៃច្រវាក់ទាំងពីររបស់ADNផ្តាច់ចេញពីគ្នា។
- ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអំពើអង់ស៊ីមប៉ូលីមេរ៉ាស។

លក្ខណៈខុសគ្នា

ចលនាការតម្លើងទ្វេម៉ូលេគុលADN	ការសំយោគម៉ូលេគុលARNm
• នុយក្លេអូទីតសេរីA,T,C,G • ក្រោមអំពើអង់ស៊ីមADNប៉ូលីមេរ៉ាសសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនត្រូវផ្តាច់ពីដើមម៉ូលេគុលរហូតដល់ចុងម៉ូលេគុល • នុយក្លេអូទីតសេរីចូលទៅបំពេញច្រវាក់ទាំង២របស់ADNតាមគោលការណ៍បំពេញប្រាំស A-T, C-G • គេបានម៉ូលេគុលADNក្នុងពីរដូចគ្នាបេះបិទ ហើយស្ថិតនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូជានិច្ច។	• រីបូនុយក្លេអូទីតសេរីA,U,C,G • ក្រោមអំពើអង់ស៊ីមARNប៉ូលីមេរ៉ាសសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនត្រូវផ្តាច់ត្រង់កន្លែងកំណត់មួយ • នុយក្លេអូទីតសេរីចូលទៅបំពេញច្រវាក់ម្ខាងរបស់អង្កត់ADNតាមគោលការណ៍ចម្លងក្រុមA-U, C-G • គេបានម៉ូលេគុលARNm ១ម៉ូលេគុល ហើយផ្តាច់ចេញពីច្រវាក់ADNរួចចេញពីណ្វៃយ៉ូទៅស៊ីតូប្លាស ឯច្រវាក់ទាំងពីររបស់ADNក៏ភ្ជាប់គ្នាវិញ។

18. ចូរប្រៀបធៀបADNនិងARNm។

➤ ចំណុចដូចគ្នា៖

- ជាប្រភេទអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីច
- មានអាស៊ីតផូស្វ័រិច
- និងមានប្រាំសA CនិងG



លក្ខណៈខុសគ្នា

ADN.	ARNm
- កើតពីច្រវាក់នុយក្លេអូទីតពីរបំពេញគ្នា - មានស្ករដេអុកស៊ីរីបូស ($C_5H_{10}O_4$) - មានបាស A (អត់ U) - មាននុយក្លេអូទីតច្រើន (រាប់លាន) ប្រវែងវែង និងមានម៉ាសម៉ូលេគុលធំ - អង្កត់មួយរបស់ ADN កំណត់ការសំយោគ ARNm មួយ - ផ្ទុកព័ត៌មានសេនេទិចសម្រាប់ចម្លងចេញនូវ ARNm	- កើតពីច្រវាក់នុយក្លេអូទីតម្ខាង - មានស្កររីបូស ($C_5H_{10}O_5$) - មានបាស U (អត់ T) - មាននុយក្លេអូទីតតិច (រាប់សិបទៅរាប់ពាន់) ប្រវែងខ្លីនិងមានម៉ាសម៉ូលេគុលតូច - ARNm មួយសំយោគចេញពីអង្កត់មួយរបស់ ADN. - ចម្លងព័ត៌មានសេនេទិចរបស់ ADN.

19. ចូរប្រៀបធៀប ADN និងប្រូតេអ៊ីន។

➢ ភាពដូចគ្នារវាង ADN និងប្រូតេអ៊ីនគឺ៖

- ជាម៉ាក្រូម៉ូលេគុល
- ម៉ូលេគុលនីមួយៗជាច្រវាក់ម៉ូលេគុលតូចៗដែលជាម៉ូណូមែរ
- ម៉ូលេគុលនីមួយៗមានតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតឬ អាស៊ីតអាមីនេជាក់លាក់។

ភាពខុសគ្នា

ADN.	ប្រូតេអ៊ីន
- ម៉ូណូមែររបស់ ADN គឺនុយក្លេអូទីត (មាននុយក្លេអូទីតប្រភេទគឺ A, T, C, G) - កើតពីច្រវាក់នុយក្លេអូទីតពីរបំពេញគ្នា - មាននុយក្លេអូទីតច្រើន ម៉ាសធំ ប្រវែងវែង - នុយក្លេអូទីត ៣ កំណត់អាស៊ីតអាមីនេ ១	- ម៉ូណូមែររបស់ប្រូតេអ៊ីនគឺអាស៊ីតអាមីនេ (មានអាស៊ីតអាមីនេ ២០ ប្រភេទ) - កើតពីច្រវាក់អាស៊ីតអាមីនេទោល - មានអាស៊ីតអាមីនេតិច ម៉ាសតូច ប្រវែងខ្លី - អាស៊ីតអាមីនេមួយកំណត់ដោយនុយក្លេអូទីត ២



• តំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតកំណត់នូវតំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេ	• តំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេកំណត់ដោយតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតរបស់ADN។
--	--

20. ចូរប្រៀបធៀបARNmនិងARNt។

➢ លក្ខណៈដូចគ្នា៖

- កើតពីរីបូនុយក្លេអូទីតបួនប្រភេទ
- ជាច្រវាក់រីបូនុយក្លេអូទីតទោល។

លក្ខណៈខុសគ្នា

ARNm	ARNt
• មាននុយក្លេអូទីតច្រើន • ជាច្រវាក់ត្រង់ • មាននាទីចម្លងព័ត៌មានសេនេទិច	• មាននុយក្លេអូទីតពី 70 ទៅ 80 • ជាច្រវាក់បត់បែនជាកំពកបី • មាននាទីដឹកនាំអាស៊ីតអាមីនេចូលរួមបកប្រែក្រុម

21. ចូរប្រៀបធៀបក្រពេញអិចសូត្រីន និងក្រពេញអង់ដូត្រីន។

➢ លក្ខណៈដូចគ្នា៖ ផលិត និងបញ្ចេញសារធាតុផ្សេងៗ។

លក្ខណៈខុសគ្នា

ក្រពេញអិចសូត្រីន	ក្រពេញអង់ដូត្រីន
• មានបំពង់នាំ • ផលិតសរសៃរាងបារ រំលាយមេតាបូលីស • មានអំពៅទៅលើសារធាតុណាមួយក្នុងលំហនៃសរីរាង្គឬចេញក្រៅសារពាង្គកាយ • បញ្ចេញសរសៃរាងបារតាមបំពង់នាំ	• គ្មានបំពង់នាំ • ផលិតអម្ពូន • មានឥទ្ធិពលទៅលើកោសិកាគោលដៅ • បញ្ចេញអម្ពូនទៅក្នុងចរន្តឈាម



22. ចូរប្រៀបធៀបអរម៉ូនប៊ីបទីតនិងអរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីត។

➤ លក្ខណៈដូចគ្នា៖

- ភ្ជាប់ទៅនឹងធូលកោសិកាគោលដៅ
- មានឥទ្ធិពលលើកោសិកាគោលដៅ
- បំប្លែងនាទីកោសិកាគោលដៅ។

លក្ខណៈខុសគ្នា

អរម៉ូនប៊ីបទីត	អរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីត
• ម៉ូលេគុលនៃច្រវ៉ាក់អាស៊ីតអាមីនេ • មិនអាចឆ្លងកាត់ភ្ជាសកោសិកាបានទេ • សកម្មភាពកើតឡើងនៅក្នុងស៊ីតូប្លាស • ធ្វើសកម្មភាពលឿន • មានឥទ្ធិពលលើកោសិកាគោលដៅរយៈពេលខ្លី	• ម៉ូលេគុលលីពីតតូចៗ • អាចឆ្លងកាត់ភ្ជាសកោសិកាបាន • សកម្មភាពកើតឡើងនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូ បន្ទាប់មកក្នុងស៊ីតូប្លាស • ធ្វើសកម្មភាពយឺត • មានឥទ្ធិពលលើកោសិកាគោលដៅរយៈពេលយូរ

23. ចូរប្រៀបធៀបអរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីន និងអរម៉ូនប្រូឡាក់ទីន។

➤ លក្ខណៈដូចគ្នា៖

- ជាអរម៉ូនដែលផលិតដោយក្រពេញអង់ដូត្រីន។
- បញ្ចេញទៅក្នុងចរន្តឈាម និង
- មានអំពើលើកោសិកាគោលដៅ។



លក្ខណៈខុសគ្នា

អរម្មនអ្នកសិក្សាស៊ីន	អរម្មនប្រឡាក់ទីន
- ផលិតដោយកោសិកាណឺរ៉ូនបញ្ចេញនៅក្នុងអ៊ីប៉ូតាឡាមុស - ស្តុកទុក និងបញ្ចេញដោយអ៊ីប៉ូភីសក្រោយ - បញ្ចេញនៅពេលសម្រាលកូន - ឆ្លាចក្រពេញទឹកដោះខ្សែបញ្ចេញទឹកដោះពេលបំបៅកូន - ឆ្លាចការកន្ត្រាក់នៃសាច់ដុំលើងនៅក្នុងស្បូនដែលជួយដម្រុញទារកពីក្នុងស្បូនម្តាយនៅពេលសម្រាលកូន	- ផលិតដោយកោសិកាដែលក្រពេញអ៊ីប៉ូភីសមុខ - ស្តុកទុក និងបញ្ចេញដោយអ៊ីប៉ូភីសមុខ - បញ្ចេញនៅក្រោយពេលសម្រាលកូន - ឆ្លាចខ្សែក្រពេញទឹកដោះខ្សែលូតលាស់ និងផលិតទឹកដោះ។ - មាននាទីក្នុងមេតាបូលីសខ្លាញ់ និងគ្រួសារស៊ីត

24. ចូរប្រៀបធៀបលក្ខណៈខុសគ្នារវាងប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន និងប្រព័ន្ធប្រសាទ។

លក្ខណៈខុសគ្នា

ប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន	ប្រព័ន្ធប្រសាទ
- ក្រពេញអង់ដូគ្រីនអាចនៅឆ្ងាយពីកោសិកាគោលដៅ។ - អរម្មនអាចដឹកនាំទៅពាសពេញសារពាង្គកាយ - ព័ត៌មានបញ្ជូនតាមរយៈឈាម - ព័ត៌មានជាអរម្មន - ការបញ្ជូនព័ត៌មានយឺត - ការឆ្លើយតបនឹងអរម្មនយឺត - អំពើអរម្មនស្ថិតស្ថេរបានយូរ។	- ណឺរ៉ូនលាតសន្ធឹងទៅដល់ទម្រង់ផ្សេងៗដែលវាត្រួតពិនិត្យ - ណឺរ៉ូននីមួយៗធ្វើដំណើរទៅកាន់ទម្រង់ពិសេសមួយប៉ុណ្ណោះ។ - ព័ត៌មានបញ្ជូនតាមភីបប្រសាទ - ព័ត៌មានជាអគ្គីសនី ឬសារធាតុគីមី - ការបញ្ជូនព័ត៌មានរហ័សណាស់ - ការឆ្លើយតបនឹងអាំងហ្គុចរហ័ស - អំពើប្រព័ន្ធប្រសាទមិនស្ថិតស្ថេរយូរទេ។



25. ចូររកភាពខុសគ្នានៃការបង្កាត់ជិត និងការបង្កាត់ឆ្ងាយ។

ភាពខុសគ្នា

ការបង្កាត់ជិត	ការបង្កាត់ឆ្ងាយ
• បង្កាត់រវាងកូនកើតចេញពីមេបាតែមួយ ឬ រវាងកូននិងកូន • សន្តានក្រោយមានកម្លាំងជីវិតខ្សោយ លទ្ធភាព បន្តពូជថយចុះ បង្កើតភាពមិនប្រក្រតី នៃ ក្រុមសូមនាំទៅរកការវិនាសផុតពូជ។ • អាចបង្កើត និងរក្សានូវពូជសុទ្ធចំពោះលក្ខណៈអស់។	• បង្កាត់រវាងពូជខុសគ្នា ឬមានសែស្រឡាយឆ្ងាយពីគ្នា ឬ ប្រភេទខុសគ្នា • អ៊ីប៊ីតមានកម្លាំងជីវិតខ្លាំង ធន់នឹងជំងឺ ឆាប់លូតលាស់ល្អ ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ • អារ មិនអាចបង្កកំណើតបាន ក្នុងករណីមេបាប្រភេទខុសគ្នា។

26. ចូរប្រៀបធៀបជម្រើសដោយមនុស្ស និងជម្រើសដោយធម្មជាតិ។

- ភាពដូចគ្នា៖ បម្រែបម្រួលជាកត្តាផ្តល់លក្ខណៈថ្មីដល់ជម្រើសដោយធម្មជាតិ និងជម្រើសដោយមនុស្ស។

ភាពខុសគ្នា

ជម្រើសដោយធម្មជាតិ	ជម្រើសដោយមនុស្ស
• ភាវសំណាដែលបន្តទៅនឹងលក្ខខណ្ឌជីវិតរស់នៅក្នុងធម្មជាតិអាចរស់រានមានជីវិតបន្តពូជ ហើយបញ្ជូនលក្ខណៈទៅសន្តានក្រោយ។	• មនុស្សជ្រើសរើសតែលក្ខណៈណាដែលតម្រូវនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួន។ លំនាំនេះនាំឱ្យកើតពូជសត្វស្រុក និងរុក្ខជាតិដាំ។



27. តើបង្គុយនៅទីបរិមាមេរិចខាងត្បូង និងបង្គុយនៅកោះកាឡាប៉ាកូសខុសគ្នាដូចម្តេច?

ភាពខុសគ្នា

បង្គុយនៅទីបរិមាមេរិចខាងត្បូង	បង្គុយនៅកោះកាឡាប៉ាកូស
• មានក្រញាំជើងតូច • អាចតោងលើដើមឈើ • ស៊ីស្លឹករុក្ខជាតិ និងសត្វល្អិត	• មានក្រញាំជើងធំ • អាចតោងថ្នូរអិលតាមមាត់សមុទ្រ • ស៊ីសារាយសមុទ្រ

28. ចូរប្រៀបធៀបស្រទាប់អេពីខែម និងស្រទាប់ខែម។

➢ លក្ខណៈដូចគ្នា៖ ស្រទាប់របស់ស្បែកដែលគ្របដណ្តប់គ្រប់ផ្នែកនៃសារពាង្គកាយ។

លក្ខណៈខុសគ្នា

អេពីខែម	ខែម
• ជាស្រទាប់ក្រៅបង្អស់របស់សារពាង្គកាយ (នៅលើខែម) • មានកម្រាស់ 0.7mm • បង្កឡើងដោយកោសិកាអេពីតេលូម។ ស្រទាប់លើដាច់ផ្ទុកកេរ៉ាទីន ហើយកោសិកាស្រទាប់ក្រោមធ្វើចំណែកយ៉ាងរហ័ស។ • គ្មានសរសៃឈាម • មានកោសិកាមេឡាណូស៊ីត • គ្មានធូលវិញ្ញាណទេ លើកលែងតែធូលឈើចាប់ • គ្មានក្រពេញញើស ក្រពេញសេបូម និងសាច់ដុំរលីងទេ។	• ជាស្រទាប់ក្រៅបង្អស់របស់សារពាង្គកាយ (នៅលើខែម) • មានកម្រាស់ 4mm • បង្កឡើងដោយជាលិកាសន្លាសរសៃយឺត និងកូឡាសែនដែលជាស្រទាប់រស់។ • មានសរសៃឈាម • គ្មានកោសិកាមេឡាណូស៊ីត • មានធូលវិញ្ញាណទាំងប្រភេទ • មានក្រពេញញើស ក្រពេញសេបូម សាច់ដុំរលីងភ្ជាប់នឹងបូសរោម។



• ទទួលសារធាតុចិញ្ចឹមតាមរយៈបន្ទាយពីសរសៃឈាមរបស់ខ្មែរ	• សរសៃឈាមផ្គត់ផ្គង់ សារធាតុចិញ្ចឹមដល់អេពីខ្មែរតាមរយៈបន្ទាយ
--	--

29. ចូររកលក្ខណៈខុសគ្នារវាងពពួក និងសហគមន៍។

ភាពខុសគ្នា

ពពួក	សហគមន៍
• សារពាង្គកាយក្នុងប្រភេទមួយរស់នៅក្នុងតំបន់មួយតូចល្អម • ចំនួនសមាជិកតិចជាងសហគមន៍	• សំណុំនៃប្រភេទផ្សេងៗរស់នៅក្នុងតំបន់មួយលាតសន្ធឹងធំ • មានសមាជិកច្រើនជាងពពួក។

30. តើសត្វរំពា និងបរាសិតខុសគ្នាដូចម្តេច?

ភាពខុសគ្នានៃសត្វរំពា និងបរាសិត

សត្វរំពា	បរាសិត
➢ ជាសារពាង្គកាយធំ ➢ មានសរីរាង្គសម្រាប់ចាប់រំពាច្បាស់លាស់ ➢ ធ្វើឱ្យរំពាអាចស្លាប់ភ្លាម	➢ ជាសារពាង្គកាយតូច ➢ គ្មានសរីរាង្គសម្រាប់ចាប់រំពាច្បាស់លាស់ ➢ ធ្វើឱ្យផ្តល់វិសាលបន្តិចម្តងៗ

ឯកសារយោង

1. សៀវភៅសិស្សថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាបោះពុម្ពឆ្នាំ២០១៧
2. សៀវភៅគ្រូ ថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាបោះពុម្ពឆ្នាំ២០២២
3. វចនានុក្រមជីវវិទ្យា អង់គ្លេស ខ្មែរ បោះពុម្ពឆ្នាំ ២០១៣ (RUPP)
4. កម្រងឯកសារសំនួរចម្លើយ និងវិញ្ញាសាររបស់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យឯកទេសជីវវិទ្យា
(អ្នកគ្រូ ជា គឺមនៀង លោកគ្រូ ធួ ភន និងអ្នកគ្រូ ម៉ៅ វណ្ណី)
5. រូបភាពពី GOOLGE